

התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל

דו"ח לשנים 2016-2018



{ התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל
NATIONAL PROGRAM FOR QUALITY INDICATORS IN COMMUNITY HEALTHCARE
المشروع الوطني لمؤشرات الجودة الطبية للصحة الجماهيرية في إسرائيل }

התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל

דו"ח לשנים 2016-2018

חברי מנהלת תכנית המדדים ומחברי הדו"ח:

פרופ' אריה בן-יהודה

ד"ר אהוד הורוביץ

ד"ר יעל וולף-שגיא

ד"ר יסכה וייסבנד

פרופ' אורלי מנור

פרופ' אורה פלטיאל

פרופ' רונית קלדרון-מרגלית

ד"ר מיכל קריגר

פרופ' שושנה רב-לוי

בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית
האוניברסיטה העברית והדסה

בהשתתפות:

ארבע קופות החולים בישראל

מבצעת המבדק:

ד"ר עליזה לוקאץ'

חשוון תש"פ - נובמבר 2019

עריכה גרפית | ערן צירמן
דפוס | גרפוס פרינט

ירושלים התשפ"ט (2019)

חברי המנהלת של התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל

פרופ' רונית קלדרון-מרגלית (ראש התכנית)

אפידמיולוגיה של מחלות אם וילד, בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית, האוניברסיטה העברית והדסה

פרופ' אריה בן-יהודה

מנהל האגף הפנימי, מרכז רפואי הדסה והאוניברסיטה העברית

ד"ר אהוד הורביץ

רוקח קליני, מרכז רפואי הדסה והאוניברסיטה העברית

ד"ר יעל וולף-שגיא (סגנית ראש התכנית)

אפידמיולוגיה ומדדי איכות, בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית, האוניברסיטה העברית והדסה

ד"ר יסכה וייסבנד

עמיתת מחקר פוסט-דוקטורט בקרן עזריאלי, בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית, האוניברסיטה העברית והדסה

פרופ' אורלי מנור

ביוסטטיסטיקה, בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית, האוניברסיטה העברית והדסה

פרופ' אורה פלטיאל

אפידמיולוגיה, מנהלת מרכז המחקר באפידמיולוגיה קלינית, בית הספר לבריאות הציבור, רופאה בכירה במחלקה להמטולוגיה, מרכז רפואי הדסה והאוניברסיטה העברית

ד"ר מיכל קריגר

רפואה פנימית ומחלות זיהומיות, בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית, האוניברסיטה העברית והדסה

פרופ' שושנה רבליילק

המטולוגיה-אונקולוגיה ילדים, מנהלת יחידת הגושה, רופאה בכירה ביחידה להמטולוגיה-אונקולוגיה ילדים, מרכז רפואי שערי צדק

צוות התכנית

גב' לאה אברמס, סטטיסטיקה ומערכות מידע, בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית, האוניברסיטה העברית והדסה

גב' יעל קניג, מערכות מידע, בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית, האוניברסיטה העברית והדסה

גב' נורה עבדל-רחמן, תלמידת דוקטורט, בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית, האוניברסיטה העברית והדסה

רשימת השותפים

שירותי בריאות כללית

שירותי בריאות כללית

פרופ' ארנון כהן

גב' גלית בנבנישתי

גב' נעמה בטאט

ד"ר שרי גרינברג

ד"ר שלומית ירון

ד"ר ניקי ליברמן

מר אילן פלדהמר

ד"ר דורון קומנשטר

גב' תמרה קורמן

גב' כלנית קיי

ד"ר מינה רותם

גב' שירי שדה-אור

גב' קרן ששון

נושא אחריות עבור פעילות הקופה בתכנית הלאומית,

מנהל מחלקת מדידת איכות ומחקר, חטיבת הקהילה

נושאת אחריות עבור פעילות הקופה בתכנית הלאומית,

מנהלת BI ארגוני, אגף מחשוב

מחלקת מדידת איכות ומחקר, חטיבת הקהילה

מנהלת מחלקת מידע ומחקר, אגף תכנון ואסטרטגיה

סגנית ראש אגף רפואה, חטיבת הקהילה

ראש אגף מדיניות בריאות, חטיבת הקהילה

סטטיסטיקאי, מחלקת מידע ומחקר, אגף תכנון ואסטרטגיה

אפידמיולוג, מחלקת מדידת איכות ומחקר, חטיבת הקהילה

מנתחת מערכות בצוות BI ארגוני, אגף מחשוב

ראש אגף סיעוד, חטיבת הקהילה

רכזת איכות וניהול סיכונים, אגף סיעוד בקהילה, חטיבת הקהילה

רכזת מדידת איכות, מחלקת מדידת איכות, חטיבת הקהילה

רכזת מדידת איכות, מחלקת מדידת איכות, חטיבת הקהילה

מכבי שירותי בריאות

ד"ר עינת אלרן

ד"ר ענת עקה-זוהר

ד"ר אריקה כהן-יונגר

גב' נסיה גורדון

גב' נעמה פז

מר דביר ויז'ניצר

גב' רוזנה תבור

פרופ' נחמן אש

מנהלת המחלקה לניהול איכות, חטיבת הבריאות

מנהלת מערך איכות, הערכה ומחקר, חטיבת הבריאות

סגנית מנהלת המחלקה לניהול איכות, חטיבת הבריאות

ממונה תחום מדידה, מומחית יישום מערכות מדידה,

המחלקה לניהול איכות, חטיבת הבריאות

מנהלת פרויקט תמ"ל, ר"צ תשתיות BI, המחלקה למידע ניהול ואיכות,

אגף מערכות מידע ותקשוב

מנתח מערכות, צוות תשתיות BI, מערך BI, אגף מערכות מידע ותקשוב

מנתחת מערכות, צוות BI ניהולי, מערך BI, אגף מערכות מידע ותקשוב

ראש חטיבת הבריאות ומשנה למנכ"ל



מאוחדת

מנהלת המחלקה לאיכות קלינית	גב' ליאורה ולינסקי
אחראית פרוייקט תמ"ל, מחלקת ה-BI	גב' נורית כהן
מנהלת מחלקת BI	גב' רות אליעזר
מ. מחלקת מערכות רפואיות, אגף טכנולוגיות מידע	גב' שרית כץ
ראש אגף רפואה ראשונית	ד"ר דודי דביר
סמנכ"ל רפואה	ד"ר דודי מוסינזון

לאומית שירותי בריאות

מנהל מחלקת רפואה בקהילה	ד"ר ערן מץ
ראש צוות בינה עסקית	גב' נירית פרץ
מנהל מחלקת פיתוח מערכות רפואיות	ד"ר דורון דושניצקי
ראש חטיבת הרפואה	פרופ' שלמה וינקר

משקיפים

לשעבר המנהל המדעי של המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות ומדיניות הבריאות	פרופ' אליק אבירם
מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות	פרופ' ליטל קינן-בוקר
המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות	ד"ר ענבר צוקר
סמנכ"ל איכות ובטיחות, משרד הבריאות	פרופ' ירון ניב
נציג המועצה הלאומית לבריאות הקהילה	ד"ר אסי סיקורל
נציגת איגוד רופאי המשפחה	ד"ר יעל גילרמן





תודות

התוכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל, כמו גם הדו"ח המונח לפניכם, מבטאים חזון ושיתוף פעולה של מגוון גופים המעורבים בתוכנית ופועלים לשיפור שירותי הבריאות בקהילה, בראשם:

ארבע קופות החולים בישראל: שירותי בריאות כללית, מכבי שירותי בריאות, קופת חולים מאוחדת, ולאומית שירותי בריאות

המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות

משרד הבריאות

מועצת הבריאות

ההסתדרות הרפואית בישראל והסתדרות האחים והאחיות בישראל

האיגודים של ההסתדרות הרפואית בישראל

חברת פוינטס

ירפא מחשבים

החברה הישראלית לאיכות ברפואה

מומחים מהאקדמיה, מהמועצות הלאומיות, ומהאיגודים הרפואיים השונים

לכולכם, שלמי תודה על תרומתכם הרבה

מנהלת תכנית המדדים

דו"ח התוכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל

איכות הטיפול הרפואי הינו גורם מפתח בבריאות האוכלוסייה. משרד הבריאות הציב את נושא איכות הטיפול הרפואי הניתן לאזרחי ישראל בראש סדר העדיפויות שלו, ומתוך כך הכיר בשנת 2004 בתכנית מדדי האיכות ברפואת הקהילה כתכנית לאומית הפועלת בהובלת המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות.

התוכנית הלאומית למדדי איכות ברפואת הקהילה מקיימת מדידה מתמשכת של איכות שירותי המניעה, האבחון והריפוי הניתנים בקהילה על ידי קופות החולים. התכנית שמה לה כיעד לספק לציבור ולקובעי המדיניות מידע על איכות הטיפול הרפואי הניתן על ידי קופות החולים בתחומים שונים, במטרה לשפר ולהיטיב את השירות הרפואי הניתן לתושבי ישראל. התכנית מבצעת באופן תקופתי ושיטתי הערכה של המדדים הקיימים ובוחנת הוספה של מדדים בתחומים שונים הכוללים רפואה ראשונית, רפואה מונעת, רפואת מומחים ורפואת ילדים.

הדו"ח הנוכחי כולל הערכת איכות הטיפול במגוון תחומים חשובים של רפואת הקהילה, בכלל זה, קידום בריאות, בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן, סוכרת, בריאות הנפש, מחלות לב וכלי דם, שימוש באנטיביוטיקה, בריאות ילדים ומבוגרים. בפרק בריאות המבוגרים נכלל השנה לראשונה המדד לטיפול תרופתי הולם לאחר שבר בצוואר הירך בבני 65-85.

משרד הבריאות שם לעצמו למטרה לצמצם פערים בבריאות האוכלוסייה בישראל. כל המדדים מוצגים לפי גיל, מין ומצב חברתי-כלכלי. מצב חברתי-כלכלי נמדד על פי האשכול של האזור הסטטיסטי של כתובת המגורים, ובכך מאפשר זיהוי פערים, כשלב ראשון במסע החשוב לצמצום אי-שוויון בבריאות.

אני שמח לראות כי ממצאי הדו"ח, המבוססים על נתוני קופות החולים, מצביעים על כך שבשנת 2018 איכות הטיפול הרפואי שמרה על רמה גבוהה ואף הראתה שיפור משמעותי במספר מדדים.

התכנית מבוססת על שיתוף פעולה ייחודי של גורמים רבים, בכלל זה משרד הבריאות, ארבע קופות החולים, מומחים מהאקדמיה, המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות וההסתדרות הרפואית. בטוחני ששיתוף פעולה זה ילווה את התכנית גם בעתיד מתוך מטרה אחת של שיפור השירות הניתן לאזרחי המדינה לקיום היעד של קידום הבריאות של אוכלוסיית ישראל.

בברכה,

משה בר סימן טוב

570500619

11	הקדמה
13	מבוא
16	שיטות
20	תרשים מפת מדדי איכות 2018
21	תוצאות
21	טבלת מדדי איכות ושיעורים 2018-2014
25	עיקר הממצאים
39	ממצאים לפי תחומים:
39	קידום בריאות
61	בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן
77	ילדים ובני נוער
97	מבוגרים בני 65 ומעלה
129	מחלות נשימתיות
149	לב וכלי דם
177	סוכרת
261	אנטיביוטיקה
271	בריאות הנפש
303	ממצאים נבחרים לפי קופות
325	קיצורים
327	נספח - מדדי איכות וממצאים לשנת 2018 לפי חברות בקופת חולים

הקדמה

דו"ח זה מופק על ידי התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל בשיתוף עם ארבע קופות החולים, על מנת להעריך את איכות הטיפול הרפואי בקהילה, שיפורים ושינויים שחלו באיכות הטיפול לאורך זמן ופערים באיכות הטיפול בין קבוצות אוכלוסייה שונות, ומציג את תוצאות המדדים לשנים 2014-2018.

הדו"ח מבוסס על נתונים מארבע קופות החולים בישראל, ומציג נתונים לאומיים כמו גם נתונים עבור מדדים נבחרים לפי קופות החולים, בתשעה תחומים קליניים מרכזיים ברפואת הקהילה בישראל. בדו"ח זה מוצגים לראשונה מדדים בתחום בריאות הנפש. הנתונים המוצגים בדו"ח נבדקו ואושרו על ידי בודקת חיצונית מוסמכת.

אנו מקווים כי דו"ח זה ישמש את הקהל הרחב, נותני השירותים בקהילה וקובעי המדיניות.

לאיכות הטיפול הרפואי חשיבות רבה במערכת אספקת שירותי הבריאות. למושג המורכב של איכות הטיפול הרפואי הוצעו בספרות מספר הגדרות. אחת מהן מגדירה איכות טיפול כמידה שבה שירותי הבריאות מגדילים את ההסתברות לתוצאי בריאות רצויים, בהתאם לספרות המקצועית המעודכנת (1).

אחד הפרסומים המכוננים בתחום איכות הטיפול הרפואי ראה אור בשנת 2001 על ידי המכון הרפואי האמריקאי (Institute of Medicine, US). פרסום זה הגדיר מסגרת אנליטית לבחינת איכות המערכת הרפואית. זאת, לצד הצעת יעדי שיפור מרכזיים, קווים מנחים ליחסי רופא-חולה, צעדים לקידומה של רפואה מבוססת-ראיות, וכן מסגרת ארגונית להסדרת מנגנוני תמריצים כך שיעלו בקנה אחד עם קריטריונים של איכות הטיפול. מסגרת זו מתווה קריטריונים עיקריים לפיהם נבחנת איכות הטיפול הרפואי (2).

- **בטיחות הטיפול** - מידת ההימנעות מנזק כתוצאה מהטיפול
- **מועילות הטיפול** - מתן טיפול מבוסס-ראיות, לכל המטופלים להם הוא מתאים, ולהם בלבד (כלומר הימנעות הן מתת-טיפול והן מעודף טיפול)
- **התאמת הטיפול** ("המטופל במרכז") - מידת ההתחשבות בהעדפות, הצרכים והערכים של המטופלים
- **תזמון הטיפול** - מתן טיפול תוך זמן מתאים (צמצום זמני המתנה ועיכובים העלולים לגרום לנזק)
- **יעילות הטיפול** - ניצול מיטבי של המשאבים הקיימים
- **שוויוניות הטיפול** - הבטחת טיפול שאינו משתנה באיכותו בעקבות מאפיינים אישיים כמו מין, מוצא ומעמד חברתי-כלכלי

בשנת 1995 הוחל חוק ביטוח בריאות ממלכתי בישראל. החוק קובע סל שירותים אחיד המסופק על ידי ארבע קופות החולים לכל התושבים. חיוניותה של איכות הטיפול הרפואי משתקפת בנוסח החוק, הקובע כי הוא מושתת על ערכי "צדק, שוויון ועזרה הדדית" וכן כי "שירותי בריאות הכוללים בסל השירותים יינתנו לפי שיקול רפואי, באיכות סבירה, תוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום המגורים של המבוטח". על משרד הבריאות הוטלה האחריות לבקרה על יישום החוק ובעקבותיו הוקמו גופים שמטרתם "ללוות ולהעריך את השפעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי על שירותי הבריאות בישראל, איכותם, יעילותם ועלותם" הכוללים את מועצת הבריאות והמכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות בישראל.

לאור זאת, התעורר הצורך בהקמת מערך מדידה של איכות הטיפול ברפואת הקהילה בישראל. במרץ 2004 הכריז משרד הבריאות על "התכנית הלאומית למדדי איכות הטיפול ברפואת הקהילה בישראל" כעל תכנית לאומית. התכנית היוותה המשך ליוזמה מחקרית של אוניברסיטת בן-גוריון בשיתוף ארבע קופות החולים. שיתוף הפעולה של ארבע הקופות יחד עם מנהלת אקדמית בקביעת המדדים, מדידתם באופן שוטף ופרסומם ראוי לציון ומהווה אחת מאבני היסוד של הצלחת התכנית. בראשית 2010 התחלפה מנהלת התכנית, והביצוע הופקד בידי צוות מביה"ס לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית בירושלים והדסה.

התכנית שמה לה כיעד לספק לציבור ולקובעי המדיניות מידע על איכות הטיפול הרפואי הניתן על ידי קופות החולים בתחומים שונים, במטרה לשפר ולהיטיב את השירות הרפואי הניתן לתושבי ישראל. להשגת יעד זה, התכנית מפרסמת מדי שנה ברמה הארצית את תוצאותיה של סדרה של מדדי איכות הטיפול בקהילה (להלן "המדדים"). מעקב זה מאפשר הערכה של ההתפתחויות באיכות הטיפול לאורך זמן וזיהוי מוקדים הדורשים התערבות לציין כי תכניות דומות בהיקפים שונים פותחו במשך העשורים האחרונים, במדינות שונות כגון ארה"ב (3), שבדיה (4), אוסטרליה (5), אנגליה (6), ועל ידי ה־ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (7). חלק בלתי נפרד מהתכנית הוא השוואת הביצועים במערכת הישראלית, במידת האפשר, לביצועים המושגים בארצות אחרות המפרסמות את תוצאותיהם של מדדים דומים.

התכנית הציבה לעצמה רף "איכות מדידה" גבוה. המדדים נבחרים בקפידה, בקונסנזוס של נציגי קופות החולים, תוך התבססות הן על הניסיון והספרות הבינלאומיים והן על היועצות עם מגוון מומחים קליניים ונציגי המועצות הלאומיות. חישובם עובר תהליכי בקרה פנימית וחיצונית קפדניים.

מדדים שנכללים בתכנית הישראלית מתייחסים לאיכות הטיפול הקליני כפי שמותווה בהנחיות המקצועיות המקובלות בארץ ובעולם ובספרות המקצועית.

המדדים נבחרו לאור הקריטריונים הבאים:

1. חשיבות ורלבנטיות - המדדים משקפים את איכות הטיפול במחלות השכיחות יחסית באוכלוסייה ובתחומים רלבנטיים לעשייה ברפואת הקהילה.
2. מבוססי ראיות - המדדים משקפים את איכות הטיפול במחלות בהן ישנן ראיות מבוססות לכך שהטיפול הרפואי יעיל ותורם לצמצום התחלואה.
3. כמותיות - המדדים משקפים את איכות הטיפול בתחומים קליניים בהם הן התחלואה והן צמצומה ניתנים לכימות נאות ואמין.
4. ישימות - המדדים משקפים את איכות הטיפול בתחומים בהם הנתונים זמינים ואמינים.
5. הטמעה - המדדים ניתנים להטמעה ברפואת הקהילה.

סדרת המדדים כוללת מספר סוגים:

- מדדי תחלואה (למשל שיעור חולי אסתמה באוכלוסייה)
- מדדי איכות הטיפול הרפואי, הנחלקים ל־
 - מדדי ביצוע (למשל שיעור חולי אסתמה המקבלים טיפול מתאים)
 - מדדי תוצאה (למשל שיעור חולי סוכרת עם רמת HbA1c מאוזנת)

כל המדדים, למעט מדדי השימוש בתרופות אנטיביוטיות, מוגדרים כמדדי יחס. כלומר, שיעור האנשים מתוך קבוצה מוגדרת שמתקיים לגביהם תנאי מסוים (למשל שיעור מקבלי חיסון נגד שפעת בקרב בני 65 ומעלה).

כבדו"חות קודמים, בנספח לדו"ח מתפרסם פילוח של כלל מדדי האיכות לפי קופות החולים, מין, גיל ומצב חברתי-כלכלי. פרסום לפי קופה מספק מידע רלבנטי לכל המעורבים, בכלל זה קופות

החולים, משרד הבריאות, איגודים רפואיים וכמובן ציבור המבוטחים. ראוי לציין, כי מפרסום של הסוכנות האמריקאית לחקר ואיכות שירותי הבריאות (US Agency for Healthcare Research and Quality - AHRQ) עולה, כי למרות שהיוזמה לפרסם את מדדי האיכות לפי ספקי שרות נועדה בעיקר כדי לסייע לחולים לבחור את ספק השרות, הרי שקהל היעד העיקרי של הממצאים היו ספקי השרות עצמם. חשוב להדגיש כי למדדים המוצגים בדו"ח מספר מגבלות המפורטות בנספח ביחס למידת הדיוק והמלאות שבה הם מציגים את איכות הטיפול הניתן בקופה.

מקור הנתונים

הנתונים המוצגים בדו"ח מבוססים על מידע המצוי בידי ארבע קופות החולים הפועלות בישראל. קופות החולים העבירו למנהלת את הנתונים מרצונן, במסגרת השתתפותן הפעילה בתוכנית מדדי האיכות. הנתונים שהועברו מהקופות למנהלת הם מקובצים, ולפיכך אנונימיים לחלוטין ואינם כוללים פרטים מזהים כלשהם. העברת הנתונים בצורה זו מאפשרת שמירה קפדנית על עיקרון החיסיון הרפואי.

איסוף המידע מתבסס על מאגרי הנתונים הממוחשבים של קופות החולים ומאפשר בחינה וניטור של המדדים השונים על פי קבוצת גיל, מין ומצב חברתי-כלכלי.

אוכלוסיית הדו"ח

התכנית מבוססת על נתוני כלל אוכלוסיית המבוטחים בארבע קופות החולים, שהם כלל התושבים במדינת ישראל, למעט חיילים ואסירים. עם זאת, עבור כל שנת מדד לא נכללו מבוטחים אשר לא השלימו בשנת המדד שנת חברות מלאה באותה קופה, לרבות מי שנפטרו או נולדו במהלך השנה, אלה שעברו בין הקופות באותה שנה, וכן מבוטחים השוהים בחו"ל מעל שנתיים (בסך הכל כ-228,400 תושבים המבוטחים על ידי קופות החולים, אינם נמנים על אוכלוסיית הדו"ח (8)). הדו"ח כולל עבור שנת 2018 כ-8.3 מיליון תושבים.

יש להוסיף כי במגוון מדדים, המדידה מתאפשרת כחלק מביקור אצל רופא המשפחה. אולם, אין בכך בכדי להטיל מגבלה של ממש על הנתונים שכן, כפי שהראה מחקר שנערך בקרב מבוטחי קופת חולים כללית, מרבית המבוטחים מבקרים אצל רופא המשפחה באופן תדיר: למעלה מ-90% מבקרים מידי שנה ו-97% מבקרים פעם בחמש שנים (9).

משתנים

עבור כלל המדדים, הנתונים מוצגים לכלל האוכלוסייה הרלבנטית על פי שנה, מין, קבוצות גיל ומצב חברתי-כלכלי.

מצב חברתי-כלכלי נקבע בדו"ח זה על סמך האשכול אליו משויך האזור הסטטיסטי של כתובת המגורים. לאחר מפקדי אוכלוסין, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) מחלקת את אזורי המגורים לאזורים גאוגרפים סטטיסטיים (אג"סים) המקבלים ציון כלכלי-חברתי (אשכולות בעלי ציון בטווח 1-20) (10). חברת פוינטס מטייבת חלוקה זו ומעדכנת את הציון הכלכלי-חברתי באמצעות הוספת מידע ממקורות שונים, הכוללים בין השאר מידע צרכני המתקבל מחברות מסחריות, נתונים של מחירי נדל"ן וממצאים מפרסומים עדכניים על האוכלוסייה. פוינטס משלימה את שיוכם של כלל אזורי המגורים לאג"סים (גם עבור אזורי מגורים אשר טרם סווגו ע"י הלמ"ס, בפרט שכונות מגורים חדשות), ומקבצת את 20 האשכולות ל-10 דרגות (כך שכל שני אשכולות עוקבים מהווים קבוצה). נכון לשנת 2018, כל ארבע קופות החולים בישראל כללו את נתוני חברת

פוינטס ברשומותיהם. המידע אודות משתנה זה הועבר לתכנית (בסולם של 1-10) כחלק מהמידע המקובץ עבור כל מדד ומדד. עבור 4.4% מהמבוטחים כתובות המגורים לא היו שלמות, ולכן הם לא השתתפו בניתוח הנתונים לפי מעמד כלכלי-חברתי. כתוצאה מאי-שלמות המידע אודות מצב חברתי-כלכלי, כאמור, קיימים לאורך הדו"ח הפרשים במספרים המוחלטים ובשיעורים בין טבלאות ותרשימים עם וללא פילוח לפי מצב חברתי-כלכלי.

כלל המדדים המפורסמים בדו"ח זה רובדו לארבע קבוצות מצב חברתי-כלכלי. המעבר מ-10 דרגות ל-4 קבוצות נועד להקל על ההצגה ועל קריאת הנתונים, ונעשה כך שתיווצרנה ארבע קבוצות הדומות ככל האפשר בגודלן: קבוצה 1 (בעלת הדרוג החברתי-כלכלי הנמוך ביותר) כוללת את ציוני פוינטס 1-3 ומהווה 21.0% מהאוכלוסייה, קבוצה 2 כוללת את ציוני פוינטס 4-5 ומהווה 28.8% מהאוכלוסייה, קבוצה 3 כוללת את ציוני פוינטס 6-7 ומהווה 30.6% מהאוכלוסייה וקבוצה 4 (בעלת הדרוג הגבוה ביותר) כוללת את ציוני פוינטס 8-10 ומהווה 15.3% מכלל אוכלוסית הדו"ח.

תקנון

בעת ההשוואה בין ביצועי ארבע הקופות עבור משתנים נבחרים בוצע תקנון ישיר. זאת כדי לנטרל ככל האפשר את השפעתם של הבדלים בתמהיל האוכלוסייה בקופות השונות על תוצאות המדדים. התקנון בוצע למין, לגיל ולמצב חברתי-כלכלי, כאשר אוכלוסיית התקן הייתה כלל אוכלוסיית המדד הנבחן בארבע הקופות גם יחד.

שלבי העבודה

העבודה לקראת הכנת דו"ח זה כללה את השלבים הבאים:

1. קביעת אוסף המדדים שיכללו בדו"ח ובחינת המפרטים של מדדים אלו

הדו"ח הנוכחי כולל את מרבית המדדים הקיימים בתכנית, במטרה לשקף מידע מקיף ככל האפשר. זו השנה השנייה בה נכללים בדו"ח מדדים בתחום בריאות הנפש: מדד העוסק ברצף הטיפול, ואומד ביצוע מעקב מרפאתי לאחר שחרור מאשפוז פסיכיאטרי, ומדדים העוסקים בניטור תחלואה גופנית בקרב אנשים עם הפרעה נפשית קשה: סוכרת (הימצאות ואיזון המחלה), והשמנה (ניטור ושיעור ההימצאות).

2. הפקת הנתונים תוך כדי מבדק

הנתונים המופקים על ידי מערכות המידע של הקופות נבדקו בשלוש רמות: מבדק פנימי של כל קופה, מבדק של המנהלת ומבדק באמצעות בודק חיצוני. המבדקים נועדו להשיג רמה גבוהה של אחידות, מהימנות ותוקף בנתוני הקופות השונות. מבדק המנהלת כלל בדיקות לוגיות ובכלל זה בחינת המדדים בחתכים שונים ובדיקת מגמות על פני זמן. המבדק החיצוני התמקד בבחינת תהליכי ההפקה ובחן הן את התהליכים הקשורים בהפקת המדדים בקופות והן את אלו הקשורים בהפקת המדד לכלל האוכלוסייה על ידי המנהלת. במסגרת המבדקים נבחנו תהליכי עבודה מתודולוגיים, תהליכי בקרה, נבדק התיעוד, ונבחנו הפעילות המתקנת שנעשתה לאור ממצאי המבדק הקודם. גישה זו מאפשרת שיפור מתמיד בהפקת הנתונים. נושאים שזכו לדגש מיוחד בהפקת הנתונים לדו"ח הנוכחי כוללים, בין השאר, הרחבה ושיפור האחידות בתהליכי הבדיקות הלוגיות המבוצעות על ידי הקופות, שיפור האחידות בתהליכי ההפקה בין הקופות, בחינת מגוון מקורות המידע בכל קופה (מעבדות, תיק רפואי, בתי מרקחת), ובדיקה מדגמית של קודי תוכנה.

גם בהפקת הנתונים לדו"ח זה עשתה המנהלת שימוש מקיף במערכת ממוחשבת לניסוח האלגוריתמים המצויה בשימוש מאז הדו"ח לשנת 2015, המאחדת קבצי הגדרות ומאפשרת סטנדרטיזציה, וכך מקטינה סיכון לטעויות.

3. תיקוף הממצאים

נעשה שימוש במקורות מידע נוספים, בכלל זה סקרי בריאות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקרי משרד הבריאות, והתייעצות עם מומחים, כדי לתקף את התוצאות המוצגות.

איכות הנתונים


דו"ח זה מבוסס על נתוני כלל האוכלוסייה ולא על מדגם, ולפיכך הנתונים המוצגים כאן אינם כרוכים בטעות דגימה. אולם, יתכנו מקורות אחרים לטעויות בנתונים. שיטת הפקת הנתונים שנבנתה, הכוללת מערך מבדקים מקיף ותיקוף הממצאים תוך כדי שימוש במקורות מידע שונים, הומלצה בדו"ח שיצא על ידי ה-AHRQ (11). גישה זו נועדה להקטין את הטעויות השונות, ובכלל זה את השונות בין הקופות ביחס לתיעוד וקידוד מאפייני המבוטחים, והביאה בוודאי להקטנת הטעויות, אך לא העלימה אותן לחלוטין. לפיכך, ראוי להתייחס בזהירות לשינויים קלים בנתונים בין קבוצות או בין שנים שונות.

מבנה הדו"ח

הדו"ח מציג מידע עבור 76 מדדי איכות בתשעה תחומים, במבנה הבא:

- השיעור של כל אחד מהמדדים לכלל האוכלוסייה הרלבנטית לכל מדד, לחמש השנים האחרונות, כלומר 2014-2018. מדדים אשר התווספו בארבע השנים האחרונות מוצגים בהתאם לזמינות המידע.
- תמצית הממצאים לפי תחומים בה מפורטים הממצאים העיקריים בכל מדד לפי שנה, מין ומצב חברתי-כלכלי.
- דוח מפורט עבור כלל המדדים, תוך פירוט השיעורים:
 - ✓ לפי שנה, 2014-2018
 - ✓ לפי מצב סוציאקונומי ומין
 - ✓ לפי גיל ומין
- בתחום בריאות הנפש מוצגים שיעורי העמידה במדדים השונים תוך השוואה לשיעורם באוכלוסייה הכללית.
- נתונים לאומיים ונתונים לפי קופה לשנת 2018, המתוקננים למין, גיל ומצב חברתי-כלכלי, עבור שבעה מדדים נבחרים מתחומים שונים.
- נספח הכולל פילוח של מדדי האיכות לפי קופות החולים, ולפי מין, גיל, ומצב חברתי-כלכלי לשנת 2018.

תרשים 1 | מפת מדדי האיכות לרפואה הקהילה 2018



טבלה 1 מדדי איכות ושיעורים 2018-2014

מזד	2018	2017	2016	2015	2014
קידום בריאות					
שיעור התייעוד של מרכיבי BMI בקרב בני 20-64	89.6%	90.4%	90.8%	89.7%	88.2%
שיעור ההמצאות של תת משקל בקרב בני 20-64	2.6%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
שיעור ההמצאות של עודף משקל בקרב בני 20-64	34.4%	34.5%	34.6%	34.4%	34.2%
שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב בני 20-64	23.8%	23.5%	23.2%	23.1%	23.0%
שיעור תיעוד מצב עישון בקרב בני 16-74	90.7%	91.8%	91.9%	91.0%	87.9%
שיעור עישון בקרב בני 16-74	19.1%	18.9%	19.2%	19.6%	20.3%
בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן					
שיעור הביצוע של ממוגרפיה לגילוי מוקדם של סרטן השד בנשים בנות 50-74	72.5%	71.0%	70.4%	69.6%	69.3%
שיעור הביצוע של בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס בקרב בני 50-74	64.7%	63.8%	59.0%	59.4%	58.3%
שיעור הנשים בגילאים 35-54 אשר ביצעו בדיקות סיקור לסרטן צוואר הרחם ב־ 3 השנים האחרונות	51.5%	49.9%	48.7%	48.2%	48.1%
שיעור הנשים בגילאים 35-54 אשר לא ביצעו בדיקת סיקור לסרטן צוואר הרחם ב־ 5 השנים האחרונות	34.8%	35.9%	36.6%	37.6%	39.0%
ילדים ובני נוער					
שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין בתינוקות בני 9-18 חודשים	88.3%	88.0%	87.7%	86.4%	85.3%
שיעור ההימצאות של אנמיה בקרב תינוקות בני 9-18 חודשים	8.2%	7.8%	8.8%	7.9%	8.1%
שיעור התייעוד של מרכיבי BMI בקרב ילדים בני 7	79.2%	79.8%	79.9%	77.9%	75.2%
שיעור ההימצאות של רזון (Thinness) בקרב ילדים שמלאו להם 7 שנים בשנת המדד	4.3%	4.5%	4.5%	4.1%	4.3%
שיעור ההימצאות של עודף משקל בקרב ילדים שמלאו להם 7 שנים בשנת המדד	11.2%	11.9%	12.6%	13.0%	13.2%
שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב ילדים שמלאו להם 7 שנים בשנת המדד	6.9%	7.1%	7.6%	8.1%	7.9%
שיעור התייעוד של מרכיבי BMI בקרב בני 14-18	76.8%	75.2%	75.1%	75.4%	74.5%
מבוגרים בני 65 ומעלה					
שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בקרב בני 65 ומעלה	60.4%	61.0%	63.1%	64.3%	63.4%

מדד	2014	2015	2016	2017	2018
שיעור קבלת חיסון נגד פניאומוקוק בקרב בני 65-74	76.6%	78.1%	78.4%	78.0%	77.5%
שיעור התייעוד של מרכיבי BMI בקרב בני 65-84	79.1%	81.4%	79.7%	80.2%	79.6%
שיעור תת משקל בקרב מבוגרים בני 75 ומעלה*	14.9%	14.9%	14.2%	14.2%	14.3%
שיעור המבוגרים בני 65 ומעלה שחלה ירידה חדה במשקלם בשנתיים האחרונות	6.1%	6.3%	6.4%	6.3%	6.2%
שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב בני 65-84	33.3%	33.1%	33.2%	33.2%	33.0%
שיעור שימוש היתר בבנוזדיאזפינים בקרב בני 65 ומעלה	5.2%	5.3%	4.8%	5.0%	4.8%
שיעור השימוש בבנוזדיאזפינים ארוכי טווח בקרב בני 65 ומעלה	2.6%	2.5%	2.4%	2.3%	2.2%
טיפול תרופתי הולם בבני 65-85 לאחר שבר בצוואר הירך	-	25.5%	25.9%	24.8%	28.1%
מחלות נשימתיות					
שיעור ההימצאות של אסתמה מתמשכת בקרב בני 5-45	0.8%	0.9%	0.8%	0.8%	0.8%
שיעור יחס התרופות לאסתמה (AMR) גדול או שווה 0.5 בקרב בני 5-45	67.4%	66.8%	68.9%	70.1%	70.9%
שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בקרב חולי אסתמה מתמשכת בני 5-45	41.7%	42.1%	36.7%	35.2%	35.3%
שיעור הביצוע של ספירומטריה בקרב חולי COPD ואוכלוסייה בסיכון גבוה ל־ COPD בני 50-75	57.9%	67.3%	70.8%	73.7%	75.5%
תיעוד ערכי בדיקת ספירומטריה בקרב חולי COPD ואוכלוסייה בסיכון גבוה ל־ COPD בני 50-75	10.9%	13.8%	25.3%	33.2%	38.9%
לב וכלי דם					
שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול בקרב בני 35-54	86.1%	87.5%	88.2%	88.3%	88.1%
שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול בקרב בני 55-74	76.7%	76.2%	75.3%	75.8%	75.3%
שיעור עמידה ביעד LDL לפי קבוצת סיכון למחלות לב בקרב בני 35-74	83.9%	83.3%	83.3%	84.2%	84.2%
שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל־160 מ"ג/ד"ל בקבוצת סיכון נמוך למחלות לב בבני 35-74	89.8%	89.4%	89.5%	90.2%	90.4%
שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל־130 מ"ג/ד"ל בקבוצת סיכון בינוני למחלות לב בבני 35-74	72.8%	72.0%	72.2%	73.1%	73.1%
שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל־100 מ"ג/ד"ל בקבוצת סיכון גבוה למחלות לב בבני 35-74	30.8%	29.3%	30.7%	33.3%	34.4%
שיעור התייעוד של מדידות לחץ דם בקרב בני 20-54	91.2%	92.7%	93.1%	92.9%	92.5%
שיעור התייעוד של מדידות לחץ דם בקרב בני 55-74	81.9%	83.1%	81.1%	81.5%	80.8%

מדד	2014	2015	2016	2017	2018
שיעור הטיפול בתרופות להורדת LDL לאחר ניתוח מעקפים ו/או צינתור לבבי בקרב בני 80-35	82.2%	82.5%	82.4%	82.3%	82.4%
שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל או טיפול בסטטינים בעצמות גבוהה לאחר צנתור לבבי / ניתוח מעקפים בקרב בני 80-35	57.2%	60.1%	63.2%	65.9%	67.9%
סוכרת					
שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב בני 18 ומעלה	9.7%	9.7%	9.7%	9.6%	9.7%
שיעור הביצוע של בדיקת HbA1c בחולי סוכרת בני 18 ומעלה	90.0%	90.2%	89.8%	90.9%	90.7%
שיעור בעלי רמת HbA1c מאוזנת בחולי סוכרת בני 18-84	66.4%	67.6%	69.6%	69.7%	70.8%
שיעור בעלי רמת HbA1c גבוהה מ-9% בחולי סוכרת בני 18 ומעלה	11.6%	11.0%	10.3%	10.0%	9.6%
שיעור הביצוע של בדיקות עיניים בחולי סוכרת בני 18-84	75.0%	75.9%	72.8%	72.7%	72.5%
שיעור הביצוע של בדיקות לאיתור חלבון בשתן בחולי סוכרת בני 18-84	78.6%	79.7%	79.4%	81.0%	81.2%
שיעור התייעוד של GFR בחולי סוכרת בני 18-84	91.5%	91.8%	91.3%	92.5%	92.2%
שיעור חולי סוכרת עם פגיעה כלייתית בני 18-84	30.5%	31.1%	31.5%	32.7%	32.1%
שיעור התייעוד של מדידות לחץ דם בחולי סוכרת בני 18 ומעלה	90.0%	91.6%	90.7%	91.5%	90.7%
שיעור בעלי לחץ דם נמוך או שווה ל-140/90 מ"מ"כ בחולי סוכרת בני 18 ומעלה	83.7%	83.6%	83.3%	83.0%	83.0%
שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול בחולי סוכרת בני 18 ומעלה	90.8%	90.8%	90.1%	91.3%	90.9%
שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל בחולי סוכרת בני 18-80	63.1%	63.4%	64.0%	65.9%	66.0%
שיעור התייעוד של מרכיבי BMI בחולי סוכרת בני 20-64	-	88.0%	85.1%	86.1%	84.8%
שיעור ההימצאות של עודף משקל בקרב חולי סוכרת בני 20-64	34.7%	35.0%	34.9%	35.0%	35.0%
שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב חולי סוכרת בני 20-64	30.3%	30.4%	30.5%	30.4%	30.4%
שיעור ההימצאות של השמנת יתר חולנית בקרב חולי סוכרת בני 20-64	21.4%	21.0%	20.8%	20.7%	20.6%
שיעור התייעוד של מרכיבי BMI בחולי סוכרת בני 65-84	-	90.5%	88.5%	89.3%	88.4%

מדד	2018	2017	2016	2015	2014
שיעור ההימצאות של השמנת יתר והשמנת יתר חולנית בקרב חולי סוכרת בני 65-84	43.3%	43.7%	43.9%	43.9%	44.1%
שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בחולי סוכרת בני 18 ומעלה	59.8%	61.0%	62.0%	63.6%	61.6%
שיעור קבלת חיסון נגד פניאומוקוק בחולי סוכרת בני 65-74	84.4%	84.8%	84.6%	84.0%	81.6%
שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב בני 2-17	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
שיעור המבקרים במרפאת סוכרת ילדים בקרב חולי סוכרת בני 2-17	86.8%	86.7%	88.1%	87.4%	87.2%
שיעור הביצוע של בדיקת HbA1c בחולי סוכרת בני 2-17	77.4%	79.2%	80.6%	76.7%	75.4%
שיעור בעלי רמת HbA1c גבוהה מ-9% בחולי סוכרת בני 2-17	34.0%	34.9%	35.7%	37.0%	37.1%
שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בחולי סוכרת בני 2-17	41.1%	41.6%	46.3%	54.8%	49.8%
תרופות אנטיביוטיות					
היקף השימוש בתרופות אנטיביוטיות סיסטמיות, ל-1000 איש, ליום	19.12	19.29	19.04	21.49	20.76
פרופורציית השימוש בתרופות אנטיביוטיות מקו שני מתוך סך התרופות האנטיביוטיות	25.2%	25.5%	26.4%	24.2%	22.1%
בריאות הנפש					
שיעור המפגשים הטיפוליים עם אנשי בריאות הנפש בקהילה תוך 14 יום משחרור מאשפוז פסיכיאטרי ממושך	37.3%	35.5%	35.4%	32.5%	-
שיעור ההימצאות של מחלת נפש קשה (SMI) בקרב בני 18 ומעלה	1.3%	1.3%	1.2%	1.3%	-
שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב חולי SMI, בני 18 ומעלה	14.9%	14.7%	14.8%	13.9%	-
שיעור הביצוע של בדיקת HbA1c בקרב חולי SMI וסוכרת, בני 18 ומעלה	89.9%	90.0%	89.4%	89.6%	-
שיעור בעלי רמת HbA1c מאוזנת בקרב חולי SMI וסוכרת בני 18-84	71.8%	71.1%	70.7%	67.7%	-
שיעור בעלי רמת HbA1c גבוהה מ-9% בקרב חולי SMI וסוכרת, בני 18 ומעלה	10.9%	11.1%	11.6%	11.6%	-
שיעור התייעוד של מרכיבי BMI בקרב חולי SMI, בני 20-64	54.0%	55.1%	55.9%	61.2%	-
שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב חולי SMI, בני 20-64	40.9%	40.7%	40.3%	38.0%	-

* שינוי בטווח הגילאים המפורסם

בדו"ח זה, מדדי איכות במגוון תחומים של רפואת הקהילה נבחנו באופן רצוף ושיטתי, והם מוצגים בו לפי תחום. עבור כל מדד הנתונים מוצגים לפי שנה, גיל, מין ומצב חברתי-כלכלי.

הדו"ח לשנת 2018 מצביע על המשך מגמת השיפור בחלק מהמדדים שנבדקו, יציבות ניכרת של חלק אחר מהמדדים, ומגמת ירידה במיעוט המדדים. מגמות השיפור והאחזקה הן פרי עבודה מאומצת וממוקדת המושקעת על ידי הקופות בפעילותן ברפואת הקהילה.

זו השנה הראשונה בה נכלל מדד אודות טיפול בחולים לאחר שבר בצוואר הירך, הבוחן את שיעור החולים אשר קיבלו טיפול תרופתי הולם. שיעור העמידה במדד זה אומנם נמוך מאוד, אך כבר נצפתה עליה בהשוואה לשנים קודמות עבורן נבחן המדד. כמו כן, נצפים בו פערים ניכרים הן לפי מין, הן לפי מצב חברתי-כלכלי.

בדו"ח הנוכחי אנו עדים ליציבות מתמשכת בשיעור ההימצאות של מחלת הסוכרת בקרב מבוגרים בישראל. לאחר 11 שנים של עליה מונוטונית בשיעורי ההימצאות, בחמש השנים האחרונות השיעורים נותרו יציבים (9.6%-9.7%).

מגמות שיפור בולטות בשנת 2018 ממשיכות את המגמות שנצפו בשנה הקודמת. בהן, עליה מתמשכת בשיעורי הסיקור לסרטן המעי הגס, לסרטן צוואר הרחם, ולסרטן השד. כמו כן, נצפית ירידה מתונה אך עקבית בשיעור השמנת-היתר בקרב ילדים. ניכר שיפור מתמשך באיזון סוכרת, בביצוע ובתיעוד בדיקות ספירומטריה בקרב חולים ומבוטחים שהינם בסיכון גבוה ל-COPD, ירידה בשימוש בבנוזדיאזפינים ארוכי-טווח (תרופות מיישנות) בקרב קשישים, וכן מגמת שיפור מתמשכת במדדי איזון כולסטרול (מניעה ראשונית באוכלוסיה המצויה בסיכון גבוה, וכן במניעה שניונית בקרב חולי לב). כמו כן, מגמת העליה בשיעור השימוש בתרופות אנטיביוטיות מקו שני אשר דווחה בעבר, נבלמה על-פי נתוני השנתיים האחרונות.

מאידך, בשנת 2018 נמשכה הירידה בשיעור המתחסנים נגד מחלת השפעת אשר החלה כבר ב-2016, וכן נבלמה מגמת הירידה המתונה שנצפתה בשנים קודמות בשיעור המעשנים.

למרות שמרבית המדדים מציגים שיפור מתמשך בקרב כלל האוכלוסייה, ובחלק מהמדדים אין פערים כלכליים-חברתיים, הרי שבמספר לא מבוטל של מדדים קיימים פערים ניכרים על רקע חברתי-כלכלי. בולטים הפערים במדדי הסיקור לסרטן צוואר הרחם, בשיעורי חולי הסוכרת שאינם מאוזנים במבוגרים וילדים, וכן בשיעורי הרזון בקרב ילדים. כמו כן, נצפו פערים על רקע חברתי-כלכלי במדדי ההשמנה במבוגרים וילדים, בשיעור המעשנים, וכן בהימצאות סוכרת במבוגרים. יש לציין כי הדו"ח מצביע גם על פערים מגדריים בולטים במדדי עודף שימוש בבנוזדיאזפינים ובאנטיביוטיקה, במדד הטיפול התרופתי לאחר שבר בצוואר הירך, וכן במדדים העוסקים במניעה הראשונית באוכלוסייה המצויה בסיכון גבוה למחלות לב וכלי דם, ובמניעה השניונית. הצגתם של נתונים אלה מהווה הזדמנות לפעולה והתגייסות משותפת של מערכת הבריאות לטובת צמצום פערים בבריאות בחברה הישראלית.

לסיכום, אנו מקווים כי הנתונים בדו"ח, יחד עם מידע הקיים ממקורות שונים לגבי עלויות ותועלות כלכליות ושיעור הרצון של המבוטחים, יאפשרו קבלה של תמונה מקיפה, אשר תסייע לקובעי מדיניות לקבל החלטות מושכלות להמשך שיפור הבריאות בחברה הישראלית.

אורחות חיים ורפואה מונעת

קידום בריאות

ניטור משקל גוף

- שיעור התייעוד של מרכיבי BMI בקרב בני 20-64 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 89.6% ב־2018. השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (92.1%) בהשוואה לגברים (86.9%). השיעור בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (91.8%) היה מעט גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (86.1%).
- שיעור ההימצאות של תת משקל בקרב בני 20-64 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 2.6% ב־2018. השיעור היה גבוה פי 2.2 בקרב נשים (3.4%) מאשר בקרב גברים (1.6%). השיעור בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (2.3%) היה נמוך בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (2.7%).
- שיעור ההימצאות של עודף משקל בקרב בני 20-64 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 34.4% ב־2018. השיעור היה נמוך יותר בקרב נשים (29.9%) מאשר בקרב גברים (39.7%). השיעור בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (34.9%) היה מעט גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (33.3%).
- שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב בני 20-64 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 23.8% ב־2018. השיעור היה גבוה יותר בקרב נשים (25.1%) מאשר בקרב גברים (22.3%). השיעור היה גבוה כמעט פי 2 בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (30.5%) בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (16.1%).

עישון

- שיעור תיעוד מצב העישון בקרב בני 16-74 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 90.7% ב־2018. השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (92.1%) מאשר בקרב גברים (89.1%). השיעור בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (91.7%) היה מעט גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (87.3%).
- שיעור העישון בקרב בני 16-74 ירד בין השנים 2014-2017, מ־20.3% בשנת 2014 ל־18.9% בשנת 2017 אך עלה ב־2018 ל־19.1%. השיעור היה גבוה פי 2.2 בקרב גברים (27.0%) בהשוואה לנשים (12.1%). השיעור היה גבוה פי 1.5 בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (19.2%) בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (13.0%), פערים שהיו בולטים בעיקר בקרב גברים.

בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן

סיקור לסרטן השד- ממוגרפיה

- שיעור הביצוע של ממוגרפיה לגילוי מוקדם של סרטן השד בנשים בנות 50-74 עלה בין השנים 2014-2018, מ-69.3% ב-2014 ל-72.5% בשנת 2018, עליה המייצגת כ-70,000 נשים נוספות מתוך אוכלוסיית היעד. השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (66.8%) היה נמוך יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (75.4%). בין השנים 2014 ו-2018 לא נצפה צמצום של הפער בשיעור הביצוע בין שכבות חברתיות-כלכליות אלו.

סיקור לסרטן המעי הגס

- שיעור הביצוע של בדיקות לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס בקרב בני 50-74 עלה בין השנים 2014-2018, מ-58.3% ב-2014 ועד ל-64.7% בשנת 2018, עלייה המייצגת 166,187 מבוטחים נוספים שנסקרו. השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (65.7%) מאשר בקרב גברים (63.7%), ונמוך בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (58.5%) בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (69.8%). בין השנים 2014 ו-2018 לא נצפה צמצום של הפער בין השכבה החברתית-כלכלית החלשה והשכבה החזקה.

סיקור לסרטן צוואר הרחם

- שיעור הנשים בגילאים 35-54 אשר ביצעו סיקור נאות לסרטן צוואר הרחם (ביצעו בדיקת סיקור ב-3 השנים האחרונות) עלה בין השנים 2014-2018, מ-48.1% בשנת 2014 ל-51.5% בשנת 2018. נצפה שיעור סיקור נמוך יותר בקרב נשים בנות 50-54 (46.3%) בהשוואה לנשים בגילאי 35-49 (53%). שיעור הסיקור היה נמוך פי 2 בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (32.8%) בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (63.0%).
- שיעור הנשים בגילאים 35-54 אשר לא ביצעו בדיקות סיקור לסרטן צוואר הרחם ב-5 השנים האחרונות ירד בין השנים 2014-2018, מ-39.0% בשנת 2014 ל-34.8% בשנת 2018. שיעור הנשים אשר לא ביצעו את בדיקת הסיקור היה גבוה יותר בקרב בנות 50-54 (39.8%) בהשוואה לנשים בנות 35-49 (32.7%). שיעור הסיקור היה גבוה פי 2.4 בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (55.4%) בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (23.1%).

ילדים ובני נוער

בדיקת המוגלובין בתינוקות

- שיעור הביצוע של ספירת דם לזיהוי אנמיה (בדיקת המוגלובין) בתינוקות נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 88.3% ב-2018. השיעור היה דומה בקרב בנות ובנים. השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (86.3%) היה מעט נמוך יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (90.5%).
- בשיעור ההימצאות של אנמיה בקרב תינוקות נצפו תנודות קלות, ללא מגמות ברורות לאורך השנים, כאשר השיעור עמד על 8.2% ב-2018. השיעור היה דומה בקרב בנות ובנים. השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (9.1%) היה גבוה בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (7.6%).

תיעוד מדידת גובה ומשקל בילדים ובני נוער

- שיעור התיעוד של מרכיבי BMI בקרב ילדים בני 7 עלה בין השנים 2014-2016, מ־75.2% בשנת 2014 ל־79.9% בשנת 2016 עד להתייצבות ואף ירידה קלה בשנתיים האחרונות, כאשר השיעור בשנת 2018 עמד על 79.2%. השיעור היה דומה בקרב בנות ובנים. השיעור בשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (80.7%) היה מעט גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (75.5%).
- שיעור ההימצאות של רזון בקרב ילדים שמלאו להם 7 שנים נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועומד על 4.3% בשנת 2018. השיעור היה נמוך יותר בקרב בנות (3.8%) מאשר בקרב בנים (4.9%). השיעור היה גבוה פי 2.1 בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (6.1%) בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (3.0%).
- שיעור ההימצאות של עודף משקל בקרב ילדים שמלאו להם 7 שנים בשנת המדד ירד בין השנים 2014-2018, מ־13.2% בשנת 2014 ל־11.2% בשנת 2018. השיעור היה גבוה יותר בקרב בנות (11.6%) מאשר בקרב בנים (10.8%). השיעור הגבוה ביותר נמצא בשכבה החברתית־כלכלית החלשה ביותר (12.0%) ואילו השיעור הנמוך ביותר נצפה בשכבה החברתית־כלכלית החלשה ביותר (10.0%).
- שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב ילדים שמלאו להם 7 שנים בשנת המדד ירד בין השנים 2014-2018, מ־7.9% בשנת 2014 ל־6.9% בשנת 2018. השיעור היה נמוך יותר בקרב בנות (6.5%) מאשר בקרב בנים (7.3%). השיעור הגבוה ביותר נמצא בשכבה החברתית־כלכלית החלשה ביותר (8.3%) ואילו השיעור הנמוך ביותר נצפה בשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (5.5%).
- שיעור התיעוד של מרכיבי BMI בקרב בני 14-18 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 76.8% ב־2018. השיעור היה דומה בקרב בנות ובנים. השיעור בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (72.2%) היה נמוך יותר בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (80.4%).

מבוגרים בני 65 ומעלה

חיסון נגד שפעת

- שיעור המחסונים בקרב בני 65 ומעלה עלה מ־63.4% בשנת 2014 ל־64.3% בשנת 2015, אך ירד בשנים הבאות לכדי 60.4% ב־2018. השיעור היה מעט נמוך יותר בקרב נשים (58.4%) מאשר בקרב גברים (62.9%). לא נצפה קשר מונוטוני עם מצב חברתי־כלכלי, כאשר השיעור הנמוך ביותר נצפה בשכבה החברתית־כלכלית השנייה (57.0%) והשיעור הגבוה ביותר נצפה בשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (65.2%).

חיסון נגד פניאומוקוק

- שיעור החיסון נגד פניאומוקוק בקרב בני 65-74 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 77.5% ב־2018. השיעור היה מעט נמוך יותר בקרב נשים (75.8%) מאשר בקרב גברים (79.5%). השיעור בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (81.6%) היה מעט גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (78.4%).

ניטור משקל גוף

- שיעור התייעוד של מרכיבי BMI בקרב בני 65-84 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 79.6% ב־2018. השיעור היה דומה בקרב נשים וגברים. השיעור בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (82.0%) היה מעט גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (76.7%).
- שיעור ההימצאות של תת משקל ($BMI < 23 \text{ Kg/m}^2$) בקרב מבוגרים בני 75 ומעלה נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 14.3% ב־2018. השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (14.8%) מאשר בקרב גברים (13.5%). השיעור היה נמוך יותר בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (13.2%) בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (16.1%).
- שיעור המבוגרים בני 65 ומעלה שחלה ירידה משמעותית במשקלם בשנתיים האחרונות נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 6.2% ב־2018. השיעור היה גבוה יותר בקרב נשים (7.9%) מאשר בקרב גברים (6.9%). השיעור בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (8.6%) היה גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (6.7%). השיעור עלה עם הגיל והיה גבוה בערך פי 2 בבני 85 ומעלה לעומת בני 65-69.
- שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב בני 65-84 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 33.0% ב־2018. השיעור היה גבוה יותר בקרב נשים (37.2%) מאשר בקרב גברים (28.0%). השיעור היה גבוה פי 1.7 בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (42.9%) בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (24.6%).

שימוש בתרופות ממשפחת הבנזודיאזפינים

- שיעור שימוש היתר בבנזודיאזפינים בקרב בני 65 ומעלה נותר יציב בין השנים 2014-2018, ועמד על 4.8% בשנת 2018. השיעור היה גבוה פי 1.5 בקרב נשים (5.7%) מאשר בקרב גברים (3.7%). השיעור היה נמוך פי 1.8 בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (3.0%) בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (5.4%).
- שיעור השימוש בבנזודיאזפינים ארוכי טווח בקרב בני 65 ומעלה ירד בין השנים 2014-2018, מ־2.6% בשנת 2014 ל־2.2% בשנת 2018. השיעור היה גבוה יותר בקרב נשים (2.5%) מאשר בקרב גברים (1.8%). השיעור היה נמוך בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (1.8%) בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (2.5%).

טיפול תרופתי הולם לאחר שבר בצוואר הירך

- שיעור טיפול תרופתי הולם בבני 65-85 לאחר שבר בצוואר הירך עלה בין השנים 2015-2018, מ־25.5% בשנת 2015 ל־28.1% בשנת 2018. השיעור היה גבוה יותר בקרב נשים (32.3%) מאשר בקרב גברים (18.7%). השיעור היה נמוך בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (19.4%) בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (32.8%).

מחלות כרוניות

מחלות נשימתיות

אסתמה

- שיעור ההימצאות של אסתמה מתמשכת בקרב בני 5-45 נותר יציב בין השנים 2014-2018, ועמד על 0.8% בשנת 2018. השיעור היה נמוך יותר בקרב נשים (0.7%) מאשר בקרב גברים (0.9%). השיעור היה נמוך פי 2 בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (0.5%) בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (1.0%).
- שיעור חולי אסתמה מתמשכת בני 5-45 שעבורם היחס בין תרופות למניעה לכלל התרופות לאסתמה (AMR) היה גדול או שווה ל-0.5 (יחס המעיד על טיפול נאות) עלה בין השנים 2018-2014, מ-67.4% בשנת 2014 ל-70.9% בשנת 2018. השיעור היה מעט נמוך יותר בקרב נשים (70.5%) מאשר בקרב גברים (71.3%). השוואה בין השכבות החברתיות-כלכליות לא הצביעה על קשר מונוטוני, אך השיעור הגבוה ביותר נצפה בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (73.8%).
- שיעור המחסונים נגד שפעת בקרב חולי אסתמה מתמשכת בני 5-45 ירד בשלוש השנים 2016-2018 לכדי 35.3% בשנת 2018. בשנה זו, השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (35.9%) מאשר בקרב גברים (34.8%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (44.3%) היה גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (35.2%).

חסימת ריאות (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD

- שיעור ביצוע ספירומטריה בקרב חולי COPD ואוכלוסייה בסיכון גבוה ל-COPD בני 50-74 עלה בין השנים 2014-2018, מ-57.9% בשנת 2014 ל-75.5% בשנת 2018. השיעור היה מעט נמוך יותר בקרב נשים (74.6%) מאשר בקרב גברים (76.1%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (71.75%) היה מעט נמוך יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (77.1%).
- תיעוד ערכי בדיקת ספירומטריה בתיק הרפואי של חולי COPD ואוכלוסייה בסיכון גבוה ל-COPD בני 50-74 עלה בין השנים 2014-2018, מ-10.9% בשנת 2014 ל-38.9% בשנת 2018. השיעור היה דומה בנשים (38.7%) ובגברים (39.0%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (36.7%) היה מעט נמוך יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (39.8%).

לב וכלי דם

מניעה ראשונית של מחלות לב

תיעוד ערכי לחץ דם

- שיעור התיעוד של מדידות לחץ דם בקרב בני 20-54 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 92.5% ב-2018. השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (95.4%) מאשר בקרב גברים (89.5%). השיעור היה דומה בין השכבות החברתיות-כלכליות השונות.

- שיעור התייעוד של מדידות לחץ דם בקרב בני 55-74 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 80.8% ב-2018. השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (81.8%) מאשר בקרב גברים (79.7%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (83.8%) היה מעט גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (78.4%).

רמות כולסטרול

- שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול בקרב בני 35-54 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 88.1% ב-2018. השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (91.9%) מאשר בקרב גברים (84.1%). השיעור היה דומה בין השכבות החברתיות-כלכליות השונות.
- שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול בקרב בני 55-74 ירד בין השנים 2014-2018 מ-76.7% בשנת 2014 ל-75.3% ב-2018. השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (77.2%) מאשר בקרב גברים (73.2%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (75.7%) היה מעט גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (74.0%).
- שיעור העמידה ביעד LDL למניעה ראשונית לפי קבוצת סיכון למחלות לב בקרב בני 35-74 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 84.2% ב-2018. השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (86.9%) מאשר בקרב גברים (80.4%). נצפו מעט הבדלים לפי מצב חברתי-כלכלי, כאשר השיעור הנמוך ביותר נצפה בשכבה החברתית-כלכלית השניה (82.7%) והשיעור הגבוה ביותר נצפה בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (86.4%).
- שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל בקבוצת סיכון גבוה למחלות לב בקרב בני 35-74 עלה בין השנים 2015-2018 מ-29.3% בשנת 2015 ל-34.4% בשנת 2018. השיעור היה נמוך פי 4.0 בקרב נשים (8.7%) מאשר בקרב גברים (34.7%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (27.5%) היה נמוך פי 1.5 בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (42.1%).

מניעה שלישונית של מחלות לב

- מבין חולי הלב בני 35-80 שעברו ניתוח מעקפים או צנתור לב טיפולי, שיעור החולים שהגיעו ליעד האיזון של רמת LDL נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל או טופלו בסטטינים בעצימות גבוהה עלה בין השנים 2014-2018, מ-57.2% בשנת 2014 ל-67.9% בשנת 2018. השיעור היה נמוך יותר בקרב נשים (60.4%) מאשר בקרב גברים (69.7%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (65.6%) היה נמוך יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (71.6%).
- מבין חולי הלב בני 35-80 שעברו ניתוח מעקפים ו/או צנתור לב טיפולי, שיעור המטופלים בתרופות להורדת LDL נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 82.4% ב-2018. השיעור היה מעט נמוך יותר בקרב נשים (81.0%) מאשר בקרב גברים (82.7%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (79.6%) היה מעט נמוך יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (85.5%).

סוכרת

בוגרים, גיל 18 ומעלה

שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב בני 18 ומעלה בשנים 2014-2018 נותר יציב, ועמד על 9.7% ב־2018. השיעור היה נמוך יותר בקרב נשים (9.0%) מאשר בקרב גברים (10.5%). השוואה בין השכבות החברתיות־כלכליות לא הצביעה על קשר מונוטוני, אך השיעור הגבוה ביותר נצפה בשכבה החברתית־כלכלית החלשה־בינונית (10.9%).

איכות הטיפול בסוכרת

- שיעור הביצוע של בדיקת HbA1c בחולי סוכרת בני 18 ומעלה נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 90.7% ב־2018. השיעור היה דומה בקרב נשים (91.7%) וגברים (89.8%). השיעור היה דומה בין השכבות החברתיות־כלכליות השונות.
- שיעור חולי הסוכרת בני 18-84, שמחלתם נחשבת מאוזנת (בעלי רמת HbA1c נמוכה או שווה ל־7% או 8% בהתאם לגיל ולוותק המחלה) עלה בין השנים 2014-2018, מ־66.4% בשנת 2014 ל־70.8% בשנת 2018. השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (72.9%) מאשר בקרב גברים (68.9%). שיעור האיזון עלה עם הגיל. השיעור בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (59.7%) היה נמוך באופן ניכר בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (79.5%).
- שיעור חולי הסוכרת בני 18 ומעלה שאינם מאוזנים (בעלי רמת HbA1c גבוהה מ־9%) ירד בין השנים 2014-2018, מ־11.6% בשנת 2014 ל־9.6% בשנת 2018. השיעור היה נמוך יותר בקרב נשים (9.0%) מאשר בקרב גברים (10.1%). השיעור היה גבוה כמעט פי 3 בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (15.5%) בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (5.3%).

ניטור סיבוכי סוכרת

רטינופתיה סוכרתית

- שיעור הביצוע של בדיקות עיניים בחולי סוכרת בני 18-84 ירד בין השנים 2015-2018, מ־75.9% בשנת 2015, ל־72.5% ב־2018. השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (74.0%) מאשר בקרב גברים (71.1%). השיעור בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (70.9%) היה מעט נמוך יותר בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (75.2%).

מחלת כליות סוכרתית

- שיעור הביצוע של בדיקות לאיתור חלבון בשתן בחולי סוכרת בני 18-84 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 81.2% ב־2018. השיעור היה דומה בקרב גברים ונשים ובין השכבות החברתיות־כלכליות השונות.
- שיעור התייעוד של תפקודי הכליות (estimated or measured glomerular filtration rate - GFR) בחולי סוכרת בני 18-84 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 92.2% ב־2018. השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (93.5%) מאשר בקרב גברים (91.0%). השיעור היה דומה בין השכבות החברתיות־כלכליות השונות.

- שיעור חולי הסוכרת בני 18-84 הסובלים מפגיעה כלייתית עלה בין השנים 2014-2017 מ־30.5% ב־2014 ל־32.1% בשנת 2017 אך ירד ל־32.1% ב־2018. השיעור היה נמוך יותר בקרב נשים (29.8%) מאשר בקרב גברים (34.3%). השיעור בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (32.7%) היה מעט גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (30.1%).

ניטור ואיזון מחלות נלוות לסוכרת

- שיעור התייעוד של ערכי לחץ דם בחולי סוכרת בני 18 ומעלה נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 90.7% ב־2018. השיעור היה דומה בקרב גברים ונשים. השיעור בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (91.8%) היה מעט גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (89.8%).
- שיעור חולי הסוכרת בני 18 ומעלה שעמדו ביעד האיזון (לחץ דם נמוך או שווה ל־140/90 מ"מ כספית) נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 83.0% ב־2018. השיעור היה דומה בקרב נשים וגברים. השיעור בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (85.4%) היה מעט גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (82.3%).
- שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול בחולי סוכרת בני 18 ומעלה נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 90.9% ב־2018. השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (92.0%) מאשר בקרב גברים (89.9%). השיעור היה דומה בין השכבות החברתיות־כלכליות השונות.
- שיעור חולי הסוכרת בני 18-80 שהגיעו ליעד האיזון בכולסטרול (רמת LDL נמוכה או שווה ל־100 מ"ג/ד"ל) נותר יציב בין השנים 2014-2018, ועמד על 66.0% בשנת 2018. השיעור היה נמוך יותר בקרב נשים (62.8%) מאשר בקרב גברים (69.0%). הפער היה בולט במיוחד מגיל 45 ומעלה. השיעור בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (65.0%) היה מעט נמוך יותר בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (67.7%).

השמנה בסוכרתיים

- שיעור התייעוד של מרכיבי BMI בחולי סוכרת בני 20-64 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 84.8% ב־2018. השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (86.4%) מאשר בקרב גברים (83.6%). השיעור בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (88.1%) היה מעט גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (80.9%).
- שיעור ההימצאות של עודף משקל בקרב חולי סוכרת בני 20-64 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 35.0% ב־2018. השיעור היה נמוך יותר במידה ניכרת בקרב נשים (28.7%) מאשר בקרב גברים (40.0%). השיעור בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (31.9%) היה נמוך יותר בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (39.9%).
- שיעור ההימצאות של השמנת יתר (BMI בין 30 ל־35 ק"ג/מ²) בקרב חולי סוכרת בני 20-64 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 30.4% ב־2018. השיעור היה דומה בקרב גברים ונשים. השיעור בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (32.0%) היה גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (27.9%).
- שיעור ההימצאות של השמנת יתר חולנית בקרב חולי סוכרת בני 20-64 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 20.6% ב־2018. השיעור היה גבוה כמעט פי 2 בקרב נשים (27.9%) מאשר בקרב גברים (14.6%). השיעור היה גבוה פי 1.7 בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (24.5%) בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (14.4%).

- שיעור התייעוד של מרכיבי BMI בחולי סוכרת בני 65-84 נותר יציב בין השנים 2015-2018 ועמד על 88.4% בשנת 2018. השיעור היה דומה בקרב גברים ונשים. השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (90.4%) היה מעט גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (86.6%).
- שיעור ההימצאות של השמנת יתר והשמנת יתר חולנית בקרב חולי סוכרת בני 65-84 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 43.3% ב-2018. השיעור היה גבוה יותר במידה ניכרת בקרב נשים (50.6%) מאשר בקרב גברים (35.8%). השיעור היה גבוה כמעט פי 1.5 בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (50.8%) בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (35.1%).

חיסונים

- שיעור חולי הסוכרת בני 18 ומעלה שקבלו חיסון נגד שפעת עלה מ-61.6% בשנת 2014 ל-63.6% בשנת 2015, וירד בשנים הבאות, לכדי 59.8% בשנת 2018. השיעור היה מעט נמוך יותר בקרב נשים (59.2%) מאשר בקרב גברים (60.5%). השיעור היה דומה בין השכבות החברתיות-כלכליות השונות.
- שיעור חולי הסוכרת המבוגרים, בני 65-74, שקבלו חיסון נגד פניאומוקוק נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 84.4% ב-2018. השיעור היה מעט נמוך יותר בקרב נשים (83.0%) מאשר בקרב גברים (85.8%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (88.5%) היה מעט גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (84.6%).

ילדים ובני נוער (גיל 2-17)

שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב ילדים ובני נוער (בני 2-17) נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 0.1% ב-2018. השיעור היה דומה בקרב בנות ובנים. השיעור היה דומה בין השכבות החברתיות-כלכליות השונות.

איכות הטיפול בסוכרת

- שיעור המבקרים במרפאת סוכרת ילדים בקרב חולי סוכרת בני 2-17 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 86.8% ב-2018. השיעור היה דומה בקרב בנות ובנים. השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (83.1%) היה נמוך יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (92.4%).
- שיעור הביצוע של בדיקת HbA1c בחולי סוכרת בני 2-17 נותר יציב בין השנים 2014-2018, ועמד על 77.4% ב-2018. השיעור היה דומה בקרב בנות ובנים. השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (82.7%) היה גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (67.9%).
- שיעור הילדים ובני הנוער (בני 2-17) שמחלתם נחשבת בלתי מאוזנת (בעלי רמת HbA1c גבוהה מ-9%) ירד בין השנים 2014-2018, מ-37.1% בשנת 2014 ל-34.0% בשנת 2018. השיעור היה דומה בקרב בנות ובנים. השיעור היה גבוה פי 3.1 בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (46.1%) בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (14.8%).
- שיעור הילדים ובני הנוער חולי הסוכרת אשר קבלו חיסון נגד שפעת עלה מ-49.8% בשנת 2014

ל-54.8% בשנת 2015, אך בשנים 2016-2018 נצפתה ירידה בשיעור המחוסנים, לכדי 41.1% בשנת 2018. השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב בנות (42.9%) מאשר בקרב בנים (39.4%). השיעור היה גבוה כמעט פי 1.5 בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (50.0%) בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (36.0%).

שימוש בתרופות אנטיביוטיות

סך השימוש בתרופות אנטיביוטיות ל-1000 איש ליום

- היקף השימוש בתרופות אנטיביוטיות ירד בין השנים 2014-2018, מ-20.8 ל-19.1 DDD ל-1000 איש ליום, מ-2014 ל-2018 בהתאמה. היקף השימוש היה גבוה יותר בקרב נשים לעומת גברים (22.4 ו-15.7 DDD ל-1000 איש ליום, בהתאמה). היקף השימוש בשכבה החברתית-כלכלית החלשה היה מעט נמוך בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (17.8 ו-18.4 DDD ל-1000 איש ליום, בהתאמה).

פרופורציית השימוש בתרופות אנטיביוטיות מקו שני

- פרופורציית השימוש בתרופות אנטיביוטיות מקו שני מתוך סך התרופות האנטיביוטיות עלה בין השנים 2014-2018, מ-22.1% בשנת 2014 ל-25.2% בשנת 2018. השיעור היה גבוה יותר בקרב נשים (26.9%) מאשר בקרב גברים (22.8%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (23.0%) היה נמוך יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (26.3%).

בריאות הנפש

רצף הטיפול

שיעור המפגשים הטיפוליים עם אנשי בריאות הנפש בקהילה תוך 14 יום משחרור מאשפוז פסיכיאטרי ממושך עמד בשנת 2018 על 37.3%, עליה קלה לעומת שנת 2015 בה השיעור עמד על 32.5%. השיעור היה מעט גבוה יותר בנשים (38.7%) בהשוואה לגברים (36.3%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (36.7%) היה גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החלשה (32.9%).

מחלות נפש קשות - Severe Mental Illness (SMI)

שיעור ההימצאות של מחלת נפש קשה (SMI) בקרב בני 18 ומעלה עמד על 1.3% בשנת 2018. השיעור היה גבוה יותר בקרב גברים (1.5%) בהשוואה לנשים (1.1%). בבחינה לפי מצב חברתי-כלכלי (מ-1 נמוך ועד 4 גבוה) נצפה שיעור ההימצאות הגבוה ביותר בקרב בעלי מצב חברתי-כלכלי בינוני-נמוך (קבוצה 2: 1.8% בקרב גברים, ו-1.4% בקרב נשים), וירד עם העליה במצב חברתי כלכלי (1.0% בקרב גברים ו-0.9% בקרב נשים). בקרב קבוצת בעלי מצב חברתי-כלכלי הנמוך ביותר (1) נצפה שיעור הימצאות של 1.5% בגברים (כמו בקבוצה 3), ושל 1.0% בלבד בקרב נשים. יש לציין כי השיעור בקרב גברים גבוה מהשיעור בקרב נשים בכל קבוצות מצב חברתי-כלכלי (ופי 1.5 בסך הכל).

סוכרת בקרב חולי SMI

- שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב חולי SMI, בני 18 ומעלה עמד על 14.9% בשנת 2018, שיעור הגבוה פי 1.5 משיעור ההימצאות של סוכרת בכלל האוכלוסיה בשנה זו (9.7%). השיעור היה גבוה יותר בקרב נשים (16.6%) מאשר בקרב גברים (13.4%), וכן נצפה כי מחלת הסוכרת מגיעה לשכיחות מקסימלית בגילאי 65-74 בקרב מבוגרים עם SMI (32.5% בקרב גברים ו-32.6% בקרב נשים). זאת, לעומת האוכלוסיה הכללית בה נמצאים השיעורים הגבוהים ביותר של מחלת הסוכרת (34.2% בקרב גברים ו-31.1% בקרב נשים) בקבוצת גיל מבוגרת יותר, 75-84 שנים. השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (14.8%) היה גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (12.3%).
- שיעור הביצוע של בדיקת HbA1c בקרב חולי SMI וסוכרת, בני 18 ומעלה עמד על 89.9% בשנת 2018, בדומה לשיעור בקרב האוכלוסייה הכללית של חולי הסוכרת (90.7%). השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (90.5%) מאשר בקרב גברים (89.3%). השיעור היה דומה בין השכבות החברתיות-כלכליות השונות.
- שיעור בעלי רמת HbA1c מאוזנת בקרב חולי SMI וסוכרת בני 18-84 עמד על 71.8% בשנת 2018. זאת, בדומה לשיעור האיזון באוכלוסיית הסוכרתיים הכללית, שעמד בשנה זו על 70.8%. השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (72.9%) מאשר בקרב גברים (70.7%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (65.1%) היה נמוך יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (77.9%). קשר ישר דומה בין מצב חברתי-כלכלי לאיזון סוכרת קיים גם באוכלוסיית הסוכרתיים הכללית, אף עם מדרג מעט חזק יותר (פי 1.3 מאוזנים בשכבה החברתית-כלכלית החזקה בהשוואה לשכבה החלשה בקרב אוכלוסיית הסוכרתיים הכללית, ופי 1.2 בקרב חולי סוכרת ו-SMI). שיעור האיזון עלה עם העליה בגילאי החולים.
- שיעור בעלי רמת HbA1c גבוהה מ-9% בקרב חולי SMI וסוכרת, בני 18 ומעלה עמד על 10.9% בשנת 2018, מעט גבוה יותר בהשוואה לשיעור באוכלוסיית הסוכרתיים הכללית (9.6%). השיעור היה מעט נמוך יותר בקרב נשים (10.7%) מאשר בקרב גברים (11.1%). השיעור היה גבוה פי 1.8 בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (14.3%) בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (8.0%).

BMI בקרב חולי SMI

- שיעור התייעוד של מרכיבי BMI בקרב חולי SMI, בני 20-64 עמד על 54.0% בשנת 2018. שיעור זה נמוך במידה ניכרת בהשוואה לשיעור בתייעוד של מרכיבי BMI באוכלוסייה הכללית, שעמד בשנה זו על 89.6%. השיעור היה גבוה יותר בקרב נשים (58.9%) מאשר בקרב גברים (50.4%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (54.3%) היה מעט גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (48.4%). השיעור עלה באופן מונוטוני העליה בגיל.
- שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב חולי SMI בני 20-64 עמד על 40.9% בשנת 2018. שיעור זה גבוה פי 1.7 משיעור ההימצאות של השמנת יתר בגילאים אלו באוכלוסיה הכללית (23.8%). השיעור היה גבוה יותר בקרב נשים (46.1%) מאשר בקרב גברים (36.4%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (45.9%) היה גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (33.9%). כמו כן, שיעורי ההשמנה עלו עם העליה בגיל. קשרים אלו בין שיעור ההמצאות של השמנת-יתר למין, גיל ומצב חברתי-כלכלי באוכלוסיה זו דומים לקשרים שנצפו באוכלוסיה הכללית.

1. Medicine I of. America's Health in Transition: Protecting and Improving Quality [Internet]. Washington, DC: The National Academies Press; 1994. Available from: <https://www.nap.edu/catalog/9147/americas-health-in-transition-protecting-and-improving-quality>
2. America I of M (US) C on Q of HC in. Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century. Washingt Natl Acad Press. 2001;
3. AHRQ Agency for Healthcare Research and Quality. National Healthcare Quality and Disparities Report 2015. AHRQ Pub No 16-0015 [Internet]. 2016; Available from: <http://www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/research/findings/nhqdr/nhqdr15/2015nhqdr.pdf>
4. Swedish Association of Local Authorities and Regions. Quality and efficiency in Swedish Health Care [Internet]. Swedish National Board of Health and Welfare. 2013. Available from: <https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-5-7>
5. Indicators of Safety and Quality [Internet]. Australian commission on safety and quality in healthcare. 2017. Available from: <https://www.safetyandquality.gov.au/our-work/indicators/>
6. Clinical Services Quality Measures (CSQMs) [Internet]. NHS England. 2017. Available from: <https://www.england.nhs.uk/ourwork/tsd/data-info/open-data/clinical-services-quality-measures/>
7. OECD. Health at a Glance 2017 [Internet]. 2017. Available from: http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2017_health_glance-2017-en
8. 1.12.2018 המוסד לביטוח לאומי. חישוב מפתח חלוקת כספי ביטוח בריאות בין קופות החולים ליום [Internet]. 2018. Available from: https://www.btl.gov.il/Mediniyut/Situation/haveruth1/2018/Pages/capitatie_122018.aspx
9. Rosen D, Nakar S, Cohen AD, Vinker S. Low rate of non-attenders to primary care providers in Israel - a retrospective longitudinal study. Isr J Health Policy Res [Internet]. 2014 Apr 25;3:15. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24808941>
10. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אפיון יחידות נאוגרפיות וסיווג לפי הרמה החברתית-כלכלית 2008 של האוכלוסייה בשנת 2008 [Internet]. 2013. Available from: http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=100&CYear=2008&CMonth=1
11. Mark W. Friedberg, Cheryl L. Damberg, Elizabeth A. McGlynn JLA. Methodological Considerations in Generating Provider Performance Scores for Use in Public Reporting A Guide for Community Quality Collaboratives [Internet]. 2011. Available from: https://www.rand.org/pubs/external_publications/EP201100198.html

קידום בריאות



ניטור משקל הגוף והתפלגות קטגוריות BMI בקרב בני 20-64

רציונאל: השמנה הינה מגיפה הצפויה להגביר את התחלואה ולהאיץ את התמותה במדינות המערב, תוך שהיא מהווה נטל כלכלי עצום (1-3). ערך ה-BMI הינו אמת-מידה של השמנה, המבוסס על משקל ביחס לגובה האדם. זיהוי פרטים באוכלוסייה בעלי עודף משקל או השמנה מאפשר התאמת התערבויות הולמות להתמודדות עם אחד מגורמי הסיכון המשמעותיים ביותר למחלות כרוניות רבות בעידן המודרני. מתן תשומת לב לזיהוי השמנה וטיפול בה, בעיקר לפני הופעת תחלואה נלוות, הוא בעל חשיבות מרובה (4).

מדדים:

- ✓ שיעור התיעוד של מרכיבי BMI בקרב בני 20-64
- ✓ שיעור ההימצאות של תת משקל בקרב בני 20-64
- ✓ שיעור ההימצאות של עודף משקל בקרב בני 20-64
- ✓ שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב בני 20-64

שיעור התיעוד של מרכיבי BMI בקרב בני 20-64

הגדרת המדד: שיעור המבוטחים בני 20-64 עם תיעוד של מרכיבי חישוב BMI (משקל וגובה)


מכנה: מבוטחים בני 20-64

מונה: מספר המבוטחים במכנה עם תיעוד מרכיבי חישוב BMI (משקל וגובה): תיעוד גובה פעם אחת אחרי גיל 18 ותיעוד משקל בחמש השנים האחרונות.


הערות: נתונים אודות תיעוד מרכיבי BMI בבני 65 ואילך ניתן למצוא בפרק המבוגרים.

תוצאות: שיעור התיעוד של מרכיבי BMI בקרב בני 20-64 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 89.6% ב-2018. השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (92.1%) מאשר בקרב גברים (86.9%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (91.8%) היה מעט גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (86.1%).


תרשים 1: תיעוד מרכיבי BMI לפי שנה, 2014-2018



תרשים 2: תיעוד מרכיבי BMI לפי גיל ומין, 2018



תרשים 3: תיעוד מרכיבי BMI לפי מצב חברתי- כלכלי ומין, 2018



טבלה 1: תיעוד מרכיבי BMI לפי גיל ומין – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל					
		20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	סה"כ
זכר	מונה	23,747	373,283	396,080	352,576	292,068	1,437,754
	מכנה	29,086	461,023	463,103	393,011	308,479	1,654,702
	שיעור	81.6%	81.0%	85.5%	89.7%	94.7%	86.9%
נקבה	מונה	36,993	453,717	445,639	382,060	324,192	1,642,601
	מכנה	40,591	497,854	490,647	416,097	338,786	1,783,975
	שיעור	91.1%	91.1%	90.8%	91.8%	95.7%	92.1%
סה"כ	מונה	60,740	827,000	841,719	734,636	616,260	3,080,355
	מכנה	69,677	958,877	953,750	809,108	647,265	3,438,677
	שיעור	87.2%	86.2%	88.3%	90.8%	95.2%	89.6%

טבלה 2: תיעוד מרכיבי BMI לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		מצב חברתי-כלכלי				
		1	2	3	4	סה"כ
20-24	מונה	20,061	19,023	13,342	4,985	57,411
	מכנה	22,809	21,728	15,416	6,002	65,955
	שיעור	88.0%	87.6%	86.5%	83.1%	87.0%
25-34	מונה	174,656	253,351	249,932	108,335	786,274
	מכנה	197,580	292,443	292,292	131,152	913,467
	שיעור	88.4%	86.6%	85.5%	82.6%	86.1%
35-44	מונה	152,201	230,583	279,079	141,537	803,400
	מכנה	165,956	259,316	319,729	167,357	912,358
	שיעור	91.7%	88.9%	87.3%	84.6%	88.1%
45-54	מונה	124,024	211,007	241,950	129,649	706,630
	מכנה	131,214	228,783	269,337	150,538	779,872
	שיעור	94.5%	92.2%	89.8%	86.1%	90.6%
55-64	מונה	83,108	195,585	211,309	101,680	591,682
	מכנה	85,768	203,881	222,745	109,778	622,172
	שיעור	96.9%	95.9%	94.9%	92.6%	95.1%
סה"כ	מונה	554,050	909,549	995,612	486,186	2,945,397
	מכנה	603,327	1,006,151	1,119,519	564,827	3,293,824
	שיעור	91.8%	90.4%	88.9%	86.1%	89.4%

שיעור ההימצאות של תת משקל בקרב בני 20-64

הגדרת המדד: התפלגות קטגוריות מסת הגוף בקרב המבוטחים בני 20-64: תת-משקל


מכנה: מבוטחים בני 20-64 עם תיעוד מרכיבי חישוב BMI (משקל וגובה)

מונה: מספר המבוטחים במכנה עם BMI קטן מ-18.5 ק"ג/מ"ר


הערות: עבור האוכלוסייה המבוגרת, קיימת הגדרה שונה של קטגוריות המשקל. לפיכך, נתונים אודות משקל הגוף בבני 65 ומעלה מוצגים בנפרד, בפרק העוסק באוכלוסייה המבוגרת.

תוצאות: שיעור ההימצאות של תת משקל בקרב בני 20-64 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 2.6% ב-2018. השיעור היה גבוה פי 2.2 בקרב נשים (3.4%) בהשוואה לגברים (1.6%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (2.3%) היה נמוך בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (2.7%).


תרשים 4: שיעור ההימצאות של תת משקל לפי שנה, 2014-2018



תרשים 5: שיעור הימצאות תת משקל לפי גיל ומין, 2018



תרשים 6: שיעור הימצאות תת משקל לפי מצב חברתי- כלכלי ומין, 2018



טבלה 3: שיעור הימצאות תת משקל לפי גיל ומין - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל					
		סה"כ	55-64	45-54	35-44	25-34	20-24
זכר	מונה	22,559	2,174	2,788	5,368	11,090	1,139
	מכנה	1,438,091	292,128	352,680	396,160	373,369	23,754
	שיעור	1.6%	0.7%	0.8%	1.4%	3.0%	4.8%
נקבה	מונה	56,272	3,686	6,928	14,998	27,472	3,188
	מכנה	1,642,906	324,248	382,137	445,730	453,793	36,998
	שיעור	3.4%	1.1%	1.8%	3.4%	6.1%	8.6%
סה"כ	מונה	78,831	5,860	9,716	20,366	38,562	4,327
	מכנה	3,080,997	616,376	734,817	841,890	827,162	60,752
	שיעור	2.6%	1.0%	1.3%	2.4%	4.7%	7.1%

טבלה 4: שיעור הימצאות תת משקל לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי					
סה"כ	4	3	2	1	
4,143	488	1,109	1,422	1,124	מונה
57,423	4,988	13,347	19,025	20,063	מכנה
7.2%	9.8%	8.3%	7.5%	5.6%	שיעור
36,927	5,666	12,264	12,234	6,763	מונה
786,436	108,368	250,005	253,387	174,676	מכנה
4.7%	5.2%	4.9%	4.8%	3.9%	שיעור
19,577	4,213	7,174	5,551	2,639	מונה
803,571	141,586	279,135	230,636	152,214	מכנה
2.4%	3.0%	2.6%	2.4%	1.7%	שיעור
9,354	2,033	3,243	2,815	1,263	מונה
706,811	129,695	242,026	211,056	124,034	מכנה
1.3%	1.6%	1.3%	1.3%	1.0%	שיעור
5,613	974	1,820	1,982	837	מונה
591,798	101,708	211,348	195,629	83,113	מכנה
0.9%	1.0%	0.9%	1.0%	1.0%	שיעור
75,614	13,374	25,610	24,004	12,626	מונה
2,946,039	486,345	995,861	909,733	554,100	מכנה
2.6%	2.7%	2.6%	2.6%	2.3%	שיעור

שיעור ההימצאות של עודף משקל בקרב בני 20-64

הגדרת המדד: התפלגות קטגוריות מסת הגוף בקרב המבוטחים בני 20-64: עודף משקל


מכנה: מבוטחים בני 20-64 עם תיעוד מרכיבי חישוב BMI (משקל וגובה)

מונה: מספר המבוטחים במכנה עם ערך BMI גדול או שווה 25 וקטן מ־30 ק"ג/מ"ר


הערות: עבור האוכלוסייה המבוגרת, קיימת הגדרה שונה של קטגוריות המשקל. לפיכך, נתונים אודות משקל הגוף בבני 65 ומעלה מוצגים בנפרד, בפרק העוסק באוכלוסייה המבוגרת.

תוצאות: שיעור ההימצאות של עודף משקל בקרב בני 20-64 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 34.4% ב־2018. השיעור היה נמוך יותר בקרב נשים (29.9%) מאשר בקרב גברים (39.7%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (34.9%) היה מעט גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (33.3%).


תרשים 7: שיעור ההימצאות עודף משקל לפי שנה, 2014-2018



תרשים 8: שיעור ההימצאות עודף משקל לפי גיל ומין, 2018



תרשים 9: שיעור הימצאות עודף משקל לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 5: שיעור הימצאות עודף משקל לפי גיל ומין -

מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל					
		סה"כ	55-64	45-54	35-44	25-34	20-24
זכר	מונה	570,402	132,382	154,997	158,557	118,191	6,275
	מכנה	1,438,091	292,128	352,680	396,160	373,369	23,754
	שיעור	39.7%	45.3%	43.9%	40.0%	31.7%	26.4%
נקבה	מונה	490,979	111,708	120,771	131,087	119,114	8,299
	מכנה	1,642,906	324,248	382,137	445,730	453,793	36,998
	שיעור	29.9%	34.5%	31.6%	29.4%	26.2%	22.4%
סה"כ	מונה	1,061,381	244,090	275,768	289,644	237,305	14,574
	מכנה	3,080,997	616,376	734,817	841,890	827,162	60,752
	שיעור	34.4%	39.6%	37.5%	34.4%	28.7%	24.0%

טבלה 6: שיעור הימצאות עודף משקל לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי					
	סה"כ	4	3	2	1
20-24	מונה	13,731	923	2,886	4,632
	מכנה	57,423	4,988	13,347	19,025
	שיעור	23.9%	18.5%	21.6%	24.3%
25-34	מונה	225,063	26,675	69,491	74,224
	מכנה	786,436	108,368	250,005	253,387
	שיעור	28.6%	24.6%	27.8%	29.3%
35-44	מונה	275,894	44,651	94,575	80,187
	מכנה	803,571	141,586	279,135	230,636
	שיעור	34.3%	31.5%	33.9%	34.8%
45-54	מונה	265,279	47,741	91,477	79,405
	מכנה	706,811	129,695	242,026	211,056
	שיעור	37.5%	36.8%	37.8%	37.6%
55-64	מונה	234,682	41,871	86,705	75,683
	מכנה	591,798	101,708	211,348	195,629
	שיעור	39.7%	41.2%	41.0%	38.7%
סה"כ	מונה	1,014,649	161,861	345,134	314,131
	מכנה	2,946,039	486,345	995,861	909,733
	שיעור	34.4%	33.3%	34.7%	34.5%

שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב בני 20-64

הגדרת המדד: התפלגות קטגוריות מסת הגוף בקרב המבוטחים בני 20-64: השמנת יתר


מכנה: מבוטחים בני 20-64 עם תיעוד מרכיבי חישוב BMI (משקל וגובה)

מונה: מספר המבוטחים במכנה עם BMI גבוה או שווה ל-30 ק"ג/מ"ר


הערות: עבור האוכלוסייה המבוגרת, קיימת הגדרה שונה של קטגוריות המשקל. לפיכך, נתונים אודות משקל הגוף בבני 65 ומעלה מוצגים בנפרד, בפרק העוסק באוכלוסייה המבוגרת.

תוצאות: שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב בני 20-64 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 23.8% ב-2018. השיעור היה גבוה יותר בקרב נשים (25.1%) מאשר בקרב גברים (22.3%). השיעור היה גבוה כמעט פי 2 בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (30.5%) בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (16.1%).


תרשים 10: שיעור הימצאות השמנת יתר לפי שנה, 2014-2018



תרשים 11: שיעור הימצאות השמנת יתר לפי גיל ומין, 2018



תרשים 12: שיעור הימצאות השמנת יתר לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 7: שיעור הימצאות השמנת יתר לפי גיל ומין - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל					
		סה"כ	55-64	45-54	35-44	25-34	20-24
זכר	מונה	320,461	85,034	96,010	82,681	53,631	3,105
	מכנה	1,438,091	292,128	352,680	396,160	373,369	23,754
	שיעור	22.3%	29.1%	27.2%	20.9%	14.4%	13.1%
נקבה	מונה	412,952	111,926	112,869	102,609	80,346	5,202
	מכנה	1,642,906	324,248	382,137	445,730	453,793	36,998
	שיעור	25.1%	34.5%	29.5%	23.0%	17.7%	14.1%
סה"כ	מונה	733,413	196,960	208,879	185,290	133,977	8,307
	מכנה	3,080,997	616,376	734,817	841,890	827,162	60,752
	שיעור	23.8%	32.0%	28.4%	22.0%	16.2%	13.7%

טבלה 8: שיעור הימצאות השמנת יתר לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי					
	סה"כ	4	3	2	1
20-24	מונה	7,866	377	1,554	2,690
	מכנה	57,423	4,988	13,347	19,025
	שיעור	13.7%	7.6%	11.6%	14.1%
25-34	מונה	127,433	10,631	35,732	44,476
	מכנה	786,436	108,368	250,005	253,387
	שיעור	16.2%	9.8%	14.3%	17.6%
35-44	מונה	176,286	19,643	53,795	56,587
	מכנה	803,571	141,586	279,135	230,636
	שיעור	21.9%	13.9%	19.3%	24.5%
45-54	מונה	199,704	24,404	61,267	66,392
	מכנה	706,811	129,695	242,026	211,056
	שיעור	28.3%	18.8%	25.3%	31.5%
55-64	מונה	188,235	23,196	61,010	69,009
	מכנה	591,798	101,708	211,348	195,629
	שיעור	31.8%	22.8%	28.9%	35.3%
סה"כ	מונה	699,524	78,251	213,358	239,154
	מכנה	2,946,039	486,345	995,861	909,733
	שיעור	23.7%	16.1%	21.4%	26.3%

עישון בקרב בני 16-74

רציונאל: למרות שלל העדויות שהצטברו בחמישים השנים האחרונות לגבי ההשלכות הבריאותיות השליליות של העישון, כחמישית מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל מעשנת (5). על פי המלצות כוח המשימה הישראלי בנושא קידום בריאות ורפואה מונעת, מומלץ לברר ולתעד מצב עישון בכלל האוכלוסייה ולייעץ לגבי נזקי העישון האקטיבי והכפוי (פסיבי). תהליך תיעוד מצב העישון על ידי הרופא מעלה את הסוגיה לשיח שבין הרופא למטופל, מאפשר לרופא להציג את ההשפעות השליליות של ההרגל ולפרוש בפני המטופל את שלל האפשרויות לעזרה בתהליך הגמילה מעישון (4).

מדדים:

- ✓ שיעור תיעוד מצב עישון בקרב בני 16-74
- ✓ שיעור עישון בקרב בני 16-74

שיעור תיעוד מצב עישון בקרב בני 16-74


הגדרת המדד: שיעור המבוטחים בני 16-74 עם תיעוד מצב עישון ב־5 השנים האחרונות

מכנה: מבוטחים בני 16-74


מונה: מספר המבוטחים במכנה עם תיעוד מצב עישון (האם מעשנים, אם לאו) בתיק הרפואי ב־5 השנים האחרונות

תוצאות: שיעור תיעוד מצב העישון בקרב בני 16-74 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 90.7% ב־2018. השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (92.1%) מאשר בקרב גברים (89.1%). השיעור בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (91.7%) היה מעט גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (87.3%).


תרשים 13: שיעור תיעוד מצב עישון לפי שנה, 2014-2018



תרשים 14: שיעור תיעוד מצב עישון לפי גיל ומין, 2018



תרשים 15: שיעור תיעוד מצב עישון לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



**טבלה 9: שיעור תיעוד מצב עישון לפי גיל ומין –
מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

		גיל						
		סה"כ	65-74	55-64	45-54	35-44	25-34	16-24
זכר	מונה	2,019,584	251,436	313,363	338,401	402,764	421,939	291,681
	מכנה	2,265,921	261,412	341,966	394,317	464,887	464,329	339,010
	שיעור	89.1%	96.2%	91.6%	85.8%	86.6%	90.9%	86.0%
נקבה	מונה	2,256,447	288,881	345,864	362,063	444,185	485,069	330,385
	מכנה	2,449,225	301,885	375,875	416,835	491,250	498,533	364,847
	שיעור	92.1%	95.7%	92.0%	86.9%	90.4%	97.3%	90.6%
סה"כ	מונה	4,276,031	540,317	659,227	700,464	846,949	907,008	622,066
	מכנה	4,715,146	563,297	717,841	811,152	956,137	962,862	703,857
	שיעור	90.7%	95.9%	91.8%	86.4%	88.6%	94.2%	88.4%

**טבלה 10: שיעור תיעוד מצב עישון לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל –
מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

		מצב חברתי-כלכלי				
		סה"כ	4	3	2	1
16-24	מונה	586,563	51,391	124,007	183,499	227,666
	מכנה	667,163	60,066	144,113	207,551	255,433
	שיעור	87.9%	85.6%	86.0%	88.4%	89.1%
25-34	מונה	862,423	122,340	276,131	277,808	186,144
	מכנה	917,443	131,461	293,266	293,852	198,864
	שיעור	94.0%	93.1%	94.2%	94.5%	93.6%
35-44	מונה	806,832	141,826	279,818	233,586	151,602
	מכנה	914,740	167,565	320,355	260,204	166,616
	שיעור	88.2%	84.6%	87.3%	89.8%	91.0%
45-54	מונה	672,407	120,376	228,249	203,852	119,930
	מכנה	781,910	150,742	269,857	229,517	131,794
	שיעור	86.0%	79.9%	84.6%	88.8%	91.0%
55-64	מונה	632,403	107,838	226,402	210,040	88,123
	מכנה	690,143	122,694	248,494	225,471	93,484
	שיעור	91.6%	87.9%	91.1%	93.2%	94.3%
65-74	מונה	520,383	108,512	201,775	158,032	52,064
	מכנה	542,955	114,726	210,312	164,114	53,803
	שיעור	95.8%	94.6%	95.9%	96.3%	96.8%
סה"כ	מונה	4,081,011	652,283	1,336,382	1,266,817	825,529
	מכנה	4,514,354	747,254	1,486,397	1,380,709	899,994
	שיעור	90.4%	87.3%	89.9%	91.8%	91.7%

שיעור עישון בקרב בני 16-74


הגדרת המדד: שיעור המעשנים מקרב מבוטחים בני 16-74 עם תיעוד מצב עישון ב־5 השנים האחרונות

מכנה: מבוטחים בני 16-74 עם תיעוד מצב עישון (האם מעשנים, אם לאו) בתיק הרפואי ב־5 השנים האחרונות


מונה: מספר המבוטחים במכנה המעשנים

תוצאות: שיעור העישון בקרב בני 16-74 ירד בין השנים 2014-2017, מ־20.3% בשנת 2014 ל־18.9% בשנת 2017 אך עלה ב־2018 ל־19.1%. השיעור היה גבוה פי 2.2 בקרב גברים (27.0%) בהשוואה לנשים (12.1%). השיעור היה גבוה פי 1.5 בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (19.2%) בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (13.7%).


תרשים 16: שיעור עישון לפי שנה, 2014-2018



תרשים 17: שיעור עישון לפי גיל ומין, 2018



תרשים 18: שיעור עישון לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 11: שיעור עישון לפי גיל ומין - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל						
		סה"כ	65-74	55-64	45-54	35-44	25-34	16-24
זכר	מונה	544,407	43,028	84,267	101,252	124,342	137,158	54,360
	מכנה	2,019,584	251,436	313,363	338,401	402,764	421,939	291,681
	שיעור	27.0%	17.1%	26.9%	29.9%	30.9%	32.5%	18.6%
נקבה	מונה	273,934	29,568	55,586	54,452	58,543	59,643	16,142
	מכנה	2,256,447	288,881	345,864	362,063	444,185	485,069	330,385
	שיעור	12.1%	10.2%	16.1%	15.0%	13.2%	12.3%	4.9%
סה"כ	מונה	818,341	72,596	139,853	155,704	182,885	196,801	70,502
	מכנה	4,276,031	540,317	659,227	700,464	846,949	907,008	622,066
	שיעור	19.1%	13.4%	21.2%	22.2%	21.6%	21.7%	11.3%


**טבלה 12: שיעור עישון לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל –
מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

מצב חברתי-כלכלי						
	סה"כ	4	3	2	1	
16-24	מונה	66,963	4,102	13,797	22,715	26,349
	מכנה	586,563	51,391	124,007	183,499	227,666
	שיעור	11.4%	8.0%	11.1%	12.4%	11.6%
25-34	מונה	187,337	21,596	59,111	68,004	38,626
	מכנה	862,423	122,340	276,131	277,808	186,144
	שיעור	21.7%	17.7%	21.4%	24.5%	20.8%
35-44	מונה	173,993	22,059	58,166	60,508	33,260
	מכנה	806,832	141,826	279,818	233,586	151,602
	שיעור	21.6%	15.6%	20.8%	25.9%	21.9%
45-54	מונה	149,163	16,801	47,806	54,769	29,787
	מכנה	672,407	120,376	228,249	203,852	119,930
	שיעור	22.2%	14.0%	20.9%	26.9%	24.8%
55-64	מונה	133,862	14,478	44,686	53,069	21,629
	מכנה	632,403	107,838	226,402	210,040	88,123
	שיעור	21.2%	13.4%	19.7%	25.3%	24.5%
65-74	מונה	69,665	10,100	25,448	25,185	8,932
	מכנה	520,383	108,512	201,775	158,032	52,064
	שיעור	13.4%	9.3%	12.6%	15.9%	17.2%
סה"כ	מונה	780,983	89,136	249,014	284,250	158,583
	מכנה	4,081,011	652,283	1,336,382	1,266,817	825,529
	שיעור	19.1%	13.7%	18.6%	22.4%	19.2%

רשימת ספרות

1. Obesity-Update-2017 [Internet]. OECD. 2017 [cited 2019 Oct 22]. Available from: <https://www.oecd.org/els/health-systems/Obesity-Update-2017.pdf>
2. Obesity and overweight [Internet]. [cited 2019 Sep 10]. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
3. Bhaskaran K, dos-Santos-Silva I, Leon DA, Douglas IJ, Smeeth L. Association of BMI with overall and cause-specific mortality: a population-based cohort study of 3·6 million adults in the UK. Lancet Diabetes Endocrinol [Internet]. 2018;6(12):944–53. Available from: [http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587\(18\)30288-2](http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587(18)30288-2)
4. ההסתדרות. המלצות כוח המשימה הישראלי בנושא קידום בריאות ורפואה מונעת 2013 [cited 2019 Oct 22]. הרפואית בישראל, האגף למדיניות רפואית, איגוד רופאי המשפחה. Available from: https://www.wikirefua.org.il/w/index.php/המשימה_כוח_המלצות.png
5. 2018. משרד הבריאות. דוח שר הבריאות על העישון בישראל לשנת 2018 [Internet]. 2018. Available from: https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/smoking_2018.pdf

בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן



בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן

שיעור הביצוע של ממוגרפיה לגילוי מוקדם של סרטן השד בנשים בנות 50-74

הגדרת המדד: שיעור הנשים בגילאי 50-74 שעברו לפחות ממוגרפיה סוקרת אחת במהלך השנתיים האחרונות


רצינות: על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי לשנת 2018, סרטן השד הוא המחלה הממאירה השכיחה ביותר בקרב נשים בעולם, ואף זו האחראית למספר הגבוה ביותר של מקרי מוות בנשים מבין המחלות הממאירות (1). בישראל, שיעורי התמותה מסרטן השד ירדו בעקביות במהלך השנים האחרונות (2), שיפור שמיוחס בחלקו לעליה בגילוי המוקדם. ממוגרפיה היא שיטה רנטגנית המקובלת לגילוי מוקדם של סרטן השד. משרד הבריאות בישראל ממליץ על ביצוע בדיקת ממוגרפיה אחת לשנתיים בנשים המצויות בסיכון רגיל בין הגילאים 50-74. הבדיקה מבוצעת כחלק מתכנית סיקור יזומה על-ידי קופות החולים.

מכנה: נשים מבוטחות בגילאים 50-74


מונה: מספר הנשים במכנה אשר עברו לפחות בדיקת ממוגרפיה אחת לאבחון סרטן השד בשנתיים האחרונות

תוצאות: שיעור הביצוע של ממוגרפיה לגילוי מוקדם של סרטן השד בנשים בנות 50-74 עלה בין השנים 2014-2018, מ-69.3% ב-2014 ל-72.5% בשנת 2018, עליה המייצגת כ-70,000 נשים נוספות מתוך אוכלוסיית היעד. השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (66.8%) היה נמוך יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (75.4%). בין השנים 2014 ו-2018 לא נצפה צמצום של הפער בשיעור הביצוע בין שכבות חברתיות-כלכליות אלו.

תרשים 19: שיעור הביצוע של ממוגרפיה לפי שנה, 2014-2018



תרשים 20: שיעור הביצוע של ממוגרפיה לפי גיל, 2018



תרשים 21: שיעור הביצוע של ממוגרפיה לפי מצב חברתי-כלכלי, 2018



טבלה 13: שיעור הביצוע של ממוגרפיה לפי מצב חברתי-כלכלי
וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי						
	סה"כ	4	3	2	1	
50-54	מונה	110,704	21,114	39,442	33,105	17,043
	מכנה	154,753	27,922	53,414	47,730	25,687
	שיעור	71.5%	75.6%	73.8%	69.4%	66.3%
55-59	מונה	136,912	24,325	49,435	44,247	18,905
	מכנה	189,455	32,464	66,857	62,497	27,637
	שיעור	72.3%	74.9%	73.9%	70.8%	68.4%
60-64	מונה	134,360	24,906	50,838	43,335	15,281
	מכנה	182,679	33,121	67,837	59,559	22,162
	שיעור	73.5%	75.2%	74.9%	72.8%	69.0%
65-69	מונה	128,200	26,252	50,519	39,522	11,907
	מכנה	171,378	34,369	66,062	53,665	17,282
	שיעור	74.8%	76.4%	76.5%	73.6%	68.9%
70-74	מונה	88,911	20,272	35,484	25,628	7,527
	מכנה	127,443	27,210	49,015	38,279	12,939
	שיעור	69.8%	74.5%	72.4%	67.0%	58.2%
סה"כ	מונה	599,087	116,869	225,718	185,837	70,663
	מכנה	825,708	155,086	303,185	261,730	105,707
	שיעור	72.6%	75.4%	74.4%	71.0%	66.8%

שיעור הביצוע של בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס בקרב בני 50-74

הגדרת המדד: שיעור המבוטחים שמלאו להם 50-74 שנים, שעברו לפחות בדיקה אחת של דם סמוי בצואה בשנה האחרונה או ביצעו קולונוסקופיה ב־10 השנים האחרונות.

רציונאל: סרטן המעי הגס והחלחולת הוא המחלה הממאירה השניה בהארעותה בישראל, עם כ־3,000 מקרים חדשים של סרטן חודרני המאובחנים בכל שנה. שיעורי התמותה משתנים בהתאם לשלב התפשטות המחלה בעת גילוייה (מקומי, אזורי, או מפורשט), ולאורך השנים נצפית ירידה בשיעורי התמותה באוכלוסיות בהן ישנה עלייה בשיעורי הסיקור (4,3). לכלל האוכלוסייה, הנמצאת בסיכון רגיל, ממליץ משרד הבריאות בישראל לבצע בדיקת דם סמוי בצואה אחת לשנה מגיל 50 ועד גיל 74 (5). קולונוסקופיה הינה בדיקה אופטית המאפשרת הסתכלות ישירה על המעי, שמטרתה איתור ממצאים במעי הגס, ביצוע ביופסיה והסרת פוליפים. זיהוי והסרת פוליפים שפירים עשויים למנוע התפתחות של גידולים ממאירים בעתיד. הבדיקה מומלצת לאחר תשובה לא תקינה של בדיקת דם סמוי בצואה, באופן שגרתי לבעלי סיכון מוגבר בשל היסטוריה משפחתית של ממאירות, למדווחים על תלונות בדרכי העיכול או דימום בדרכי העיכול ולבעלי ממצא קודם של נגע במעי. יש הממליצים על ביצוע בדיקה זו כסקירה מוקדמת לסרטן המעי הגס גם בקרב בעלי סיכון רגיל כל מספר שנים (במקום בדיקת דם סמוי בצואה), אולם, מן הראוי לציין שבמדינת ישראל אין הנחיה כזו (6).


מכנה: מבוטחים בני 50-74

מונה: מספר המבוטחים במכנה אשר עברו בדיקת דם סמוי בצואה לפחות פעם אחת בשנת המדד או ביצעו קולונוסקופיה ב־10 השנים האחרונות


הערות: הסיבה לביצוע קולונוסקופיה (בדיקת סקר, סימפטומים או סיבה אחרת) אינה ידועה לפי הנתונים המוצגים.

תוצאות: שיעור הביצוע של בדיקות לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס בקרב בני 50-74 עלה בין השנים 2014-2018, מ־58.3% ב־2014 ועד ל־64.7% בשנת 2018, עלייה המייצגת 166,187 מבוטחים נוספים שנסקרו. השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (65.7%) מאשר בקרב גברים (63.7%), ונמוך בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (58.5%) בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (69.8%). בין השנים 2014 ו־2018 לא נצפה צמצום של הפער בין השכבה החברתית־כלכלית החלשה והשכבה החזקה.


תרשים 22: שיעור ביצוע בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס
לפי שנה, 2014-2018



תרשים 23: שיעור ביצוע בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס
לפי גיל ומין, 2018



תרשים 24: שיעור ביצוע בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס
לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



**טבלה 14: שיעור ביצוע בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס
לפי גיל ומין – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

		גיל					
		50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	סה"כ
זכר	מונה	89,992	100,892	105,103	104,656	76,860	477,503
	מכנה	170,633	167,281	159,762	146,514	105,917	750,107
	שיעור	52.7%	60.3%	65.8%	71.4%	72.6%	63.7%
נקבה	מונה	102,731	115,950	121,363	120,294	88,738	549,076
	מכנה	183,606	182,946	177,947	166,847	124,442	835,788
	שיעור	56.0%	63.4%	68.2%	72.1%	71.3%	65.7%
סה"כ	מונה	192,723	216,842	226,466	224,950	165,598	1,026,579
	מכנה	354,239	350,227	337,709	313,361	230,359	1,585,895
	שיעור	54.4%	61.9%	67.1%	71.8%	71.9%	64.7%

**טבלה 15: שיעור ביצוע בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס
לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

		מצב חברתי-כלכלי				
		1	2	3	4	סה"כ
50-54	מונה	28,755	54,426	65,618	37,128	185,927
	מכנה	56,264	104,526	117,793	62,708	341,291
	שיעור	51.1%	52.1%	55.7%	59.2%	54.5%
55-59	מונה	27,799	65,426	75,852	39,623	208,700
	מכנה	48,904	110,176	119,046	58,571	336,697
	שיעור	56.8%	59.4%	63.7%	67.6%	62.0%
60-64	מונה	24,122	67,823	82,931	43,115	217,991
	מכנה	38,772	104,888	120,792	60,201	324,653
	שיעור	62.2%	64.7%	68.7%	71.6%	67.1%
65-69	מונה	19,555	64,487	85,813	47,149	217,004
	מכנה	29,503	92,623	117,499	62,331	301,956
	שיעור	66.3%	69.6%	73.0%	75.6%	71.9%
70-74	מונה	13,832	44,608	63,964	37,546	159,950
	מכנה	21,576	64,690	86,371	49,361	221,998
	שיעור	64.1%	69.0%	74.1%	76.1%	72.1%
סה"כ	מונה	114,063	296,770	374,178	204,561	989,572
	מכנה	195,019	476,903	561,501	293,172	1,526,595
	שיעור	58.5%	62.2%	66.6%	69.8%	64.8%

סיקור לסרטן צוואר הרחם

רציונאל: סרטן צוואר הרחם עונה על הקריטריונים לסיקור וגילוי מוקדם, בהתחשב בתקופת החביון הארוכה של התפתחותו, קיומם של נגעים טרום-סרטניים, וקיומו של טיפול המונע התקדמות של נגעים אלו לנגעים ממאירים (7). מטרתו העיקרית של הסיקור היא גילוי של נגעים טרום-ממאירים, ומתן טיפול מונע עוד בטרם התפתחו נגעים ממאירים. ברוב הארצות המפותחות, מומלץ על סיקור לגילוי מוקדם של סרטן צוואר הרחם, בין אם במסגרת תכנית סיקור יזומה, ובין אם במסגרת סיקור מזדמן (7-9) במרבית המדינות מבוצע כיום סיקור באמצעות בדיקת פאפ בגילאי 25-65 שנים בתדירות של אחת ל-3 שנים. גם בישראל, המלצת משרד הבריאות היא סיקור באמצעות בדיקת פאפ לנשים בגילאים 25-65 שנים אחת לשלוש שנים (5). החל מ-1995, משטחי צוואר הרחם נכללים בסל הבריאות, אך עבור נשים בגילאי 35-54 שנים בלבד (10). בארצות בהן קיים סיקור, נצפתה ירידה משמעותית ביותר בשיעורי התחלואה והתמותה מסרטן צוואר הרחם, לצד העליה בשיעורי הסיקור באמצעות בדיקת הפאפ. בארצות אלו עיקר התחלואה בסרטן צוואר הרחם נצפית בנשים שלא עברו סיקור נאות (7,8,11,12).

מדדים:

- ✓ שיעור הנשים בגיל 35-54 אשר ביצעו בדיקות סיקור לסרטן צוואר הרחם ב-3 השנים האחרונות.
- ✓ שיעור הנשים בגיל 35-54 אשר לא ביצעו בדיקת סיקור לסרטן צוואר הרחם ב-5 השנים האחרונות.

שיעור הנשים בגיל 35-54 אשר ביצעו בדיקות סיקור לסרטן צוואר הרחם ב־3 השנים האחרונות


הגדרת המדד: שיעור הנשים בגיל 35-54 אשר ביצעו לפחות בדיקת סיקור ציטולוגית (פאפ) אחת בשלוש השנים האחרונות

מכנה: נשים מבוטחות בגיל 35-54


מונה: מספר הנשים במכנה אשר עברו בדיקת סיקור ציטולוגית (בדיקת פאפ) לסרטן צוואר הרחם, לפחות פעם אחת בשנת המדד או בשנתיים שקדמו לשנת המדד

תוצאות: שיעור הנשים בגילאים 35-54 אשר ביצעו סיקור נאות לסרטן צוואר הרחם (ביצעו בדיקת סיקור ב־3 השנים האחרונות) עלה בין השנים 2014-2018, מ־48.1% בשנת 2014 ל־51.5% בשנת 2018. נצפה שיעור סיקור נמוך יותר בקרב נשים בנות 50-54 (46.3%) בהשוואה לנשים בגילאי 35-49 (53%) (ראה תרשים 26). שיעור הסיקור היה נמוך פי 2 בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (32.8%) בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (63.0%).

תרשים 25: שיעור הנשים שביצעו בדיקות סיקור לסרטן צוואר הרחם ב־3 השנים האחרונות לפי שנה, 2014-2018



**תרשים 26: שיעור הנשים שביצעו בדיקות סיקור לסרטן צוואר הרחם
ב־3 השנים האחרונות לפי גיל, 2018**



**תרשים 27: שיעור הנשים שביצעו בדיקות סיקור לסרטן צוואר הרחם
ב־3 השנים האחרונות לפי מצב חברתי-כלכלי, 2018**



טבלה 16: שיעור הנשים שביצעו בדיקות סיקור לסרטן צוואר הרחם ב־3 השנים האחרונות לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי						
	סה"כ	4	3	2	1	
35-39	מונה	129,338	28,057	51,956	34,269	15,056
	מכנה	243,358	43,470	85,883	69,224	44,781
	שיעור	53.1%	64.5%	60.5%	49.5%	33.6%
40-44	מונה	132,453	31,716	52,894	33,265	14,578
	מכנה	247,299	49,730	87,566	67,202	42,801
	שיעור	53.6%	63.8%	60.4%	49.5%	34.1%
45-49	מונה	116,600	28,386	45,859	30,090	12,265
	מכנה	221,787	44,733	77,810	62,323	36,921
	שיעור	52.6%	63.5%	58.9%	48.3%	33.2%
50-54	מונה	72,292	16,734	28,607	19,724	7,227
	מכנה	154,202	28,450	53,494	46,828	25,430
	שיעור	46.9%	58.8%	53.5%	42.1%	28.4%
סה"כ	מונה	450,683	104,893	179,316	117,348	49,126
	מכנה	866,646	166,383	304,753	245,577	149,933
	שיעור	52.0%	63.0%	58.8%	47.8%	32.8%

שיעור הנשים בגיל 35-54 אשר לא ביצעו בדיקת סיקור לסרטן צוואר הרחם ב־5 השנים האחרונות


הגדרת המדד: שיעור הנשים בגיל 35-54 אשר לא ביצעו בדיקת סיקור ציטולוגית (בדיקת פאפ) לסרטן צוואר הרחם ב־5 השנים האחרונות

מכנה: נשים מבוטחות בגיל 35-54


מונה: מספר הנשים במכנה אשר לא עברו בדיקת סיקור ציטולוגית (בדיקת פאפ) לסרטן צוואר הרחם בשנת המדד ובארבע השנים שקדמו לה

תוצאות: שיעור הנשים בגילאים 35-54 אשר לא ביצעו בדיקות סיקור לסרטן צוואר הרחם ב־5 השנים האחרונות ירד בין השנים 2014-2018, מ־39.0% בשנת 2014 ל־34.8% בשנת 2018. שיעור הנשים אשר לא ביצעו את בדיקת הסיקור היה גבוה יותר בקרב בנות 50-54 (39.8%) בהשוואה לנשים בנות 35-49 (32.7%) (ראה תרשים 29). שיעור הסיקור היה גבוה פי 2.4 בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (55.4%) בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (23.1%).


תרשים 28: שיעור הנשים שלא ביצעו בדיקת סיקור לסרטן צוואר הרחם ב־5 השנים האחרונות לפי שנה, 2014-2018



**תרשים 29: שיעור הנשים שלא ביצעו בדיקת סיקור לסרטן צוואר הרחם
ב־5 השנים האחרונות לפי גיל, 2018**



**תרשים 30: שיעור הנשים שלא ביצעו בדיקת סיקור לסרטן צוואר הרחם
ב־5 השנים האחרונות לפי מצב חברתי-כלכלי, 2018**




**טבלה 17: שיעור הנשים שלא ביצעו בדיקת סיקור לסרטן צוואר הרחם
ב־5 השנים האחרונות לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים
ושיעורים, 2018**

מצב חברתי-כלכלי					
	סה"כ	4	3	2	1
35-39	מונה	14,945	1,778	3,955	4,573
	מכנה	46,462	8,754	16,368	12,746
	שיעור	32.2%	20.3%	24.2%	35.9%
40-44	מונה	76,582	10,378	20,911	23,317
	מכנה	238,455	48,194	84,721	64,596
	שיעור	32.1%	21.5%	24.7%	36.1%
45-49	מונה	72,064	9,972	20,093	22,536
	מכנה	215,289	43,659	75,804	60,276
	שיעור	33.5%	22.8%	26.5%	37.4%
50-54	מונה	58,985	7,626	16,777	19,952
	מכנה	150,453	27,949	52,318	45,628
	שיעור	39.2%	27.3%	32.1%	43.7%
סה"כ	מונה	222,576	29,754	61,736	70,378
	מכנה	650,659	128,556	229,211	183,246
	שיעור	34.2%	23.1%	26.9%	38.4%

1. WHO. Breast cancer [Internet]. 2019. Available from: <https://www.who.int/cancer/prevention/diagnosis-screening/breast-cancer/en/>
2. הרישום הלאומי לסרטן, המרכז הלאומי לבקרת מחלות מה. סרטן השד בנשים בישראל [Internet]. 2019 [cited 2019 Oct 23]. Available from: https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/breast_cancer_OCTOBER2019.pdf
3. משרד הבריאות. הרישום הלאומי לסרטן-סרטן החלחולת (Rectal cancer) [Internet]. [cited 2019 Sep 11]. Available from: <http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/ICDC/ICR/CancerIncidence/Pages/Rectum.aspx>
4. Key Statistics for Colorectal Cancer [Internet]. [cited 2019 Sep 11]. Available from: <https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/about/key-statistics.html>
5. משרד הבריאות. חוזר המנהל הכללי בנושא: מניעה וגילוי מוקדם של מחלות ממאירות [Internet]. 2012 [cited 2019 Sep 11]. Available from: <http://www.cancer.org.il/template/default.aspx?PagelId=7655>
6. Telford JJ, Levy AR, Sambrook JC, Zou D, Enns RA. The cost-effectiveness of screening for colorectal cancer. CMAJ. 2010 Sep;182(12):1307–13.
7. Curry SJ, Krist AH, Owens DK, Barry MJ, Caughey AB, Davidson KW, et al. Screening for Cervical Cancer. JAMA [Internet]. 2018 Aug 21 [cited 2019 Sep 11];320(7):674 Available from: <http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jama.2018.10897>
8. Saslow D, Solomon D, Lawson HW, Killackey M, Kulasingam S, Cain J, et al. American Cancer Society, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, and American Society for Clinical Pathology Screening Guidelines for the Prevention and Early Detection of Cervical Cancer. CA Cancer J Clin [Internet]. 2012 Mar 14;62(3):147–72. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3801360/>
9. Dickinson J, Tsakonas E, Conner Gorber S, Lewin G, Shaw E, Singh H, et al. Recommendations on screening for cervical cancer. CMAJ. 2013 Jan;185(1):35–45.
10. האיגוד הישראלי למילדות וגניקולוגיה. הצעה לעדכון נייר עמדה 101 משטח מצוואר הרחם כבדיקת סריקה למניעת סרטן צוואר הרחם [Internet]. Vol. 3. 2015. Available from: <https://cdn.mednet.co.il/2015/04/18.3.15--פאפ-101סדק-פאפ-18.3.15עדכון-18.3.15.pdf>
11. WHO | Cervical cancer. WHO. 2018;
12. Quinn M, Babb P, Jones J, Allen E. Effect of screening on incidence of and mortality from cancer of cervix in England: evaluation based on routinely collected statistics. BMJ. 1999 Apr;318(7188):904–8.

ילדים ובני נוער



אנמיה בתינוקות בני 9-18 חודשים

רציונאל: זיהוי אנמיה בגיל הרך חשוב בשל הקשר של אנמיה עם התפתחות תקינה של הילד, לרבות התפתחות קוגניטיבית. אנמיה מזוהה בבדיקת דם פשוטה. אחת הסיבות השכיחות לאנמיה בגיל הרך היא חוסר בברזל, אשר ניתן לתיקון בקלות יחסית (1). בשל כך, קיימת בישראל הנחייה של משרד הבריאות לבצע סיקור שגרתי של כלל התינוקות לאנמיה בגיל שנה לערך. נתונים מישראל מראים מגמה ברורה של ירידה בהימצאות אנמיה בתינוקות, במיוחד באוכלוסייה היהודית, מאז ההמלצות של משרד הבריאות ב־1985 (2).

מדדים:

- ✓ שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין בתינוקות בני 9-18 חודשים
- ✓ שיעור ההימצאות של אנמיה בקרב תינוקות בני 9-18 חודשים

שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין בתינוקות בני 9-18 חודשים


הגדרת המדד: שיעור התינוקות בני שנה שביצעו בדיקת המוגלובין לפחות פעם אחת בשנת המדד

מכנה: תינוקות אשר מלאו להם 9-18 חודשים במהלך שנת המדד


מונה: מספר התינוקות במכנה שביצעו בדיקת המוגלובין בשנת המדד

תוצאות: שיעור הביצוע של ספירת דם לזיהוי אנמיה (בדיקת המוגלובין) בתינוקות נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 88.3% ב-2018. השיעור היה דומה בקרב בנות ובנים. השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (86.3%) היה מעט נמוך יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (90.5%).

תרשים 31: שיעור ביצוע בדיקת המוגלובין בתינוקות לפי שנה, 2014-2018



**תרשים 32: שיעור ביצוע בדיקת המוגלובין בתינוקות
לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018**



טבלה 18: שיעור ביצוע בדיקת המוגלובין בתינוקות לפי מצב חברתי-כלכלי ומין - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		מצב חברתי-כלכלי					
		סה"כ	4	3	2	1	
זכר	מונה	77,590	9,781	22,724	23,698	21,387	
	מכנה	87,678	10,759	25,290	26,935	24,694	
	שיעור	88.5%	90.9%	89.9%	88.0%	86.6%	
נקבה	מונה	73,114	9,321	21,534	22,071	20,188	
	מכנה	83,097	10,351	24,087	25,194	23,465	
	שיעור	88.0%	90.0%	89.4%	87.6%	86.0%	
סה"כ	מונה	150,704	19,102	44,258	45,769	41,575	
	מכנה	170,775	21,110	49,377	52,129	48,159	
	שיעור	88.2%	90.5%	89.6%	87.8%	86.3%	

שיעור ההימצאות של אנמיה בקרב תינוקות בני 9-18 חודשים


הגדרת המדד: שיעור התינוקות שהוגדרו כסובלים מאנמיה על סמך בדיקת הדם האחרונה בין הגילאים 9-18 חודשים

מכנה: תינוקות שביצעו בדיקת המוגלובין בין הגילאים 9-18 חודשים בשנת המדד

מונה: מספר התינוקות במכנה שרמת המוגלובין האחרונה שנמדדה להם נמוכה או שווה ל-10.5 מ"ג/ד"ל

תוצאות: בשיעור ההימצאות של אנמיה בקרב תינוקות נצפו תנודות קלות, ללא מגמת שינוי לאורך השנים, כאשר השיעור עמד על 8.2% ב-2018. השיעור היה דומה בקרב בנות ובנים. השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (9.1%) היה גבוה בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (7.6%).

תרשים 33: שיעור ההימצאות אנמיה בתינוקות לפי שנה, 2014-2018



תרשים 34: שיעור הימצאות אנמיה בתינוקות לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 19: שיעור הימצאות אנמיה בתינוקות לפי מצב חברתי-כלכלי ומין - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי							
סה"כ	4	3	2	1			
6,504	750	1,805	1,917	2,032	מונה	זכר	
77,590	9,781	22,724	23,698	21,387	מכנה		
8.4%	7.7%	7.9%	8.1%	9.5%	שיעור		
5,929	710	1,634	1,814	1,771	מונה	נקבה	
73,114	9,321	21,534	22,071	20,188	מכנה		
8.1%	7.6%	7.6%	8.2%	8.8%	שיעור		
12,433	1,460	3,439	3,731	3,803	מונה	סה"כ	
150,704	19,102	44,258	45,769	41,575	מכנה		
8.2%	7.6%	7.8%	8.2%	9.1%	שיעור		

ניטור משקל וגובה והתפלגות אחוזוני BMI בקרב ילדים בני 7

רציונאל: השמנה בקרב ילדים הינה אחת הבעיות המרכזיות בבריאות הציבור בשל השלכותיה בטווח הקצר והארוך (3). עודף משקל או השמנת יתר בגיל הילדות מעלים את הסיכון בבגרות להשמנה, תחלואה במחלות לב וכלי דם, סוכרת, דלקת מפרקים ניוונית וסרטן (4). איתור ילדים ובני נוער הסובלים ממשקל לא תקין הוא בעל חשיבות רבה, שכן איתור מוקדם מאפשר הכוונה לאורח חיים בריא כבר בתקופת הילדות, במטרה לבסס אורח חיים והתנהגות בריאה בטווח הארוך. ערכי BMI עשויים גם לזהות ילדים ובני נוער הנמצאים בתת משקל, להצביע על חסכים תזונתיים ואף להצביע על הפרעות אכילה, המתגלות בגילאים אלה (5). בקרב ילדים, קטגוריות המשקל מוגדרות לפי אחוזוני BMI המותאמים לגיל ומין. על פי הגדרת ארגון הבריאות העולמי, אחוזון BMI 2.3 או פחות מוגדר כרזון, אחוזון 85 עד אחוזון 97.6 מוגדר כעודף משקל ואחוזון 97.7 ומעלה מוגדר כהשמנת יתר (6). הן נתוני סקר מצב בריאות ותזונה והן נתוני בדיקות גדילה של תלמידי בתי ספר בישראל הראו כי שיעורי עודף משקל והשמנה בקרב ילדים ונוער עולים במידה ניכרת עם הגיל עד חטיבת הביניים (7). המלצת משרד הבריאות היא לתעד משקל וגובה לפחות פעם אחת בגילאי 2-4 ובגילאי 5-7 שנים. מגיל 14 ומעלה ההמלצה הינה לתעד לפחות אחת לשלוש שנים (8).

מדדים:

- ✓ שיעור התיעוד של מדידת גובה ומשקל בקרב ילדים בני 7
- ✓ שיעור ההימצאות של רזון בקרב ילדים בני 7
- ✓ שיעור ההימצאות של עודף משקל בקרב ילדים בני 7
- ✓ שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב ילדים בני 7

שיעור התיעוד של מרכיבי BMI ומשקל בקרב ילדים בני 7


הגדרת המדד: שיעור המבוטחים בני 7 שנים עם תיעוד אחד לפחות של משקל וגובה בין הגילאים 6-5

מכנה: מבוטחים בני 7


מונה: מספר המבוטחים במכנה עם תיעוד אחד לפחות של משקל וגובה בין הגילאים 6-5

תוצאות: שיעור התיעוד של מרכיבי BMI בקרב ילדים בני 7 עלה בין השנים 2014-2016, מ-75.2% בשנת 2014 ל-79.9% בשנת 2016 עד להתייצבות ואף ירידה קלה בשנתיים האחרונות, כאשר השיעור בשנת 2018 עמד על 79.2%. השיעור היה דומה בקרב בנות ובנים. השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (80.7%) היה מעט גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (75.5%).

תרשים 35: שיעור תיעוד של מרכיבי BMI ומשקל בקרב ילדים בני 7 לפי שנה, 2018-2014



תרשים 36: שיעור תיעוד של מרכיבי BMI ומשקל בקרב ילדים בני 7 לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 20: שיעור תיעוד של מרכיבי BMI ומשקל בקרב ילדים בני 7 לפי מצב חברתי-כלכלי ומין – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי					
	סה"כ	4	3	2	1
זכר	מונה	16,417	17,055	17,982	8,662
	מכנה	20,240	21,552	22,949	11,351
	שיעור	81.1%	79.1%	78.4%	76.3%
נקבה	מונה	15,640	15,981	17,088	7,994
	מכנה	19,478	20,420	21,891	10,716
	שיעור	80.3%	78.3%	78.1%	74.6%
סה"כ	מונה	32,057	33,036	35,070	16,656
	מכנה	39,718	41,972	44,840	22,067
	שיעור	80.7%	78.7%	78.2%	75.5%

שיעור ההימצאות של רזון בקרב ילדים בני 7


הגדרת המדד: התפלגות קטגוריות מסת הגוף בקרב מבוטחים בני 7: רזון

מכנה: מבוטחים שמלאו להם 7 שנים בשנת המדד עם תיעוד אחד לפחות של משקל וגובה בין הגילאים 5-6

מונה: מספר המבוטחים במכנה עם ערך אחוזון BMI קטן או שווה ל 2.3

תוצאות: שיעור ההימצאות של רזון בקרב ילדים שמלאו להם 7 שנים בשנת המדד נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 4.3% בשנת 2018. השיעור היה נמוך יותר בקרב בנות (3.7%) מאשר בקרב בנים (4.8%). השיעור היה גבוה פי 2.1 בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (6.1%) בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (3.0%).

**תרשים 37: שיעור ההימצאות של רזון בקרב ילדים שמלאו להם 7 שנים
לפי שנה, 2014-2018**



**תרשים 38: שיעור ההימצאות של רזון בקרב ילדים שמלאו להם 7 שנים
לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018**



**טבלה 21: שיעור ההימצאות של רזון בקרב ילדים שמלאו להם 7 שנים
לפי מצב חברתי-כלכלי ומין - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

מצב חברתי-כלכלי						
	1	2	3	4	סה"כ	
זכר	מונה	1,081	786	722	315	2,904
	מכנה	16,417	17,055	17,982	8,662	60,116
	שיעור	6.6%	4.6%	4.0%	3.6%	4.8%
נקבה	מונה	886	545	468	183	2,082
	מכנה	15,640	15,981	17,088	7,994	56,703
	שיעור	5.7%	3.4%	2.7%	2.3%	3.7%
סה"כ	מונה	1,967	1,331	1,190	498	4,986
	מכנה	32,057	33,036	35,070	16,656	116,819
	שיעור	6.1%	4.0%	3.4%	3.0%	4.3%

שיעור ההימצאות של עודף משקל בקרב ילדים בני 7


הגדרת המדד: התפלגות קטגוריות מסת הגוף בקרב מבוטחים בני 7: עודף משקל

מכנה: מבוטחים שמלאו להם 7 שנים בשנת המדד עם תיעוד אחד לפחות של משקל וגובה בין הגילאים 5-6


מונה: מספר המבוטחים במכנה עם ערך אחוזון BMI גדול או שווה ל-85 וקטן מ-97.7

תוצאות: שיעור ההימצאות של עודף משקל בקרב ילדים שמלאו להם 7 שנים בשנת המדד ירד בין השנים 2014-2018, מ-13.2% בשנת 2014 ל-11.2% בשנת 2018. השיעור היה גבוה יותר בקרב בנות (11.6%) מאשר בקרב בנים (10.8%). השיעור הגבוה ביותר נמצא בשכבה החברתית-כלכלית השניה (12.0%) ואילו השיעור הנמוך ביותר נצפה בשכבה החברתית-כלכלית החלשה ביותר (10.0%).

תרשים 39: שיעור הימצאות עודף משקל בקרב ילדים לפי שנה, 2014-2018



תרשים 40: שיעור הימצאות עודף משקל בקרב ילדים לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 22: שיעור הימצאות עודף משקל בקרב ילדים לפי מצב חברתי-כלכלי ומין - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי					
	סה"כ	4	3	2	1
זכר	מונה	6,532	2,002	1,960	1,615
	מכנה	60,116	8,662	17,982	17,055
	שיעור	10.9%	11.0%	11.1%	11.5%
נקבה	מונה	6,674	980	2,107	1,993
	מכנה	56,703	7,994	17,088	15,981
	שיעור	11.8%	12.3%	12.3%	12.5%
סה"כ	מונה	13,206	1,935	4,109	3,953
	מכנה	116,819	16,656	35,070	33,036
	שיעור	11.3%	11.6%	11.7%	12.0%

שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב ילדים בני 7


הגדרת המדד: התפלגות קטגוריות מסת הגוף בקרב מבוטחים בני 7: השמנת יתר

מכנה: מבוטחים שמלאו להם 7 שנים בשנת המדד עם תיעוד אחד לפחות של משקל וגובה בין הגילאים 6-5

מונה: מספר המבוטחים במכנה עם ערך אחוזון BMI גדול או שווה ל 97.7

תוצאות: שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב ילדים שמלאו להם 7 שנים בשנת המדד ירד בין השנים 2015-2018, מ־8.1% בשנת 2015 ל־6.9% בשנת 2018. השיעור היה נמוך יותר בקרב בנות (6.5%) מאשר בקרב בנים (7.3%). השיעור הגבוה ביותר נמצא בשכבה החברתית-כלכלית השניה (8.3%) ואילו השיעור הנמוך ביותר נצפה בשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (5.5%).

תרשים 41: שיעור הימצאות השמנת יתר בקרב ילדים לפי שנה, 2014-2018



**תרשים 42: שיעור הימצאות השמנת יתר בקרב ילדים
לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018**



**טבלה 23: שיעור הימצאות השמנת יתר בקרב ילדים
לפי מצב חברתי-כלכלי ומין – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

מצב חברתי-כלכלי						
	סה"כ	4	3	2	1	
זכר	מונה	4,410	508	1,309	1,475	1,118
	מכנה	60,116	8,662	17,982	17,055	16,417
	שיעור	7.3%	5.9%	7.3%	8.6%	6.8%
	מונה	3,721	404	1,185	1,264	868
נקבה	מכנה	56,703	7,994	17,088	15,981	15,640
	שיעור	6.6%	5.1%	6.9%	7.9%	5.5%
	מונה	8,131	912	2,494	2,739	1,986
	מכנה	116,819	16,656	35,070	33,036	32,057
סה"כ	שיעור	7.0%	5.5%	7.1%	8.3%	6.2%

שיעור התיעוד של מרכיבי BMI בקרב בני 14-18


הגדרת המדד: שיעור התיעוד של מרכיבי BMI בקרב בני 14-18

מכנה: מבוטחים בני 14-18


מונה: מבוטחים במכנה עם תיעוד מרכיבי BMI (גובה ומשקל) בשלוש השנים האחרונות

תוצאות: שיעור התיעוד של מרכיבי BMI בקרב בני 14-18 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 76.8% ב-2018. השיעור היה דומה בקרב בנות ובנים. השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (72.2%) היה נמוך יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (80.4%).

תרשים 43: שיעור תיעוד מרכיבי BMI בבני נוער לפי שנה, 2014-2018



תרשים 44: שיעור תיעוד מרכיבי BMI בבני נוער לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018




טבלה 24: שיעור תיעוד מרכיבי BMI בבני נוער לפי מצב חברתי-כלכלי ומין – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי						
	סה"כ	4	3	2	1	
זכר	מונה	222,769	30,961	61,279	64,534	65,995
	מכנה	290,089	38,190	75,610	83,755	92,534
	שיעור	76.8%	81.1%	81.0%	77.1%	71.3%
נקבה	מונה	213,257	28,794	58,024	62,176	64,263
	מכנה	277,413	36,110	72,356	81,030	87,917
	שיעור	76.9%	79.7%	80.2%	76.7%	73.1%
סה"כ	מונה	436,026	59,755	119,303	126,710	130,258
	מכנה	567,502	74,300	147,966	164,785	180,451
	שיעור	76.8%	80.4%	80.6%	76.9%	72.2%

רשימת ספרות

1. Pala E, Erguven M, Guven S, Erdogan M, Balta T. Psychomotor development in children with iron deficiency and iron-deficiency anemia. Food Nutr Bull. 2010 Sep;31(3):431–5.
2. [Internet]. חוזר ראש שירותי בריאות הציבור. תדריך למניעת אנמיה וחוסר ברזל בתינוקות ובפעוטות. 2012. משרד הבריאות. p. 1–95. Available from: https://www.health.gov.il/hozer/BZ17_2012.pdf
3. Gungor NK. Overweight and obesity in children and adolescents. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2014 Sep;6(3):129–43.
4. OECD. Health at a Glance 2017 [Internet]. 2017. Available from: http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2017_health_glance-2017-en
5. Reilly JJ. Assessment of obesity in children and adolescents: synthesis of recent systematic reviews and clinical guidelines. J Hum Nutr Diet. 2010 Jun;23(3):205–11.
6. WHO | BMI-for-age (5-19 years) [Internet]. WHO. World Health Organization; 2015 [cited 2019 Sep 10]. Available from: http://www.who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/en/#.W_jz34f-jM.mendeley
7. [Internet]. הבריאות מ. נתוני הערכת גדילה של תלמידים בישראל, משרד הבריאות [cited 2019 Sep 11]. Available from: <https://www.health.gov.il/Subjects/KidsAndMatures/school/Pages/BI.aspx>
8. [Internet]. חוזר המנהל הכללי. חובת תיעוד של גורמי סיכון ואורחות חיים בתיק הרפואי הממוחשב. 2011. משרד הבריאות. Available from: https://www.health.gov.il/hozer/mk21_2011.pdf

מבוגרים בני 65 ומעלה



שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בקרב בני 65 ומעלה

הגדרת המדד: שיעור המבוטחים בני 65 ומעלה אשר קבלו חיסון נגד שפעת עונתית

רצינות: מחלת השפעת היא מחלה זיהומית נגיפית המתבטאת לרוב בחום גבוה, צמרמורות, כאבי גרון ושיעול, כאבי שרירים וראש ותשישות. הסיבוך המרכזי המופיע בעקבות שפעת עונתית הוא דלקת ריאות, אך ככל הנראה, תחלואה בשפעת אף מחמירה תחלואה כרונית קיימת ותורמת לתמותה בעונת החורף ממחלות ריאה ולב (2,1). גורמי סיכון לסיבוכי המחלה כוללים גיל (קשישים או ילדים צעירים מאד), הריון, מחלות רקע כרוניות כגון סוכרת, השמנת יתר חולנית, מחלות לב, מחלות דרכי הנשימה ומחלות המדכאות את מערכת החיסון. הטיפול בשפעת כולל בדרך כלל טיפול תומך וטיפול בסיבוכי המחלה (דלקת ריאות ומצוקה נשימתית). לאור זאת, האמצעי היעיל ביותר הינו מניעה ראשונית על ידי חיסון נגד נגיף השפעת. היעילות האפשרית של החיסון במניעת שפעת וסיבוכיה כוללת מניעת תחלואה של הפרט וכן צמצום ההעברה והגבלת היקפי ההתפרצויות. שפעת עונתית מתחילה בדרך כלל בחודשי הסתיו (אוקטובר-נובמבר) ומגיעה לשיאה בחורף (דצמבר-ינואר) (3). בשל ההשתנות השנתית של זני השפעת יש צורך בחיסון חוזר כל שנה (4).


מכנה: כלל המבוטחים בני 65 ומעלה

מונה: מספר המבוטחים במכנה אשר חוסנו בפועל נגד שפעת עונתית

הערות: תקופת המדד הינה מ' 1 בספטמבר של שנת המדד ועד 28 בפברואר בשנה שאחריה, בחפיפה לתקופת מתן החיסון.

תוצאות: שיעור המחוסנים בקרב בני 65 ומעלה עלה מ-63.4% בשנת 2014 ל-64.3% בשנת 2015, אך ירד בשנים הבאות לכדי 60.4% ב-2018. השיעור היה מעט נמוך יותר בקרב נשים (58.4%) מאשר בקרב גברים (62.9%). לא נצפה קשר מונוטוני עם מצב חברתי-כלכלי, כאשר השיעור הנמוך ביותר נצפה בשכבה החברתית-כלכלית השניה (57.0%) והשיעור הגבוה ביותר נצפה בשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (65.2%).


תרשים 45: שיעור קבלת חיסון נגד שפעת לפי שנה, 2014–2018



תרשים 46: שיעור קבלת חיסון נגד שפעת לפי גיל ומין, 2018



תרשים 47: שיעור קבלת חיסון נגד שפעת לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 25: שיעור קבלת חיסון נגד שפעת לפי גיל ומין – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל						
		סה"כ	85+	80-84	75-79	70-74		
זכר	מונה	274,023	29,445	37,314	48,510	72,418	86,336	
	מכנה	435,305	40,718	51,931	71,480	113,530	157,646	
	שיעור	62.9%	72.3%	71.9%	67.9%	63.8%	54.8%	
נקבה	מונה	321,063	45,191	47,940	57,364	78,492	92,076	
	מכנה	549,658	70,585	73,982	92,209	133,352	179,530	
	שיעור	58.4%	64.0%	64.8%	62.2%	58.9%	51.3%	
סה"כ	מונה	595,086	74,636	85,254	105,874	150,910	178,412	
	מכנה	984,963	111,303	125,913	163,689	246,882	337,176	
	שיעור	60.4%	67.1%	67.7%	64.7%	61.1%	52.9%	

טבלה 26: שיעור קבלת חיסון נגד שפעת לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		מצב חברתי-כלכלי						
		סה"כ	4	3	2	1		
65-69	מונה	171,706	37,236	65,767	50,587	18,116		
	מכנה	325,052	65,791	125,632	100,829	32,800		
	שיעור	52.8%	56.6%	52.3%	50.2%	55.2%		
70-74	מונה	145,468	34,224	56,488	40,203	14,553		
	מכנה	238,094	51,991	92,186	70,111	23,806		
	שיעור	61.1%	65.8%	61.3%	57.3%	61.1%		
75-79	מונה	102,188	20,972	38,518	31,927	10,771		
	מכנה	158,112	29,635	58,949	52,563	16,965		
	שיעור	64.6%	70.8%	65.3%	60.7%	63.5%		
80-84	מונה	82,440	18,026	31,437	25,444	7,533		
	מכנה	121,809	24,439	46,104	40,005	11,261		
	שיעור	67.7%	73.8%	68.2%	63.6%	66.9%		
85+	מונה	72,206	17,371	27,696	21,213	5,926		
	מכנה	107,756	24,057	41,074	33,649	8,976		
	שיעור	67.0%	72.2%	67.4%	63.0%	66.0%		
סה"כ	מונה	574,008	127,829	219,906	169,374	56,899		
	מכנה	950,823	195,913	363,945	297,157	93,808		
	שיעור	60.4%	65.2%	60.4%	57.0%	60.7%		

שיעור קבלת חיסון נגד פניאומוקוק בקרב בני 65-74

הגדרת המדד: שיעור המבוטחים בני 65-74 אשר קבלו חיסון נגד חיידק הפניאומוקוק

רציונאל: זיהומים הנגרמים על ידי חיידק הפניאומוקוק (*Streptococcus pneumoniae*) הינם גורם משמעותי לתחלואה ותמותה ברחבי העולם, בייחוד בילדים ובקשישים. תחלואה פניאומוקוקלית כוללת דלקת ריאות ודלקות אוזניים וכן מחלות פולשניות, כגון דלקת קרום המוח, זיהום בדם, ואלח דם (5). גורמי סיכון לסיבוכי המחלה כוללים גיל (קשישים מעל גיל 65 וילדים צעירים מגיל שנתיים), מחלות רקע כגון סוכרת, מחלות לב וכלי דם, מחלות ריאה ודרכי הנשימה, וכן מחלות המדכאות את מערכת החיסון. הפניאומוקוק הוא חיידק נפוץ. שיעורי התחלואה הפניאומוקוקלית במבוגרים משתנים במהלך עונות השנה, עם שיעורים גבוהים יותר בחודשי החורף, במקביל לזיהומים נשימתיים אחרים. החיסון נגד זיהום פניאומוקוקלי במבוגרים מורכב מאנטיגנים קפסולריים פוליסכרידים מנוקים של 23 הזנים הנפוצים ביותר של חיידק הפניאומוקוק. יעילות החיסון כנגד מחלה פולשנית בקרב סך אוכלוסיית המבוגרים נעה בין 50%-70% ויורדת עם העלייה בגיל, כאשר מעל גיל 85 יעילות החיסון נמוכה מ-50% (6). משרד הבריאות ממליץ על חיסון נגד חיידק הפניאומוקוק (החיסון הפוליסכרידי) החל מגיל שנתיים, עבור אוכלוסייה שנמצאת בסיכון גבוה לזיהום פניאומוקוקלי. עבור בני 65 ומעלה מומלץ החיסון עבור מי שלא חוסנו בעבר, או שחוסנו במנה אחת של התרכיב לפני גיל 65 שנים, אם חלפו 5 שנים לפחות מהמנה האחרונה (7).


מכנה: מבוטחים בני 65-74

מונה: מספר המבוטחים במכנה אשר חוסנו בפועל נגד פניאומוקוק פעם אחת לאחר גיל 65 או בחמש השנים האחרונות


הערות: מדד זה מתייחס לחיסונים נגד זיהומים פניאומוקוקליים הניתנים באמצעות התרכיב הפוליסכרידי (הכולל 23 זנים של החיידק) בקרב אוכלוסיית המבוגרים בני 65-74.

תוצאות: שיעור החיסון נגד פניאומוקוק בקרב בני 65-74 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 77.5% ב-2018. השיעור היה מעט נמוך יותר בקרב נשים (75.8%) מאשר בקרב גברים (79.5%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (81.6%) היה מעט גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (78.4%).

תרשים 48: שיעור קבלת חיסון נגד פניאומקוק לפי שנה, 2014-2018




תרשים 49: שיעור קבלת חיסון נגד פניאומקוק לפי גיל ומין, 2018



תרשים 50: שיעור קבלת חיסון נגד פניאומקוק לפי מצב

חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 27: שיעור קבלת חיסון נגד פניאומקוק לפי גיל ומין – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל		
		סה"כ	70-74	65-69
זכר	מונה	201,716	91,623	110,093
	מכנה	253,690	104,504	149,186
	שיעור	79.5%	87.7%	73.8%
נקבה	מונה	221,227	102,541	118,686
	מכנה	292,042	122,387	169,655
	שיעור	75.8%	83.8%	70.0%
סה"כ	מונה	422,943	194,164	228,779
	מכנה	545,732	226,891	318,841
	שיעור	77.5%	85.6%	71.8%

טבלה 28: שיעור קבלת חיסון נגד פניאומקוק לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		מצב חברתי-כלכלי				
		סה"כ	4	3	2	1
65-69	מונה	220,407	45,751	84,225	67,137	23,294
	מכנה	307,249	63,172	119,246	94,523	30,308
	שיעור	71.7%	72.4%	70.6%	71.0%	76.9%
70-74	מונה	187,008	42,217	72,696	53,614	18,481
	מכנה	218,582	48,965	85,249	63,453	20,915
	שיעור	85.6%	86.2%	85.3%	84.5%	88.4%
סה"כ	מונה	407,415	87,968	156,921	120,751	41,775
	מכנה	525,831	112,137	204,495	157,976	51,223
	שיעור	77.5%	78.4%	76.7%	76.4%	81.6%

ניטור משקל הגוף בקרב מבוגרים בני 65 ומעלה

רציונאל: ניטור משקל הגוף בגיל המבוגר הוא בעל חשיבות מרובה. שינויים פיזיולוגיים המתרחשים עם הגיל, מחלות כרוניות, ריבוי תרופות וכן דמנציה, דיכאון ומחלות חלל הפה יכולים להביא לתת תזונה בגיל המבוגר, וזו קשורה בתמותת יתר ובתחלואה. ירידה בלתי רצונית במשקל גוף בקרב קשישים הינה סמן אזהרה לשבריריות ודורשת בירור. כמו כן, זיהוי פרטים באוכלוסייה הסובלים מהשמנת יתר מאפשר התאמת התערבות להתמודדות עם אחד מגורמי הסיכון המשמעותיים ביותר למחלות כרוניות רבות בעידן המודרני. קיימת חשיבות רבה למתן תשומת לב לזיהוי השמנה וטיפול בה, בעיקר לפני הופעת תחלואה נלוות (8).

מדדים:

- ✓ שיעור התיעוד של מרכיבי BMI בקרב בני 65-84
- ✓ שיעור המבוגרים בני 75 ומעלה שחלה ירידה משמעותית במשקלם בשנתיים האחרונות
- ✓ שיעור ההימצאות של תת משקל בקרב מבוגרים בני 75 ומעלה
- ✓ שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב בני 65-84

שיעור התיעוד של מרכיבי BMI בקרב בני 65-84


הגדרת המדד: שיעור התיעוד של מרכיבי BMI בקרב בני 65-84

מכנה: מבוטחים בני 65-84


מונה: מספר המבוטחים במכנה עם תיעוד מרכיבי BMI משקל: לפחות פעם אחת בשנת המדד, וגובה: לפחות פעם אחת מגיל 65 ועד גיל 83 שנים.

תוצאות: שיעור התיעוד של מרכיבי BMI בקרב בני 65-84 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 79.6% ב-2018. השיעור היה דומה בקרב נשים וגברים. השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (82.0%) היה מעט גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (76.7%).


תרשים 51: תיעוד מרכיבי BMI לפי שנה, 2014-2018



תרשים 52: תיעוד מרכיבי BMI לפי גיל ומין, 2018



תרשים 53: תיעוד מרכיבי BMI לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



**טבלה 29: תיעוד מרכיבי BMI לפי גיל ומין –
מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

גיל						
	סה"כ	80-84	75-79	70-74	65-69	
זכר	מונה	308,323	36,040	58,971	93,737	119,575
	מכנה	386,955	44,299	71,480	113,530	157,646
	שיעור	79.7%	81.4%	82.5%	82.6%	75.9%
נקבה	מונה	371,670	49,403	75,202	110,237	136,828
	מכנה	467,598	62,507	92,209	133,352	179,530
	שיעור	79.5%	79.0%	81.6%	82.7%	76.2%
סה"כ	מונה	679,993	85,443	134,173	203,974	256,403
	מכנה	854,553	106,806	163,689	246,882	337,176
	שיעור	79.6%	80.0%	82.0%	82.6%	76.0%

**טבלה 30: תיעוד מרכיבי BMI לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל –
מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

מצב חברתי-כלכלי						
	סה"כ	4	3	2	1	
65-69	מונה	246,602	47,392	94,996	77,850	26,364
	מכנה	325,052	65,791	125,632	100,829	32,800
	שיעור	75.9%	72.0%	75.6%	77.2%	80.4%
70-74	מונה	196,267	41,366	76,512	58,054	20,335
	מכנה	238,094	51,991	92,186	70,111	23,806
	שיעור	82.4%	79.6%	83.0%	82.8%	85.4%
75-79	מונה	129,263	23,842	48,771	42,697	13,953
	מכנה	158,112	29,635	58,949	52,563	16,965
	שיעור	81.8%	80.5%	82.7%	81.2%	82.2%
80-84	מונה	82,482	16,201	31,497	27,147	7,637
	מכנה	103,337	20,586	38,873	34,192	9,686
	שיעור	79.8%	78.7%	81.0%	79.4%	78.8%
סה"כ	מונה	654,614	128,801	251,776	205,748	68,289
	מכנה	824,595	168,003	315,640	257,695	83,257
	שיעור	79.4%	76.7%	79.8%	79.8%	82.0%

שיעור המבוגרים בני 65 ומעלה שחלה ירידה משמעותית במשקלם בשנתיים האחרונות


הגדרת המדד: שיעור המבוגרים בני 65 ומעלה שחלה ירידה משמעותית במשקלם בשנתיים האחרונות

מכנה: מבוטחים בני 65 ומעלה עם תיעוד משקל בשנת המדד ולפחות תיעוד משקל נוסף אחד בשנת המדד או בשנה שלפני שנת המדד


מונה: מספר המבוטחים במכנה שאיבדו 10% ממשקלם או יותר בשנת המדד בהשוואה למשקל הגבוה ביותר שתועד עבורם בשנתיים האחרונות

תוצאות: שיעור המבוגרים בני 65 ומעלה שחלה ירידה משמעותית במשקלם בשנתיים האחרונות נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 6.2% ב-2018. השיעור היה גבוה יותר בקרב נשים (7.9%) מאשר בקרב גברים (6.9%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (8.6%) היה גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (6.7%). השיעור עלה עם הגיל והיה גבוה בערך פי 2 בבני 85 ומעלה לעומת בני 65-69.


תרשים 54: שיעור המבוגרים שחלה ירידה משמעותית במשקלם לפי שנה, 2014-2018



**תרשים 55: שיעור המבוגרים שחלה ירידה משמעותית במשקלם
לפי גיל ומין, 2018**



**תרשים 56: שיעור המבוגרים שחלה ירידה משמעותית במשקלם
לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018**



**טבלה 31: שיעור המבוגרים שחלה ירידה משמעותית במשקלם
לפי גיל ומין - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

		גיל				
		סה"כ	85+	80-84	75-79	65-69
זכר	מונה	11,975	2,374	2,612	3,070	3,919
	מכנה	198,895	27,851	37,709	51,213	82,122
	שיעור	6.0%	8.5%	6.9%	6.0%	4.8%
	מונה	17,623	4,053	4,168	4,331	5,071
נקבה	מכנה	253,896	41,969	51,394	65,448	95,085
	שיעור	6.9%	9.7%	8.1%	6.6%	5.3%
	מונה	29,598	6,427	6,780	7,401	8,990
	מכנה	452,791	69,820	89,103	116,661	177,207
	שיעור	6.5%	9.2%	7.6%	6.3%	5.1%

**טבלה 32: שיעור המבוגרים שחלה ירידה משמעותית במשקלם
לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

מצב חברתי-כלכלי						
	סה"כ	4	3	2	1	
65-69	מונה	8,645	1,428	3,258	2,832	1,127
	מכנה	169,962	31,824	66,129	53,774	18,235
	שיעור	5.1%	4.5%	4.9%	5.3%	6.2%
		7,121	1,157	2,473	2,532	959
75-79	מונה	112,129	20,289	42,481	37,098	12,261
	מכנה					
	שיעור	6.4%	5.7%	5.8%	6.8%	7.8%
		6,558	1,120	2,486	2,242	710
80-84	מונה	85,856	16,789	33,220	27,974	7,873
	מכנה					
	שיעור	7.6%	6.7%	7.5%	8.0%	9.0%
		6,208	1,178	2,489	1,996	545
85+	מונה	67,399	14,304	26,540	20,975	5,580
	מכנה					
	שיעור	9.2%	8.2%	9.4%	9.5%	9.8%
		28,532	4,883	10,706	9,602	3,341
סה"כ	מונה	435,346	83,206	168,370	139,821	43,949
	מכנה					
	שיעור	6.6%	5.9%	6.4%	6.9%	7.6%

שיעור ההימצאות של תת משקל בקרב מבוגרים בני 75 ומעלה


הגדרת המדד: שיעור ההימצאות של תת משקל בקרב מבוגרים בני 75 ומעלה

מכנה: מבוטחים בני 75 ומעלה עם תיעוד מרכיבי BMI משקל: לפחות פעם אחת בשנת המדד, וגובה: לפחות פעם אחת אחרי גיל 65.


מונה: מספר המבוטחים במכנה עם ערך BMI נמוך מ-23 ק"ג/מ"ר

תוצאות: שיעור ההימצאות של תת משקל בקרב מבוגרים בני 75 ומעלה נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 14.3% ב-2018. השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (14.8%) מאשר בקרב גברים (13.5%). השיעור היה נמוך יותר בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (13.2%) בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (16.1%).


תרשים 57: שיעור הימצאות תת משקל לפי שנה, 2014-2018



תרשים 58: שיעור הימצאות תת משקל לפי גיל ומין, 2018



תרשים 59: שיעור הימצאות תת משקל לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 33: שיעור הימצאות תת משקל לפי גיל ומין -

מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל			
		סה"כ	85+	80-84	75-79
זכר	מונה	18,049	5,344	5,526	7,179
	מכנה	133,376	31,615	42,802	58,959
	שיעור	13.5%	16.9%	12.9%	12.2%
נקבה	מונה	27,063	8,751	8,092	10,220
	מכנה	183,168	49,094	58,881	75,193
	שיעור	14.8%	17.8%	13.7%	13.6%
סה"כ	מונה	45,112	14,095	13,618	17,399
	מכנה	316,544	80,709	101,683	134,152
	שיעור	14.3%	17.5%	13.4%	13.0%

טבלה 34: שיעור הימצאות תת משקל לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל –
מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי					
	סה"כ	4	3	2	1
75-79	מונה	16,764	3,684	6,431	5,035
	מכנה	129,242	23,837	48,763	42,691
	שיעור	13.0%	15.5%	13.2%	11.8%
		11.6%			
80-84	מונה	13,129	2,881	5,184	3,921
	מכנה	98,185	19,428	37,698	32,055
	שיעור	13.4%	14.8%	13.8%	12.2%
		12.7%			
85+	מונה	13,594	3,102	5,346	4,020
	מכנה	78,043	16,820	30,452	24,364
	שיעור	17.4%	18.4%	17.6%	16.5%
		17.6%			
סה"כ	מונה	43,487	9,667	16,961	12,976
	מכנה	305,470	60,085	116,913	99,110
	שיעור	14.2%	16.1%	14.5%	13.1%
		13.2%			

שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב בני 65-84


הגדרת המדד: שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב בני 65-84

מכנה: מבוטחים בני 65-83 עם תיעוד מרכיבי חישוב BMI משקל: לפחות פעם אחת בשנת המדד, וגובה: לפחות פעם אחת אחרי גיל 65.


מונה: מספר המבוטחים במכנה עם ערך BMI גדול או שווה מ' 30 ק"ג/מ"ר

תוצאות: שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב בני 65-84 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 33.0% ב-2018. השיעור היה גבוה יותר בקרב נשים (37.2%) מאשר בקרב גברים (28.0%). השיעור היה גבוה פי 1.7 בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (42.9%) בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (24.6%).


תרשים 60: שיעור הימצאות השמנת יתר לפי שנה, 2014-2018



תרשים 61: שיעור הימצאות השמנת יתר לפי גיל ומין, 2018



תרשים 62: שיעור הימצאות השמנת יתר לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 35: שיעור הימצאות השמנת יתר לפי גיל ומין -

מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל				
		סה"כ	80-84	75-79	70-74	65-69
זכר	מונה	86,101	7,686	15,083	26,885	36,447
	מכנה	307,598	35,363	58,959	93,721	119,555
	שיעור	28.0%	21.7%	25.6%	28.7%	30.5%
נקבה	מונה	138,058	16,540	27,945	41,371	52,202
	מכנה	370,773	48,567	75,193	110,217	136,796
	שיעור	37.2%	34.1%	37.2%	37.5%	38.2%
סה"כ	מונה	224,159	24,226	43,028	68,256	88,649
	מכנה	678,371	83,930	134,152	203,938	256,351
	שיעור	33.0%	28.9%	32.1%	33.5%	34.6%

טבלה 36: שיעור הימצאות השמנת יתר לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי					
	סה"כ	4	3	2	1
65-69	מונה	11,817	30,399	30,566	12,226
	מכנה	26,354	77,827	94,984	47,386
	שיעור	44.8%	39.1%	32.2%	25.8%
					34.5%
70-74	מונה	9,019	22,037	24,065	10,353
	מכנה	20,330	58,041	76,497	41,363
	שיעור	44.4%	38.0%	31.5%	25.0%
					33.4%
75-79	מונה	5,672	15,622	14,497	5,569
	מכנה	13,951	42,691	48,763	23,837
	שיעור	40.7%	36.6%	29.7%	23.4%
					32.0%
80-84	מונה	2,712	8,782	8,367	3,403
	מכנה	7,470	26,651	30,992	15,884
	שיעור	36.3%	33.0%	27.0%	21.4%
					28.7%
סה"כ	מונה	29,220	76,840	77,495	31,551
	מכנה	68,105	205,210	251,236	128,470
	שיעור	42.9%	37.4%	30.8%	24.6%
					32.9%

שימוש בבנזודיאזפינים בקרב בני 65 ומעלה

רציונאל: הבנזודיאזפינים הן תרופות מרגיעות ומשרות שינה ותיקות, להן פוטנציאל להתפתחות תלות נפשית וגופנית, בעיקר במינון גבוה ולאחר מתן ממושך. הפסקה או מיתון פתאומי של טיפול כרוני עלולים לגרום תסמיני גמילה, חלקם מסכני חיים. תופעות הלוואי העיקריות של בנזודיאזפינים הן ישנוניות, פגיעה בזכרון ובריכוז וחוסר יציבות (9,10). מחקרים רבים הוכיחו כי שימוש בבנזודיאזפינים או בתרופות ה-Z בקשישים מעלה את הסיכון לתאונות, נפילות ושברים (11,12). על אף העדויות המדאגות על הנזק הפוטנציאלי שיש בשימוש בלתי מושכל וכרוני בתרופות אלה, שימוש כזה נותר נפוץ במדינות המפותחות, ובפרט באוכלוסיית הקשישים.

מבחינה פרמקוקינטית התכשירים השונים נבדלים בטווח הפעולה שלהם: תכשירים קצרי טווח מתחילים לפעול במהירות והשפעתם פגה כעבור זמן קצר יחסית ותכשירים ארוכי טווח הם בעלי השפעה ממושכת. קשישים רגישים במיוחד לתופעות הלוואי של בנזודיאזפינים הן בגלל רגישות יתר של מערכת העצבים להשפעתם והן בגלל קצב הפירוק האיטי של בנזודיאזפינים ארוכי טווח. מטבוליזם מואט המאפיין את הגיל המבוגר, גורם לרמות גבוהות של בנזודיאזפינים בדם ואגירה של התרופה בגוף. מסיבה זו מומלץ שלא להשתמש כלל בבנזודיאזפינים ארוכי טווח בקשישים (13,14).

מדדים:

- ✓ שיעור שימוש היתר בבנזודיאזפינים בקרב בני 65 ומעלה
- ✓ שיעור השימוש בבנזודיאזפינים ארוכי טווח בקרב בני 65 ומעלה

שיעור שימוש היתר בבנוזדיאזפינים בקרב בני 65 ומעלה

הגדרת המדד: שיעור המבוטחים בני 65 ומעלה עם שימוש יתר בבנוזדיאזפינים בשנת המדד


מכנה: מבוטחים בני 65 ומעלה

מונה: מספר המבוטחים במכנה עם שימוש יתר בבנוזדיאזפינים בשנת המדד. שימוש יתר מוגדר כצריכה של תכשירים ממשפחת הבנוזדיאזפינים ו"תרופות ה-Z" בכמות של 365 DDD או יותר במהלך שנת המדד.


הערות: DDD = Defined Daily Dose: מינון התחזוקה היומי הממוצע המשוער עבור תרופה המשמשת בהתוויה העיקרית שלה במבוגר. זהו מונח המשמש לצורך כימות הצריכה הכוללת של תרופה. ה-DDD נקבע על ידי ארגון הבריאות העולמי (WHO). המדד הוגדר בצורה תואמת למדד ה-OECD במטרה לאפשר השוואה בינלאומית מהימנה.

תוצאות: שיעור שימוש היתר בבנוזדיאזפינים בקרב בני 65 ומעלה נותר יציב בין השנים 2014-2018, ועמד על 4.8% בשנת 2018. השיעור היה גבוה פי 1.5 בקרב נשים (5.7%) מאשר בקרב גברים (3.7%). השיעור היה נמוך פי 1.8 בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (3.0%) בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (5.4%).


תרשים 63: שיעור שימוש היתר בבנוזדיאזפינים לפי שנה, 2014-2018



תרשים 64: שיעור שימוש היתר בבנזודיאזפינים לפי גיל ומין, 2018



תרשים 65: שיעור שימוש היתר בבנזודיאזפינים לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 37: שיעור שימוש היתר בבנזודיאזפינים לפי גיל ומין -

מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל					
		סה"כ	85+	80-84	75-79	70-74	65-69
זכר	מונה	16,134	3,673	3,097	3,176	3,175	3,013
	מכנה	435,305	40,718	51,931	71,480	113,530	157,646
	שיעור	3.7%	9.0%	6.0%	4.4%	2.8%	1.9%
	מונה	31,393	8,804	6,459	5,633	5,385	5,112
נקבה	מכנה	549,658	70,585	73,982	92,209	133,352	179,530
	שיעור	5.7%	12.5%	8.7%	6.1%	4.0%	2.8%
	מונה	47,527	12,477	9,556	8,809	8,560	8,125
	מכנה	984,963	111,303	125,913	163,689	246,882	337,176
	שיעור	4.8%	11.2%	7.6%	5.4%	3.5%	2.4%

טבלה 38: שיעור שימוש היתר בבנזודיאזפינים לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי						
	סה"כ	4	3	2	1	
65-69	מונה	7,859	1,625	3,173	2,505	556
	מכנה	325,052	65,791	125,632	100,829	32,800
	שיעור	2.4%	2.5%	2.5%	2.5%	1.7%
70-74	מונה	8,249	1,890	3,378	2,459	522
	מכנה	238,094	51,991	92,186	70,111	23,806
	שיעור	3.5%	3.6%	3.7%	3.5%	2.2%
75-79	מונה	8,538	1,805	3,385	2,767	581
	מכנה	158,112	29,635	58,949	52,563	16,965
	שיעור	5.4%	6.1%	5.7%	5.3%	3.4%
80-84	מונה	9,259	2,105	3,813	2,780	561
	מכנה	121,809	24,439	46,104	40,005	11,261
	שיעור	7.6%	8.6%	8.3%	6.9%	5.0%
85+	מונה	12,066	3,222	4,942	3,302	600
	מכנה	107,756	24,057	41,074	33,649	8,976
	שיעור	11.2%	13.4%	12.0%	9.8%	6.7%
סה"כ	מונה	45,971	10,647	18,691	13,813	2,820
	מכנה	950,823	195,913	363,945	297,157	93,808
	שיעור	4.8%	5.4%	5.1%	4.6%	3.0%

שיעור השימוש בנזודיאזפינים ארוכי טווח בקרב בני 65 ומעלה

הגדרת המדד: שיעור המבוטחים בני 65 ומעלה אשר רכשו בנזודיאזפינים ארוכי טווח בשנת המדד


מכנה: מבוטחים בני 65 ומעלה

מונה: מספר המבוטחים במכנה עם לפחות רכישה אחת של בנזודיאזפינים ארוכי טווח בשנת המדד


הערות: המדד הוגדר בצורה תואמת למדד ה־OECD במטרה לאפשר השוואה בינלאומית מהימנה. בנזודיאזפינים ארוכי טווח כוללים את התרופות הבאות: Potassium, Diazepam, Nitrazepam, Clorazepate.

תוצאות: שיעור השימוש בנזודיאזפינים ארוכי טווח בקרב בני 65 ומעלה ירד בין השנים 2014-2018, מ־2.6% בשנת 2014 ל־2.2% בשנת 2018. השיעור היה גבוה יותר בקרב נשים (2.5%) מאשר בקרב גברים (1.8%). השיעור היה נמוך בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (1.8%) בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (2.5%).


תרשים 66: שיעור השימוש בנזודיאזפינים ארוכי טווח לפי שנה, 2014-2018



תרשים 67: שיעור השימוש בנזודיאזפינים ארוכי טווח לפי גיל ומין, 2018



תרשים 68: שיעור השימוש בנזודיאזפינים ארוכי טווח לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 39: שיעור השימוש בנזודיאזפינים ארוכי טווח לפי גיל ומין – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל					
		סה"כ	85+	80-84	75-79	70-74	65-69
זכר	מונה	7,858	852	1,047	1,379	2,042	2,538
	מכנה	435,305	40,718	51,931	71,480	113,530	157,646
	שיעור	1.8%	2.1%	2.0%	1.9%	1.8%	1.6%
נקבה	מונה	13,528	1,811	2,074	2,515	3,300	3,828
	מכנה	549,658	70,585	73,982	92,209	133,352	179,530
	שיעור	2.5%	2.6%	2.8%	2.7%	2.5%	2.1%
סה"כ	מונה	21,386	2,663	3,121	3,894	5,342	6,366
	מכנה	984,963	111,303	125,913	163,689	246,882	337,176
	שיעור	2.2%	2.4%	2.5%	2.4%	2.2%	1.9%

טבלה 40: שיעור השימוש בנזודיאזפינים ארוכי טווח לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		מצב חברתי-כלכלי				
		סה"כ	4	3	2	1
65-69	מונה	6,142	1,328	2,406	1,784	624
	מכנה	325,052	65,791	125,632	100,829	32,800
	שיעור	1.9%	2.0%	1.9%	1.8%	1.9%
70-74	מונה	5,150	1,322	1,978	1,432	418
	מכנה	238,094	51,991	92,186	70,111	23,806
	שיעור	2.2%	2.5%	2.1%	2.0%	1.8%
75-79	מונה	3,759	863	1,462	1,105	329
	מכנה	158,112	29,635	58,949	52,563	16,965
	שיעור	2.4%	2.9%	2.5%	2.1%	1.9%
80-84	מונה	3,012	735	1,184	879	214
	מכנה	121,809	24,439	46,104	40,005	11,261
	שיעור	2.5%	3.0%	2.6%	2.2%	1.9%
85+	מונה	2,561	683	1,033	696	149
	מכנה	107,756	24,057	41,074	33,649	8,976
	שיעור	2.4%	2.8%	2.5%	2.1%	1.7%
סה"כ	מונה	20,624	4,931	8,063	5,896	1,734
	מכנה	950,823	195,913	363,945	297,157	93,808
	שיעור	2.2%	2.5%	2.2%	2.0%	1.8%

טיפול תרופתי הולם בבני 65-85 לאחר שבר בצוואר הירך

רציונאל: שברים אוסטיאופורוטיים הינם תופעה נפוצה בגיל המבוגר, והארעותם עולה עם הזדקנות האוכלוסיה. לפי הערכה עדכנית, מאובחנים בכל שנה ברחבי העולם כתשעה מיליון שברים אוסטיאופורוטיים (15,16). בכמצית מהמקרים נותרת לאחר השבר פגיעה תפקודית קבועה, ואחד מכל ארבעה מקרים מוביל לאשפוז במסגרת סיעודית או למוות בשנה שלאחר השבר. שבר אוסטיאופורוטי ראשון מהווה גורם סיכון משמעותי לשבר נוסף (17), ולכן נודעת חשיבות מרובה למניעה שניונית. כיום קיימים מספר טיפולים תרופתיים בעלי יעילות מוכחת למניעת שבר שני bisphosphonates, teriparatide, denosumab (18,19) אך לפי נתונים אמריקאיים, פחות מרבע מהקשישים שעברו שבר ראשון מקבלים טיפול תרופתי מתאים למניעת שבר אוסטיאופורוטי נוסף (20). נתונים אלה מדגישים את חשיבותו של מדד איכות לאומי להערכת מתן טיפול תרופתי הולם למניעת שבר שני.


מכנה: בני 66-84 (בשנת המדד) אשר עברו ניתוח לתיקון שבר בצוואר הירך בשנה שלפני שנת המדד

מונה: מבוטחים במכנה אשר במהלך שנת המדד רכשו טיפול תרופתי הולם: א. רכישה אחת לפחות של denosumab (prolia) או zoledronic acid (aclasta) או ב. 3 רכישות או יותר ביספוספונאטים אחרים או של teriparatide.


הערות: מדד חדש המפורסם לראשונה

תוצאות: שיעור מקבלי טיפול תרופתי הולם לאחר שבר בצוואר הירך עלה בין השנים 2015-2018, מ-25.5% בשנת 2015 ל-28.1% בשנת 2018. השיעור היה גבוה פי 1.7 בקרב נשים (32.3%) לעומת גברים (18.7%). השיעור היה נמוך בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (19.4%) בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (32.8%).


תרשים 69: שיעור מקבלי טיפול תרופתי הולם לאחר שבר בצוואר הירך
לפי שנה, 2015-2018



תרשים 70: שיעור מקבלי טיפול תרופתי הולם לאחר שבר בצוואר הירך
לפי גיל ומין, 2018



תרשים 71: שיעור מקבלי טיפול תרופתי הולם לאחר שבר בצוואר הירך
לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 41: שיעור מקבלי טיפול תרופתי הולם לאחר שבר בצוואר הירך לפי גיל ומין – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל				
		סה"כ	80-84	75-79	70-74	65-69
זכר	מונה	180	62	54	43	21
	מכנה	961	300	257	221	183
	שיעור	18.7%	20.7%	21.0%	19.5%	11.5%
נקבה	מונה	687	254	166	170	97
	מכנה	2,127	819	524	453	331
	שיעור	32.3%	31.0%	31.7%	37.5%	29.3%
סה"כ	מונה	867	316	220	213	118
	מכנה	3,088	1,119	781	674	514
	שיעור	28.1%	28.2%	28.2%	31.6%	23.0%

טבלה 42: שיעור מקבלי טיפול תרופתי הולם לאחר שבר בצוואר הירך לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 0182

		מצב חברתי-כלכלי				
		סה"כ	4	3	2	1
65-69	מונה	113	27	43	31	12
	מכנה	499	108	187	156	48
	שיעור	22.6%	25.0%	23.0%	19.9%	25.0%
70-74	מונה	209	42	76	67	24
	מכנה	657	134	216	217	90
	שיעור	31.8%	31.3%	35.2%	30.9%	26.7%
75-79	מונה	210	46	74	73	17
	מכנה	753	134	249	272	98
	שיעור	27.9%	34.3%	29.7%	26.8%	17.3%
80-84	מונה	310	73	123	97	17
	מכנה	1,084	197	411	351	125
	שיעור	28.6%	37.1%	29.9%	27.6%	13.6%
סה"כ	מונה	842	188	316	268	70
	מכנה	2,993	573	1,063	996	361
	שיעור	28.1%	32.8%	29.7%	26.9%	19.4%

1. Monto AS. The Risk of Seasonal and Pandemic Influenza: Prospects for Control. Clin Infect Dis [Internet]. 2009 Jan 1;48(Supplement_1):S20–5. Available from: <http://dx.doi.org/10.1086/591853>
2. Thompson WW, Comanor L, Shay DK. Epidemiology of Seasonal Influenza: Use of Surveillance Data and Statistical Models to Estimate the Burden of Disease. J Infect Dis [Internet]. 2006 Nov 1;194(Supplement_2):S82–91. Available from: <http://dx.doi.org/10.1086/507558>
3. 2018/9 השפעת עונת הסתיו מחלות. דוח מסכם עונת השפעת 2018/9 [Internet]. 2019 [cited 2019 Sep 11]. Available from: https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Flu2018_2019.pdf
4. 2019 אוגוסט , עדכון היסודי. תדריך הציבור ה-19 [Internet]. 2019 [cited 2019 Sep 11]. Available from: https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/tadrich_Chisunim.pdf
5. Goldblatt D, O'Brien KL. Pneumococcal Infections. In: Kasper D, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson JL, Loscalzo J, editors. Harrison's Principles of Internal Medicine, 19e [Internet]. New York, NY: McGraw-Hill Education; 2015. Available from: <http://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?aid=1120797671>
6. O'Brien KL, Wolfson LJ, Watt JP, Henkle E, Deloria-Knoll M, McCall N, et al. Burden of disease caused by Streptococcus pneumoniae in children younger than 5 years: global estimates. Lancet (London, England). 2009 Sep;374(9693):893–902.
7. האגף לאפידמיולוגיה, שירותי בריאות הציבור. תדריך היסודי- משד הבריאות [Internet]. 2017 [cited 2017 Dec 19]. Available from: https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Flu2016_2017.pdf
8. Heiat A, Vaccarino V, Krumholz HM. An evidence-based assessment of federal guidelines for overweight and obesity as they apply to elderly persons. Arch Intern Med. 2001 May;161(9):1194–203.
9. Donoghue J, Lader M. Usage of benzodiazepines: A review. Int J Psychiatry Clin Pract. 2010;14(2):78–87.
10. McMinn J, Steel C, Bowman A. Investigation and management of unintentional weight loss in older adults. BMJ [Internet]. 2011 Mar 29;342. Available from: <http://www.bmj.com/content/342/bmj.d1732.abstract>
11. Neutel CI, Hirdes JP, Maxwell CJ, Patten SB. New evidence on benzodiazepine use and falls: the time factor. Age Ageing. 1996 Jul;25(4):273–8.
12. American Geriatrics Society 2015 Updated Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults. J Am Geriatr Soc [Internet]. 2015 Nov 1 [cited 2019 Sep 11];63(11):2227–46. Available from: <http://doi.wiley.com/10.1111/jgs.13702>
13. Guina J, Merrill B. Benzodiazepines I: Upping the Care on Downers: The Evidence of Risks, Benefits and Alternatives. J Clin Med [Internet]. 2018 Jan 30 [cited 2019 Sep 11];7(2). Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29385731>

14. Ashton CH. Benzodiazepines: How They Work and How to Withdraw [Internet]. Institute of Neuroscience, Newcastle University. 2002 [cited 2019 Sep 11]. Available from: <http://www.benzo.org.uk/manual/bzcha01.htm#15>
15. Berry SD, Kiel DP, Colón-Emeric C. Hip fractures in older adults in 2019. JAMA - J Am Med Assoc. 2019 Jun 11;321(22):2231–2.
16. International Osteoporosis Foundation. Facts and Statistics. Available from: <https://www.iofbonehealth.org/facts-statistics#category-14>
17. National Osteoporosis Society (UK). Effective Secondary Prevention of Fragility Fractures 2015. [cited 2019 Oct 2]; Available from: <https://theros.org.uk/media/2082/clinical-standards-for-fracture-liaison-services.pdf>
18. Saito T, Sterbenz JM, Malay S, Zhong L, MacEachern MP, Chung KC. Effectiveness of anti-osteoporotic drugs to prevent secondary fragility fractures: systematic review and meta-analysis. Osteoporos Int [Internet]. 2017 Dec [cited 2019 Oct 23];28(12):3289–300. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28770272>
19. Conley RB, Adib G, Adler RA, Akesson KE, Alexander IM, Amenta KC, et al. Secondary Fracture Prevention: Consensus Clinical Recommendations from a Multistakeholder Coalition. J Bone Miner Res. 2019 Sep 20;
20. Bauer DC. Osteoporosis Treatment After Hip Fracture. JAMA Netw Open. 2018 Jul 20;1(3):e180844.

מחלות נשימתיות



אסתמה מתמשכת בקרב בני 5-45

רציונאל: אסתמה הנה אחת מהמחלות הכרוניות הנפוצות ביותר בעולם. על אף ירידה בנטל סיבוכי המחלה במדינות המפותחות בעשור האחרון, אסתמה נותרה מחלה בעלת השפעה חשובה על איכות החיים, המשייתה נטל כלכלי משמעותי (2,1). מבחינים בין אסתמה מתמשכת לאסתמה סירוגית; אסתמה מתמשכת מאופיינת בתדירות גבוהה של תסמינים המחייבים טיפול תרופתי מונע. הטיפול התרופתי באסתמה נחלק לשתי קטגוריות: טיפול מניעתי להשגת שליטה במחלה לאורך זמן וטיפול להקלה בשעת התקף חריף. עמוד התווך של הטיפול באסתמה מתמשכת הוא שימוש קבוע בתרופות למניעה, בעיקר תכשירים סטרואידלים בהשאפה. הטיפול המונע הוכח כיעיל בשיפור התסמינים ובהורדת הסיכון להחמרות, אשפוזים ותמותה (4,3). על אף שחשיבותו של הטיפול המונע אינה מוטלת בספק, ההענות לטיפול זה אינה משביעת רצון. קיומו של טיפול יעיל שההענות לו חלקית הציב את הטיפול התרופתי המונע באסתמה כמושא מתבקש למדד איכות.

בנוסף, חולי אסתמה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים ממחלות דלקתיות בדרכי הנשימה, שעלולים להחמיר עד כדי צורך באשפוז. חיסון נגד שפעת מפחית באופן ניכר את תדירות הביקורים בחדר מיון ואת האשפוזים ולפיכך, משרד הבריאות ממליץ כי חולי אסתמה בני 6 חודשים ומעלה יקבלו חיסון נגד שפעת מידי שנה (6,5).

מדדים:

- ✓ שיעור ההימצאות של אסתמה מתמשכת בקרב בני 5-45
- ✓ שיעור בעלי יחס תרופות לאסתמה (AMR) גבוה או שווה ל-0.5 בקרב חולי אסתמה מתמשכת בני 5-45
- ✓ שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בקרב חולי אסתמה מתמשכת בני 5-45

שיעור ההימצאות של אסתמה מתמשכת בקרב בני 5-45

הגדרת המדד: שיעור המבוטחים בני 5-45 אשר הוגדרו חולי אסתמה מתמשכת על פי רכישת תרופות לטיפול באסתמה ואבחנות ביקור בשנת המדד ובשנה שקדמה לשנת המדד

מכנה: כלל המבוטחים בני 5-45


מונה: מספר המבוטחים במכנה אשר:

1. רכשו לפחות 8 תרופות לאסתמה בשנת המדד ובשנה הקודמת לשנת המדד (לאו דווקא בחודשים שונים), ובלבד שלפחות 4 מבין הרכישות בוצעו בשנת המדד.
2. בשנת המדד ובשנה הקודמת לשנת המדד מילאו לפחות אחד מבין שני התנאים הבאים (יכללו מבוטחים אשר עמדו באותו תנאי בשנתיים הרצופות או בתנאי אחד בשנה הראשונה ובתנאי האחר בשנה השנייה):
א. ביצעו לפחות 4 רכישות של תרופות לאסתמה בשנה (לאו דווקא בחודשים שונים).
ב. ביצעו לפחות 2 רכישות של תרופות לאסתמה וגם קיבלו לפחות 4 אבחנות ביקור של אסתמה בשנה.


הערות: אסתמה מתמשכת הוגדרה בעבר בהסתמך על רכישת תרופות נגד אסתמה בלבד. הגדרה זו הביאה להערכת חסר של אוכלוסיית חולי האסתמה המתמשכת, במיוחד בקרב קבוצות בעלות הענות נמוכה לטיפול התרופתי. לפיכך, הגדרת האוכלוסייה שונתה ומתבססת בנוסף לרכישת תרופות גם על אבחנות ביקור של אסתמה. תרופות לאסתמה כוללות: תרופות למניעה (agonists combinations) ותרופות להקלה (short-acting beta-2 agonists, anticholinergics).

תוצאות: שיעור ההימצאות של אסתמה מתמשכת בקרב בני 5-45 נותר יציב בין השנים 2018-2014, ועמד על 0.8% בשנת 2018. השיעור היה נמוך יותר בקרב נשים (0.7%) מאשר בקרב גברים (0.9%). השיעור היה נמוך פי 2 בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (0.5%) בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (1.0%).


תרשים 72: שיעור הימצאות אסתמה מתמשכת לפי שנה, 2014-2018



תרשים 73: שיעור הימצאות אסתמה מתמשכת לפי גיל ומין, 2018



תרשים 74: שיעור הימצאות אסתמה מתמשכת לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



**טבלה 43 שיעור הימצאות אסתמה מתמשכת לפי גיל ומין –
מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

		גיל				
		סה"כ	35-44	25-34	15-24	5-14
זכר	מונה	20,008	5,337	3,973	2,831	7,867
	מכנה	2,306,157	502,857	542,067	487,670	773,563
	שיעור	0.9%	1.1%	0.7%	0.6%	1.0%
נקבה	מונה	16,222	5,745	3,792	2,443	4,242
	מכנה	2,327,296	523,484	552,875	515,635	735,302
	שיעור	0.7%	1.1%	0.7%	0.5%	0.6%
סה"כ	מונה	36,230	11,082	7,765	5,274	12,109
	מכנה	4,633,453	1,026,341	1,094,942	1,003,305	1,508,865
	שיעור	0.8%	1.1%	0.7%	0.5%	0.8%

**טבלה 44: שיעור הימצאות אסתמה מתמשכת לפי מצב חברתי-כלכלי
וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

		מצב חברתי-כלכלי				
		סה"כ	4	3	2	1
5-14	מונה	11,620	2,069	4,071	3,324	2,156
	מכנה	1,440,558	216,484	422,949	402,363	398,762
	שיעור	0.8%	1.0%	1.0%	0.8%	0.5%
15-24	מונה	5,090	830	1,629	1,535	1,096
	מכנה	955,213	106,984	234,946	290,944	322,339
	שיעור	0.5%	0.8%	0.7%	0.5%	0.3%
25-34	מונה	7,456	1,307	2,701	2,344	1,104
	מכנה	1,044,567	149,437	333,895	334,965	226,270
	שיעור	0.7%	0.9%	0.8%	0.7%	0.5%
35-44	מונה	10,640	2,096	3,927	2,912	1,705
	מכנה	982,357	178,820	342,077	279,952	181,508
	שיעור	1.1%	1.2%	1.1%	1.0%	0.9%
סה"כ	מונה	34,806	6,302	12,328	10,115	6,061
	מכנה	4,422,695	651,725	1,333,867	1,308,224	1,128,879
	שיעור	0.8%	1.0%	0.9%	0.8%	0.5%

שיעור בעלי יחס תרופות לאסתמה (AMR) גבוה או שווה ל-0.5 בקרב חולי אסתמה מתמשכת בני 5-45

הגדרת המדד: שיעור חולי אסתמה מתמשכת בני 5-45 בעלי יחס תרופות לאסתמה גדול או שווה ל-0.5


מכנה: חולי אסתמה מתמשכת בני 5-45

מונה: מספר המבוטחים במכנה בעלי יחס תרופות לאסתמה (AMR - Asthma Medication Ratio) גדול או שווה ל-0.5


הערות: יחס תרופות לאסתמה הוא היחס בין מספר האריזות של תרופות למניעת אסתמה לבין סה"כ אריזות התרופות לאסתמה אשר אותן רכש המבוטח בשנת המדד. מבוטחים עומדים בתנאי המדד כאשר לפחות מחצית מאריזות התרופות אותן הם נוטלים לטיפול במחלה הן תרופות מניעה. תרופות לאסתמה כוללות: תרופות למניעה (immunomodulators, inhaled corticosteroids, leukotriene modifiers, long-acting beta-2 agonists combinations short-acting beta-2 agonists, anticholinergics).

תוצאות: שיעור חולי אסתמה מתמשכת בני 5-45 שעבורם היחס בין תרופות למניעה לכלל התרופות לאסתמה (AMR) היה גדול או שווה ל-0.5 (יחס המעיד על טיפול נאות) עלה בין השנים 2014-2018, מ-67.4% בשנת 2014 ל-70.9% בשנת 2018. השיעור היה מעט נמוך יותר בקרב נשים (70.5%) מאשר בקרב גברים (71.3%). השוואה בין השכבות החברתיות-כלכליות לא הצביעה על קשר מונוטוני, אך השיעור הגבוה ביותר נצפה בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (73.8%).


**תרשים 75: שיעור בעלי יחס תרופות לאסתמה גבוה או שווה ל-0.5
לפי שנה, 2014-2018**



**תרשים 76: שיעור בעלי יחס תרופות לאסתמה גבוה או שווה ל-0.5
לפי גיל ומין, 2018**



**תרשים 77: שיעור בעלי יחס תרופות לאסתמה גבוה או שווה ל-0.5
לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018**



טבלה 45: שיעור בעלי יחס תרופות לאסתמה גבוה או שווה ל-0.5 לפי גיל ומין – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל				
		סה"כ	35-44	25-34	15-24	5-14
זכר	מונה	14,262	3,624	2,759	2,045	5,834
	מכנה	20,008	5,337	3,973	2,831	7,867
	שיעור	71.3%	67.9%	69.4%	72.2%	74.2%
נקבה	מונה	11,429	4,010	2,623	1,737	3,059
	מכנה	16,222	5,745	3,792	2,443	4,242
	שיעור	70.5%	69.8%	69.2%	71.1%	72.1%
סה"כ	מונה	25,691	7,634	5,382	3,782	8,893
	מכנה	36,230	11,082	7,765	5,274	12,109
	שיעור	70.9%	68.9%	69.3%	71.7%	73.4%

טבלה 46: שיעור בעלי יחס תרופות לאסתמה גבוה או שווה ל-0.5 לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		מצב חברתי-כלכלי				
		סה"כ	4	3	2	1
5-14	מונה	8,521	1,544	2,908	2,422	1,647
	מכנה	11,620	2,069	4,071	3,324	2,156
	שיעור	73.3%	74.6%	71.4%	72.9%	76.4%
15-24	מונה	3,643	625	1,126	1,087	805
	מכנה	5,090	830	1,629	1,535	1,096
	שיעור	71.6%	75.3%	69.1%	70.8%	73.4%
25-34	מונה	5,172	968	1,869	1,555	780
	מכנה	7,456	1,307	2,701	2,344	1,104
	שיעור	69.4%	74.1%	69.2%	66.3%	70.7%
35-44	מונה	7,320	1,497	2,619	1,964	1,240
	מכנה	10,640	2,096	3,927	2,912	1,705
	שיעור	68.8%	71.4%	66.7%	67.4%	72.7%
סה"כ	מונה	24,656	4,634	8,522	7,028	4,472
	מכנה	34,806	6,302	12,328	10,115	6,061
	שיעור	70.8%	73.5%	69.1%	69.5%	73.8%

שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בקרב חולי אסתמה מתמשכת בני 5-45

הגדרת המדד: שיעור קבלת חיסון נגד שפעת עונתית בקרב חולי אסתמה מתמשכת בני 5-45


מכנה: חולי אסתמה מתמשכת בני 5-45

מונה: מספר המבוטחים במכנה אשר חוסנו בפועל בחיסון נגד שפעת עונתית


הערות: אסתמה מתמשכת מוגדרת על פי רכישת תרופות לאסתמה ואבחנות ביקור. תקופת המדד הינה מ־1 בספטמבר של שנת המדד ועד 28 בפברואר בשנה שאחריה, בחפיפה לתקופת מתן החיסון לשפעת.

תוצאות: שיעור המחוסנים נגד שפעת בקרב חולי אסתמה מתמשכת בני 5-45 ירד בשלוש השנים 2016-2018 לכדי 35.3% בשנת 2018. בשנה זו, השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (35.9%) מאשר בקרב גברים (34.8%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (44.3%) היה גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (35.2%).


תרשים 78: שיעור קבלת חיסון נגד שפעת לפי שנה, 2014-2018



תרשים 79: שיעור קבלת חיסון נגד שפעת לפי גיל ומין, 2018



תרשים 80: שיעור קבלת חיסון נגד שפעת לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 47: שיעור קבלת חיסון נגד שפעת לפי גיל ומין – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל				
		סה"כ	35-44	25-34	15-24	5-14
זכר	מונה	6,943	1,785	1,108	874	3,176
	מכנה	19,960	5,326	3,968	2,806	7,860
	שיעור	34.8%	33.5%	27.9%	31.1%	40.4%
נקבה	מונה	5,807	2,059	1,283	768	1,697
	מכנה	16,185	5,738	3,788	2,422	4,237
	שיעור	35.9%	35.9%	33.9%	31.7%	40.1%
סה"כ	מונה	12,750	3,844	2,391	1,642	4,873
	מכנה	36,145	11,064	7,756	5,228	12,097
	שיעור	35.3%	34.7%	30.8%	31.4%	40.3%

טבלה 48: שיעור קבלת חיסון נגד שפעת לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי					
	סה"כ	4	3	2	1
5-14	מונה	4,656	846	1,491	1,273
	מכנה	11,608	2,068	4,069	3,322
	שיעור	40.1%	40.9%	36.6%	38.3%
15-24	מונה	1,571	271	433	447
	מכנה	5,049	821	1,610	1,526
	שיעור	31.1%	33.0%	26.9%	29.3%
25-34	מונה	2,272	395	749	703
	מכנה	7,447	1,306	2,697	2,341
	שיעור	30.5%	30.2%	27.8%	30.0%
35-44	מונה	3,661	699	1,159	1,020
	מכנה	10,623	2,095	3,924	2,907
	שיעור	34.5%	33.4%	29.5%	35.1%
סה"כ	מונה	12,160	2,211	3,832	3,443
	מכנה	34,727	6,290	12,300	10,096
	שיעור	35.0%	35.2%	31.2%	34.1%

בדיקות ספירומטריה בקרב חולי COPD ואוכלוסייה בסיכון גבוה ל-COPD

רציונאל: חסמת הריאות היא מחלה שכיחה וניתנת למניעה המהווה גורם תמותה ותחלואה חשוב בעולם וכרוכה בנטל כלכלי וחברתי משמעותי (7). שיעורי ההמצאות המדויקים של המחלה קשים לקביעה בין היתר בשל תת-אבחנה ניכרת שלה (8,2). אבחנה מוקדמת ותקפה של חסמת הריאות חיונית לצורך הימנעות מגורמי הסיכון ומתן טיפול הולם. הללו מאפשרים בלימת ההתדרדרות המואצת בתפקודי הריאה, שיפור בתסמינים ובסיבולת הגופנית והורדה בתכיפות ההחמרות במחלה. בדיקת הבחירה לאבחנה של חסמת הריאות היא ספירומטריה. בדיקת הספירומטריה מאפשרת בנוסף לאישוש האבחנה של חסמת הריאות גם הערכה של חומרת ההפרעה החסימתית, המהווה גורם מנבא להתלקחויות תכופות ולתוצאים גרועים של המחלה (9). לאור חשיבות הספירומטריה לצורך אבחנה, הערכת החומרה וניטור מהלך המחלה מומלץ כי כל החולים המצויים בסיכון לחסמת הריאות יבצעו ספירומטריה. תיעוד ערכי בדיקת הספירומטריה ברשומות הרפואיות של המבוטחים יאפשר זיהוי תקף של אוכלוסיית חולי ה-COPD. אוכלוסייה זו עשויה להוות יעד למספר מדדי איכות עתידיים.

מדדים:

- ✓ שיעור ביצוע ספירומטריה בקרב חולי COPD ואוכלוסייה בסיכון גבוה ל-COPD
- ✓ שיעור התיעוד של ערכי בדיקת ספירומטריה בקרב חולי COPD ואוכלוסייה בסיכון גבוה ל-COPD

שיעור ביצוע ספירומטריה בקרב חולי COPD ואוכלוסייה בסיכון גבוה ל-COPD

הגדרת המדד: שיעור המבוטחים בני 74-50 אשר אובחנו החל מתאריך 01/01/2012 ואילך כסובלים מחסמת הריאות (COPD) או כמצויים בסיכון גבוה לחסמת הריאות, אשר ביצעו בדיקת ספירומטריה.


מכנה: מבוטחים בני 74-50 אשר אובחנו החל מתאריך 01/01/2012 ואילך כסובלים מחסמת הריאות או כמצויים בסיכון גבוה לחסמת הריאות

מונה: מספר המבוטחים במכנה אשר ביצעו לפחות בדיקה אחת של ספירומטריה מ־01/01/2011 ואילך


הערות: מבוטחים הסובלים מחסמת הריאות מוגדרים לפי אבחנה של COPD או רכישה של תרופות ספציפיות ל-COPD. מבוטחים בסיכון גבוה ל-COPD מוגדרים לפי מצב עישון חיובי (בעבר או כיום) ואבחון לאסתמה או רכישת תרופות למחלות נשימתיות.

תוצאות: שיעור ביצוע ספירומטריה בקרב חולי COPD ואוכלוסייה בסיכון גבוה ל-COPD בני 74-50 עלה בין השנים 2014-2018, מ־57.9% בשנת 2014 ל־75.5% בשנת 2018. השיעור היה מעט נמוך יותר בקרב נשים (74.6%) מאשר בקרב גברים (76.1%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (71.75%) היה מעט נמוך יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (77.1%).


תרשים 81: שיעור ביצוע ספירומטריה לפי שנה, 2014-2018



תרשים 82: שיעור ביצוע ספירומטריה לפי גיל ומין, 2018



תרשים 83: שיעור ביצוע ספירומטריה לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 49: שיעור ביצוע ספירומטריה לפי גיל ומין - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל					
		סה"כ	70-74	65-69	60-64	55-59	50-54
זכר	מונה	19,940	4,156	4,997	4,651	3,622	2,514
	מכנה	26,207	5,260	6,320	6,049	4,933	3,645
	שיעור	76.1%	79.0%	79.1%	76.9%	73.4%	69.0%
נקבה	מונה	13,345	2,749	3,386	3,255	2,439	1,516
	מכנה	17,888	3,525	4,390	4,327	3,352	2,294
	שיעור	74.6%	78.0%	77.1%	75.2%	72.8%	66.1%
סה"כ	מונה	33,285	6,905	8,383	7,906	6,061	4,030
	מכנה	44,095	8,785	10,710	10,376	8,285	5,939
	שיעור	75.5%	78.6%	78.3%	76.2%	73.2%	67.9%

טבלה 50: שיעור ביצוע ספירומטריה לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל -
מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי					
	סה"כ	4	3	2	1
50-54	מונה	332	1,069	1,573	901
	מכנה	480	1,634	2,287	1,310
	שיעור	69.2%	65.4%	68.8%	68.8%
55-59	מונה	543	1,767	2,403	1,091
	מכנה	753	2,380	3,253	1,556
	שיעור	72.1%	74.2%	73.9%	70.1%
60-64	מונה	824	2,569	3,020	1,191
	מכנה	1,070	3,331	3,941	1,611
	שיעור	77.0%	77.1%	76.6%	73.9%
65-69	מונה	1,173	3,044	2,921	947
	מכנה	1,492	3,812	3,711	1,318
	שיעור	78.6%	79.9%	78.7%	71.9%
70-74	מונה	1,217	2,458	2,146	797
	מכנה	1,511	3,025	2,774	1,099
	שיעור	80.5%	81.3%	77.4%	72.5%
סה"כ	מונה	4,089	10,907	12,063	4,927
	מכנה	5,306	14,182	15,966	6,894
	שיעור	77.1%	76.9%	75.6%	71.5%

שיעור התייעוד של ערכי בדיקת ספירומטריה בקרב חולי COPD ואוכלוסייה בסיכון גבוה ל-COPD

הגדרת המדד: שיעור המבוטחים בני 50-74 אשר אובחנו כסובלים מחסמת הריאות (COPD) או כמצויים בסיכון גבוה לחסמת הריאות לגביהם קיים תיעוד של ערכי בדיקת ספירומטריה.


מכנה: מבוטחים בני 50-74 אשר אובחנו החל מתאריך 01/01/2012 ואילך כסובלים מחסמת הריאות או כמצויים בסיכון גבוה לחסמת הריאות ואשר ביצעו לפחות בדיקת ספירומטריה אחת החל מ־1/1/2011 ואילך.

מונה: מספר המבוטחים במכנה לגביהם קיים תיעוד של ערכי בדיקת ספירומטריה אשר בוצעה החל מ־1/1/2011 ואילך.


הערות: מבוטחים הסובלים מחסמת הריאות מוגדרים לפי אבחנה של COPD או רכישה של תרופות ספציפיות ל-COPD. מבוטחים בסיכון גבוה ל-COPD מוגדרים לפי מצב עישון חיובי (בעבר או כיום) ואבחון לאסתמה או רכישת תרופות למחלות נשימתיות.

תוצאות: תיעוד ערכי בדיקת ספירומטריה בתיק הרפואי של חולי COPD ואוכלוסייה בסיכון גבוה ל-COPD בני 50-74 עלה בין השנים 2014-2018, מ־10.9% בשנת 2014 ל־38.9% בשנת 2018. השיעור היה דומה בנשים (38.7%) ובגברים (39.0%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (36.7%) היה נמוך יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (39.8%).


תרשים 84: שיעור התייעוד של ערכי בדיקת ספירומטריה לפי שנה, 2014-2018



תרשים 85: שיעור התיעוד של ערכי בדיקת ספירומטריה לפי גיל ומין, 2018



תרשים 86: שיעור התיעוד של ערכי בדיקת ספירומטריה לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 51: שיעור התיעוד של ערכי בדיקת ספירומטריה לפי גיל ומין - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018


		גיל					
		סה"כ	70-74	65-69	60-64	55-59	50-54
זכר	מונה	7,767	1,696	1,949	1,841	1,370	911
	מכנה	19,940	4,156	4,997	4,651	3,622	2,514
	שיעור	39.0%	40.8%	39.0%	39.6%	37.8%	36.2%
נקבה	מונה	5,165	1,115	1,309	1,228	933	580
	מכנה	13,345	2,749	3,386	3,255	2,439	1,516
	שיעור	38.7%	40.6%	38.7%	37.7%	38.3%	38.3%
סה"כ	מונה	12,932	2,811	3,258	3,069	2,303	1,491
	מכנה	33,285	6,905	8,383	7,906	6,061	4,030
	שיעור	38.9%	40.7%	38.9%	38.8%	38.0%	37.0%

טבלה 52: שיעור התייעוד של ערכי בדיקת ספירומטריה
לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 0182

מצב חברתי-כלכלי					
	סה"כ	4	3	2	1
50-54	מונה	1,403	123	374	592
	מכנה	3,875	332	1,069	1,573
	שיעור	36.2%	37.0%	35.0%	37.6%
					34.9%
55-59	מונה	2,186	214	654	906
	מכנה	5,804	543	1,767	2,403
	שיעור	37.7%	39.4%	37.0%	37.7%
					37.8%
60-64	מונה	2,916	334	938	1,218
	מכנה	7,604	824	2,569	3,020
	שיעור	38.3%	40.5%	36.5%	40.3%
					35.8%
65-69	מונה	3,107	454	1,182	1,117
	מכנה	8,085	1,173	3,044	2,921
	שיעור	38.4%	38.7%	38.8%	38.2%
					37.4%
70-74	מונה	2,656	504	1,022	830
	מכנה	6,618	1,217	2,458	2,146
	שיעור	40.1%	41.4%	41.6%	38.7%
					37.6%
סה"כ	מונה	12,268	1,629	4,170	4,663
	מכנה	31,986	4,089	10,907	12,063
	שיעור	38.4%	39.8%	38.2%	38.7%
					36.7%

1. WHO | Asthma. WHO. 2017;
2. Soriano JB, Abajobir AA, Abate KH, Abera SF, Agrawal A, Ahmed MB, et al. Global, regional, and national deaths, prevalence, disability-adjusted life years, and years lived with disability for chronic obstructive pulmonary disease and asthma: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. *Lancet Respir Med*. 2018 Jan;5(9):691–706.
3. Program NAE and P. Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma [Internet]. 2018. Available from: https://www.bcbsnm.com/pdf/cpg_asthma.pdf
4. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention At Online Appendix. 2015;
5. 2019 אוגוסט , עדכון חיסונים , תדריך חיסונים ה.ל. שירותי בריאות הציבור ה.ל. [Internet]. 2019 [cited 2019 Sep 11]. Available from: https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/tadrich_Chisunim.pdf
6. משרד הבריאות. מניעת שפעת עונתית ומחלות חורף אחרות [Internet]. 2012. Available from: https://www.health.gov.il/SUBJECTS/VACCINES/FLU/Pages/Winter_flu.aspx
7. The top 10 causes of death [Internet]. [cited 2019 Sep 11]. Available from: <http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death>
8. Stav D, Raz M. Prevalence of chronic obstructive pulmonary disease among smokers aged 45 and up in Israel. *Isr Med Assoc J*. 2007 Nov;9(11):800–2.
9. Vestbo J, Hurd SS, Agustí AG, Jones PW, Vogelmeier C, Anzueto A, et al. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. *Am J Respir Crit Care Med* [Internet]. 2013 Feb 15 [cited 2019 Sep 11];187(4):347–65. Available from: <http://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/rccm.201204-0596PP>

לב וכלי דם



ניטור לחץ דם

רצינאל: יתר לחץ דם מהווה גורם סיכון שכיח למחלות לב וכלי דם. שבץ מוחי, אי-ספיקת לב, התקף לב ופגיעה בתפקוד הכליות מהווים כולם סיבוכים של יתר לחץ דם. ה-US Preventive Services Task Force ממליץ על מדידת לחץ דם בכל ביקור במרפאה מעל גיל 20. זוהי המלצה בדרגה גבוהה (A). יתר לחץ דם מהווה מחלה מסוכנת, אך סמויה במשך זמן רב - רבים מהסובלים מיתר לחץ דם אינם מודעים למצבם, שניתן לגלותו בבדיקות שגרה פשוטות בכל מרפאה ראשונית בקהילה. תיעוד לחץ הדם מאפשר זיהוי מקרים של יתר לחץ דם הדורשים שינוי באורח החיים, איזון תזונתי, ו/או איזון תרופתי לשם הפחתת הסיכון למחלות רבות (1,2).

מדדים:

- ✓ שיעור התיעוד של מדידות לחץ דם בקרב בני 20-54
- ✓ שיעור התיעוד של מדידות לחץ דם בקרב בני 55-74

שיעור התיעוד של מדידות לחץ דם בקרב בני 20-54


הגדרת המדד: שיעור המבוטחים בני 20-54 עם תיעוד של ערכי בדיקת לחץ דם

מכנה: מבוטחים בני 20-54


מונה: מספר המבוטחים במכנה עם תיעוד לחץ דם לפחות פעם אחת בחמש השנים האחרונות

תוצאות: שיעור התיעוד של מדידות לחץ דם בקרב בני 20-54 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 92.5% ב־2018. השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (95.4%) מאשר בקרב גברים (89.5%). השיעור היה דומה בין השכבות החברתיות-כלכליות השונות.


תרשים 87: שיעור תיעוד מדידות לחץ דם לפי שנה, 2014-2018



תרשים 88: שיעור תיעוד מדידות לחץ דם לפי גיל ומין, 2018



תרשים 89: שיעור תיעוד מדידות לחץ דם לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 53: שיעור תיעוד מדידות לחץ דם לפי גיל ומין -

מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל					
		סה"כ	45-54	35-44	25-34	20-24	
זכר	מונה	1,314,513	374,305	421,509	400,405	118,294	
	מכנה	1,469,323	394,317	464,887	464,329	145,790	
	שיעור	89.5%	94.9%	90.7%	86.2%	81.1%	
נקבה	מונה	1,509,420	403,149	469,966	475,687	160,618	
	מכנה	1,582,705	416,835	491,250	498,533	176,087	
	שיעור	95.4%	96.7%	95.7%	95.4%	91.2%	
סה"כ	מונה	2,823,933	777,454	891,475	876,092	278,912	
	מכנה	3,052,028	811,152	956,137	962,862	321,877	
	שיעור	92.5%	95.8%	93.2%	91.0%	86.7%	

**טבלה 54: שיעור תיעוד מדידות לחץ דם לפי מצב חברתי-כלכלי
וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

מצב חברתי-כלכלי					
	סה"כ	4	3	2	1
20-24	מונה	262,755	16,850	49,545	85,531
	מכנה	304,270	20,717	59,450	99,242
	שיעור	86.4%	81.3%	83.3%	86.2%
25-34	מונה	833,868	117,675	266,821	267,109
	מכנה	917,443	131,461	293,266	293,852
	שיעור	90.9%	89.5%	91.0%	90.9%
35-44	מונה	852,248	154,925	298,472	241,949
	מכנה	914,740	167,565	320,355	260,204
	שיעור	93.2%	92.5%	93.2%	93.0%
45-54	מונה	748,989	143,112	258,379	220,190
	מכנה	781,910	150,742	269,857	229,517
	שיעור	95.8%	94.9%	95.7%	95.9%
סה"כ	מונה	2,697,860	432,562	873,217	814,779
	מכנה	2,918,363	470,485	942,928	882,815
	שיעור	92.4%	91.9%	92.6%	92.3%

שיעור התיעוד של מדידות לחץ דם בקרב בני 74-55


הגדרת המדד: שיעור המבוטחים בני 74-55 עם תיעוד של ערכי בדיקת לחץ דם

מכנה: מבוטחים בני 74-55


מונה: שיעור המבוטחים בני 74-55 עם תיעוד של ערכי בדיקת לחץ דם בשנת המדד

תוצאות: שיעור התיעוד של מדידות לחץ דם בקרב בני 74-55 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 80.8% ב־2018. השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (81.8%) מאשר בקרב גברים (79.7%). השיעור בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (83.8%) היה מעט גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (78.4%).


תרשים 90: שיעור תיעוד מדידות לחץ דם לפי שנה, 2014-2018



תרשים 91: שיעור תיעוד מדידות לחץ דם לפי גיל ומין, 2018



תרשים 92: שיעור תיעוד מדידות לחץ דם לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 55: שיעור תיעוד מדידות לחץ דם לפי גיל ומין -

מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל					
		סה"כ	70-74	65-69	60-64	55-59	
זכר	מונה	500,752	99,377	133,019	135,009	133,347	
	מכנה	628,319	113,530	157,646	172,695	184,448	
	שיעור	79.7%	87.5%	84.4%	78.2%	72.3%	
נקבה	מונה	576,377	117,577	152,415	154,601	151,784	
	מכנה	704,914	133,352	179,529	192,084	199,949	
	שיעור	81.8%	88.2%	84.9%	80.5%	75.9%	
סה"כ	מונה	1,077,129	216,954	285,434	289,610	285,131	
	מכנה	1,333,233	246,882	337,175	364,779	384,397	
	שיעור	80.8%	87.9%	84.7%	79.4%	74.2%	

טבלה 56: שיעור תיעוד מדידות לחץ דם לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי					
	סה"כ	4	3	2	1
55-59	מונה	273,475	43,485	93,701	91,694
	מכנה	369,568	62,778	128,940	121,886
	שיעור	74.0%	69.3%	72.7%	75.2%
60-64	מונה	278,122	48,473	101,756	91,623
	מכנה	350,755	63,678	129,162	114,378
	שיעור	79.3%	76.1%	78.8%	80.1%
65-69	מונה	275,007	54,405	106,181	85,829
	מכנה	325,051	65,791	125,631	100,829
	שיעור	84.6%	82.7%	84.5%	85.1%
70-74	מונה	209,153	45,136	81,158	61,573
	מכנה	238,094	51,991	92,186	70,111
	שיעור	87.8%	86.8%	88.0%	87.8%
סה"כ	מונה	1,035,757	191,499	382,796	330,719
	מכנה	1,283,468	244,238	475,919	407,204
	שיעור	80.7%	78.4%	80.4%	81.2%

ניטור ואיזון רמות כולסטרול

רציונאל: טרשת עורקים כליליים, שיכולה להוביל להתקף לב, תעוקת חזה, שבץ מוחי ומוות פתאומי, מתבטאת בהיווצרות משקעים בכלי הדם, שאחד הגורמים החשובים להופעתם ולהחמרתם הוא רמה גבוהה של כולסטרול. להפחתת רמת הכולסטרול לרמות יעד יש חשיבות הן בהפחתת הסיכון לפיתוח מחלת לב בקרב בעלי גורמי סיכון למחלות אלו (מניעה ראשונית) והן במניעה של התקדמות טרשת בחולי לב ידועים (מניעה שלישונית). טיפול בעודף הכולסטרול כולל שינוי באורח החיים ונטילת תרופות ממשפחת הסטטינים (3).

המודל הנפוץ ביותר להערכת הסיכון לתחלואה במחלות לב בעשר השנים הקרובות מבוסס על מחקר הפרמינגהם ומשתמש בנוסחה המבוססת על מין, גיל, סך כולסטרול, כולסטרול HDL (גורם מגן), לחץ דם סיסטולי, טיפול ליתר לחץ דם ועישון. על פי המודל ניתן לחלק את האוכלוסייה הבוגרת כבעלת סיכון גבוה, בינוני או נמוך. בשנת 2001 פרסמה ועדת מומחים (Adult Treatment Panel III, ATP-III), המלצות לטיפול בעודף כולסטרול בדם (2), אשר עודכנו בשנת 2004 (4). על פי המלצות אלו, לאנשים בסיכון גבוה לתחלואה במחלות לב (סיכון לעשר שנים העולה על 20%) רמת ה-LDL המומלצת היא מתחת ל-100 מ"ג/ד"ל, לאנשים בסיכון בינוני (יותר מגורם סיכון אחד והערכת סיכון ל-10 שנים של עד 20%) ערך המטרה הוא מתחת ל-130 מ"ג/ד"ל, ולאנשים בסיכון נמוך (עד גורם סיכון אחד וסיכון של פחות מ-10% ב-10 שנים) הרמה המומלצת היא מתחת ל-160 מ"ג/ד"ל. יש לציין כי קווי המנחה של האיגוד האירופאי לקרדיולוגיה European Society of Cardiology (ESC) והחברה האירופאית לטרשת העורקים European Atherosclerosis Society (EAS) מספטמבר 2019, קבעו יעדים מחמירים במידה ניכרת לרמות ה-LDL המומלצות למניעה ראשונית לפי קבוצות סיכון (5). אולם, נכון להיום הגדרת הממד נותרת ללא שינוי משנים קודמות, בכדי לאפשר השוואה רציפה לאורך שנות המדידה.

- ✓ שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול בקרב בני 35-54
- ✓ שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול בקרב בני 55-74
- ✓ שיעור בעלי רמת LDL מאוזנת בקרב בני 35-74
- ✓ שיעור בעלי רמת LDL מאוזנת בקבוצת סיכון גבוה למחלות לב בבני 35-74

שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול בקרב בני 35-54


הגדרת הממד: שיעור המבוטחים אשר ביצעו לפחות בדיקה אחת של כולסטרול LDL בשנת הממד

מכנה: מבוטחים בני 35-54


מונה: מספר המבוטחים במכנה שביצעו בדיקת כולסטרול LDL או non-HDL – לפחות בדיקה אחת במשך חמש השנים האחרונות

תוצאות: שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול בקרב בני 35-54 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 88.1% ב-2018. השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (91.9%) מאשר בקרב גברים (84.1%). השיעור היה דומה בין השכבות החברתיות-כלכליות השונות.


תרשים 93: שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול לפי שנה, 2014-2018



תרשים 94: שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול לפי גיל ומין, 2018



תרשים 95: שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 57: שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול לפי גיל ומין – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

	סה"כ	50-54	45-49	40-44	35-39	
זכר	722,817	165,210	181,542	194,588	181,477	מונה
	859,204	184,145	210,172	234,434	230,453	מכנה
	84.1%	89.7%	86.4%	83.0%	78.7%	שיעור
נקבה	834,945	183,952	207,765	225,965	217,263	מונה
	908,085	193,851	222,984	247,943	243,307	מכנה
	91.9%	94.9%	93.2%	91.1%	89.3%	שיעור
סה"כ	1,557,762	349,162	389,307	420,553	398,740	מונה
	1,767,289	377,996	433,156	482,377	473,760	מכנה
	88.1%	92.4%	89.9%	87.2%	84.2%	שיעור

טבלה 58: שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי					
	סה"כ	4	3	2	1
35-39	379,377	65,859	133,175	110,234	70,109 מונה
	451,500	77,237	157,343	132,462	84,458 מכנה
	84.0%	85.3%	84.6%	83.2%	83.0% שיעור
40-44	403,292	78,739	142,085	110,910	71,558 מונה
	463,240	90,328	163,012	127,742	82,158 מכנה
	87.1%	87.2%	87.2%	86.8%	87.1% שיעור
45-49	375,154	75,209	130,586	105,507	63,852 מונה
	417,811	83,935	145,119	117,760	70,997 מכנה
	89.8%	89.6%	90.0%	89.6%	89.9% שיעור
50-54	336,068	61,732	115,377	102,854	56,105 מונה
	364,099	66,807	124,738	111,757	60,797 מכנה
	92.3%	92.4%	92.5%	92.0%	92.3% שיעור
סה"כ	1,493,891	281,539	521,223	429,505	261,624 מונה
	1,696,650	318,307	590,212	489,721	298,410 מכנה
	88.0%	88.4%	88.3%	87.7%	87.7% שיעור

שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול בקרב בני 74-55


הגדרת המדד: שיעור המבוטחים אשר ביצעו לפחות בדיקה אחת של כולסטרול LDL בשנת המדד

מכנה: מבוטחים בני 74-55


מונה: מספר המבוטחים במכנה שביצעו לפחות בדיקת כולסטרול LDL או non-HDL אחת בשנת המדד

תוצאות: שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול בקרב בני 74-55 ירד מעט בין השנים 2014-2018 מ-76.7% בשנת 2014 ל-75.3% ב-2018. השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (77.2%) מאשר בקרב גברים (73.2%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (75.7%) היה מעט גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (74.0%).


תרשים 96: שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול לפי שנה, 2014-2018



תרשים 97: שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול לפי גיל ומין, 2018



תרשים 98: שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 59: שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול לפי גיל

ומין – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל				
		סה"כ	50-54	45-49	40-44	35-39
זכר	מונה	722,817	165,210	181,542	194,588	181,477
	מכנה	859,204	184,145	210,172	234,434	230,453
	שיעור	84.1%	89.7%	86.4%	83.0%	78.7%
נקבה	מונה	834,945	183,952	207,765	225,965	217,263
	מכנה	908,085	193,851	222,984	247,943	243,307
	שיעור	91.9%	94.9%	93.2%	91.1%	89.3%
סה"כ	מונה	1,557,762	349,162	389,307	420,553	398,740
	מכנה	1,767,289	377,996	433,156	482,377	473,760
	שיעור	88.1%	92.4%	89.9%	87.2%	84.2%

**טבלה 60: שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול לפי מצב
חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

מצב חברתי-כלכלי						
	סה"כ	4	3	2	1	
35-39	מונה	379,377	65,859	133,175	110,234	70,109
	מכנה	451,500	77,237	157,343	132,462	84,458
	שיעור	84.0%	85.3%	84.6%	83.2%	83.0%
40-44	מונה	403,292	78,739	142,085	110,910	71,558
	מכנה	463,240	90,328	163,012	127,742	82,158
	שיעור	87.1%	87.2%	87.2%	86.8%	87.1%
45-49	מונה	375,154	75,209	130,586	105,507	63,852
	מכנה	417,811	83,935	145,119	117,760	70,997
	שיעור	89.8%	89.6%	90.0%	89.6%	89.9%
50-54	מונה	336,068	61,732	115,377	102,854	56,105
	מכנה	364,099	66,807	124,738	111,757	60,797
	שיעור	92.3%	92.4%	92.5%	92.0%	92.3%
סה"כ	מונה	1,493,891	281,539	521,223	429,505	261,624
	מכנה	1,696,650	318,307	590,212	489,721	298,410
	שיעור	88.0%	88.4%	88.3%	87.7%	87.7%

שיעור בעלי רמת LDL מאוזנת בקרב בני 35-74

הגדרת המדד: שיעור בעלי רמת LDL נמוכה מהיעד המוגדר לפי רמות סיכון לתחלואה לבבית

מכנה: מבוטחים בני 35-74 אשר ביצעו בדיקת LDL או non-HDL (בקרב בני 35-54 לפחות בדיקה אחת במשך חמש השנים האחרונות; בקרב בני 55-74 לפחות בדיקה אחת בשנת המדד).

מונה: מספר המבוטחים במכנה עם רמת LDL נמוכה או שווה ליעד כפי שהוגדר ע"י ATP III (ראה רציונאל), תוך ריבוד לפי רמת הסיכון הפרטנית לסיכון נמוך, בינוני או גבוה.


הערות: המדד המדווח הינו כאמור שיעור עמידה כולל ביעדי LDL לפי קבוצת סיכון למחלות לב בקרב בני 35-74. מדד זה מחושב על סמך שלושה מדדי עמידה ביעד בקבוצות הסיכון השונות:

- שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-160 מ"ג/ד"ל בקבוצת סיכון נמוך למחלות לב בבני 35-74
- שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-130 מ"ג/ד"ל בקבוצת סיכון בינוני למחלות לב בבני 35-74
- שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-110 מ"ג/ד"ל בקבוצת סיכון גבוה למחלות לב בבני 35-74


הערכת הסיכון התבססה על מודל פרמינגהאם בהעדר מודל מתוקף לאוכלוסיה הישראלית הניתן למיחשוב בשלב זה.

תוצאות: שיעור העמידה ביעד LDL למניעה ראשונית לפי קבוצת סיכון למחלות לב בקרב בני 35-74 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 84.2% ב-2018. השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (86.9%) מאשר בקרב גברים (80.4%). נצפו מעט הבדלים לפי מצב חברתי-כלכלי, כאשר השיעור הנמוך ביותר נצפה בשכבה החברתית-כלכלית השניה (82.7%) והשיעור הגבוה ביותר נצפה בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (86.4%).


תרשים 99: שיעור בעלי רמת LDL מאוזנת לפי שנה, 2014-2018



תרשים 100: שיעור בעלי רמת LDL מאוזנת לפי גיל ומין, 2018



תרשים 101: שיעור בעלי רמת LDL מאוזנת לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 61: שיעור בעלי רמת LDL מאוזנת לפי גיל ומין – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל				
		סה"כ	65-74	55-64	45-54	35-44
זכר	מונה	448,774	99,217	115,354	110,006	124,197
	מכנה	558,160	120,766	146,638	146,226	144,530
	שיעור	80.4%	82.2%	78.7%	75.2%	85.9%
נקבה	מונה	666,736	140,376	160,434	173,460	192,466
	מכנה	767,381	166,588	201,283	196,198	203,312
	שיעור	86.9%	84.3%	79.7%	88.4%	94.7%
סה"כ	מונה	1,115,510	239,593	275,788	283,466	316,663
	מכנה	1,325,541	287,354	347,921	342,424	347,842
	שיעור	84.2%	83.4%	79.3%	82.8%	91.0%

טבלה 62: שיעור בעלי רמת LDL מאוזנת לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		מצב חברתי-כלכלי				
		סה"כ	4	3	2	1
35-44	מונה	300,302	51,758	102,488	87,073	58,983
	מכנה	329,964	56,205	112,649	96,590	64,520
	שיעור	91.0%	92.1%	91.0%	90.1%	91.4%
45-54	מונה	271,256	49,188	92,554	81,220	48,294
	מכנה	328,189	58,822	112,681	99,652	57,034
	שיעור	82.7%	83.6%	82.1%	81.5%	84.7%
55-64	מונה	264,412	49,745	98,394	83,452	32,821
	מכנה	334,209	61,635	124,697	107,706	40,171
	שיעור	79.1%	80.7%	78.9%	77.5%	81.7%
65-74	מונה	230,808	53,887	92,701	65,311	18,909
	מכנה	277,264	64,137	111,297	79,517	22,313
	שיעור	83.2%	84.0%	83.3%	82.1%	84.7%
סה"כ	מונה	1,066,778	204,578	386,137	317,056	159,007
	מכנה	1,269,626	240,799	461,324	383,465	184,038
	שיעור	84.0%	85.0%	83.7%	82.7%	86.4%

שיעור בעלי רמת LDL מאוזנת בקבוצת סיכון גבוה למחלות לב בבני 74-35


הגדרת המדד: שיעור בעלי רמת LDL נמוכה מהיעד המוגדר לפי רמות סיכון לתחלואה לבבית: בעלי סיכון גבוה

מכנה: מבוטחים בני 74-35 להוציא חולי סוכרת ולב, המצויים בקבוצת הסיכון הגבוה למחלות לב לפי ציון Framingham: בעלי 2 או יותר נקודות סיכון למחלות לב ובעלי אחוזון Framingham גבוה מ־20%.


מונה: מספר המבוטחים במכנה עם רמת LDL האחרונה המהימנה בשנת המדד נמוכה או שווה ל־100 מ"ג/ד"ל, ובאם אין רמת LDL מהימנה אז: רמת non-LDL נמוכה או שווה ל־130 מ"ג/ד"ל.

תוצאות: שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל־100 מ"ג/ד"ל בקבוצת הסיכון הגבוה למחלות לב בקרב בני 74-35 עלה בין השנים 2015-2018 מ־29.3% בשנת 2015 ל־34.4% בשנת 2018. השיעור היה נמוך פי 4.0 בקרב נשים (8.7%) מאשר בקרב גברים (34.7%). השיעור בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (27.5%) היה נמוך פי 1.5 בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (42.1%).


תרשים 102: שיעור בעלי רמת LDL מאוזנת בקבוצת סיכון גבוה לפי שנה, 2014-2018



תרשים 103: שיעור בעלי רמת LDL מאוזנת בקבוצת סיכון גבוה לפי גיל ומין, 2018



תרשים 104: שיעור בעלי רמת LDL מאוזנת בקבוצת סיכון גבוה לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 63: שיעור בעלי רמת LDL מאוזנת בקבוצת סיכון גבוה לפי גיל ומין - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל				
		סה"כ	65-74	55-64	45-54	35-44
זכר	מונה	9,412	8,676	637	85	14
	מכנה	27,155	17,388	7,042	2,496	229
	שיעור	34.7%	49.9%	9.0%	3.4%	6.1%
נקבה	מונה	28	20	5	2	1
	מכנה	321	122	96	90	13
	שיעור	8.7%	16.4%	5.2%	2.2%	7.7%
סה"כ	מונה	9,440	8,696	642	87	15
	מכנה	27,476	17,510	7,138	2,586	242
	שיעור	34.4%	49.7%	9.0%	3.4%	6.2%

**טבלה 64: שיעור בעלי רמת LDL מאוזנת בקבוצת סיכון גבוה
לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

מצב חברתי-כלכלי					
	סה"כ	4	3	2	1
35-44	מונה	15	1	6	3
	מכנה	235	20	64	109
	שיעור	6.4%	5.0%	9.4%	2.8%
45-54	מונה	82	8	26	29
	מכנה	2,505	232	798	1,006
	שיעור	3.3%	3.4%	3.3%	2.9%
55-64	מונה	624	64	225	243
	מכנה	6,874	717	2,266	2,743
	שיעור	9.1%	8.9%	9.9%	8.9%
65-74	מונה	8,423	1,798	3,367	2,522
	מכנה	17,003	3,477	6,810	5,280
	שיעור	49.5%	51.7%	49.4%	47.8%
סה"כ	מונה	9,144	1,871	3,624	2,797
	מכנה	26,617	4,446	9,938	9,138
	שיעור	34.4%	42.1%	36.5%	30.6%

איזון כולסטרול בחולי לב לאחר התערבות פולשנית

רציונאל: ניתוח מעקפים וצנתור לב טיפולי הינם פעולות פולשניות המבוצעות בחולים עם מחלה מתקדמת בעורקים הכליליים של הלב. חולים אלו נמצאים בדרגת סיכון גבוהה לאירועים לבביים חוזרים. מכיוון שרמה גבוהה של כולסטרול בדם מהווה אחד מגורמי הסיכון החשובים להחמרת טרשת עורקים, המשך טיפול נאות בהם צריך לכלול מניעה שלישונית, הכוללת בין השאר טיפול תרופתי לאיזון רמת הכולסטרול (3). הסטטינים הם קבוצת התרופות הנפוצות ביותר להפחתת רמות הכולסטרול מסוג LDL. על פי ההנחיות הרפואיות המקובלות, יש לטפל בתרופות להפחתת כולסטרול בכל חולי הלב שעברו טיפול פולשני (5). כמו כן, הנחיות האיגודים הישראליים קבעו כי בחולים עם מחלות לב רמת היעד של כולסטרול LDL היא מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל (6).

מדדים:

- ✓ שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל או טיפול בסטטינים בעצימות גבוהה לאחר ניתוח מעקפים ו/או צנתור לבבי בקרב בני 35-80
- ✓ שיעור הטיפול בתרופות להורדת LDL לאחר ניתוח מעקפים ו/או צנתור לבבי בקרב בני 35-80

שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל או טיפול בסטטינים בעצימות גבוהה לאחר ניתוח מעקפים ו/או צנתור לבבי בקרב בני 35-80


הגדרת המדד: שיעור המבוטחים בני 35-80 אחרי ניתוח מעקפים ו/או צנתור לבבי טיפולי בעשר השנים שלפני שנת המדד, בעלי רמת כולסטרול LDL נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל או שקיבלו טיפול בסטטינים בעצימות גבוהה.

מכנה: מבוטחים בני 35-80 לאחר ניתוח מעקפים ו/או צנתור לבבי טיפולי בעשר השנים שלפני שנת המדד, אשר ביצעו בדיקת כולסטרול בשנת המדד.


מונה: מספר המבוטחים במכנה עם רמת LDL האחרונה המהימנה בשנת המדד (קרי: רמת טריגליצרידים באותה הבדיקה קטנה מ-300 מ"ג/ד"ל) נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל, או באם אין רמת LDL מהימנה אז: רמת non-HDL נמוכה או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל, או: רכשו לפחות 3 מרשמים של סטטינים בעצימות גבוהה בחודשים שונים בשנת המדד, ובתנאי שרמת LDL האחרונה המהימנה שנמדדה להם בשנת המדד נמוכה או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל.

תוצאות: מבין חולי הלב בני 35-80 שעברו ניתוח מעקפים או צנתור לב טיפולי, שיעור החולים שהגיעו ליעד האיזון של רמת LDL נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל או טופלו בסטטינים בעצימות גבוהה, עלה בין השנים 2014-2018, מ-57.2% בשנת 2014 ל-67.9% בשנת 2018. השיעור היה נמוך יותר בקרב נשים (60.4%) מאשר בקרב גברים (69.7%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (65.6%) היה נמוך יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (71.6%).


**תרשים 105: שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל או טיפול
בסטטינים בעצמות גבוהה לפי שנה, 2014-2018**



**תרשים 106: שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל או טיפול
בסטטינים בעצמות גבוהה לפי גיל ומין, 2018**



**תרשים 107: שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל או טיפול
בסטטינים בעצמות גבוהה לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018**



טבלה 65: שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל או טיפול בסטטינים בעצמות גבוהה לפי גיל ומין – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל					
		סה"כ	70-79	60-69	50-59	40-49	35-39
זכר	מונה	56,775	18,075	23,313	11,817	3,296	274
	מכנה	81,409	24,688	33,012	17,994	5,239	476
	שיעור	69.7%	73.2%	70.6%	65.7%	62.9%	57.6%
נקבה	מונה	12,076	5,449	4,694	1,569	331	33
	מכנה	19,978	8,533	7,474	2,984	836	151
	שיעור	60.4%	63.9%	62.8%	52.6%	39.6%	21.9%
סה"כ	מונה	68,851	23,524	28,007	13,386	3,627	307
	מכנה	101,387	33,221	40,486	20,978	6,075	627
	שיעור	67.9%	70.8%	69.2%	63.8%	59.7%	49.0%

טבלה 66: שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל או טיפול בסטטינים בעצמות גבוהה לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		מצב חברתי-כלכלי				
		סה"כ	4	3	2	1
35-39	מונה	297	33	94	104	66
	מכנה	601	71	169	214	147
	שיעור	49.4%	46.5%	55.6%	48.6%	44.9%
40-49	מונה	3,437	567	1,106	1,010	754
	מכנה	5,777	842	1,805	1,824	1,306
	שיעור	59.5%	67.3%	61.3%	55.4%	57.7%
50-59	מונה	12,789	1,911	4,181	4,259	2,438
	מכנה	20,068	2,735	6,409	6,974	3,950
	שיעור	63.7%	69.9%	65.2%	61.1%	61.7%
60-69	מונה	26,794	4,679	10,028	8,697	3,390
	מכנה	38,774	6,510	14,423	12,920	4,921
	שיעור	69.1%	71.9%	69.5%	67.3%	68.9%
70-79	מונה	22,570	4,613	8,597	6,943	2,417
	מכנה	31,952	6,331	12,133	10,001	3,487
	שיעור	70.6%	72.9%	70.9%	69.4%	69.3%
סה"כ	מונה	65,887	11,803	24,006	21,013	9,065
	מכנה	97,172	16,489	34,939	31,933	13,811
	שיעור	67.8%	71.6%	68.7%	65.8%	65.6%

שיעור הטיפול בתרופות להורדת LDL לאחר ניתוח מעקפים ו/או צנתור לבבי בקרב בני 80-35


הגדרת המדד: שיעור המבוטחים בני 80-35, אחרי ניתוח מעקפים ו/או צנתור לבבי טיפולי בחמש השנים האחרונות, אשר רכשו לפחות שלושה מרשמים של תרופות להורדת LDL בשנת המדד.

מכנה: מבוטחים בני 80-35 לאחר ניתוח מעקפים ו/או צנתור לבבי בחמש השנים האחרונות


מונה: מספר המבוטחים במכנה אשר רכשו לפחות שלושה מרשמים (בחדשים שונים) של תרופות להורדת LDL בשנת המדד

תוצאות: מבין חולי הלב בני 80-35 שעברו ניתוח מעקפים ו/או צנתור לב טיפולי, שיעור המטופלים בתרופות להורדת LDL נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 82.4% ב-2018. השיעור היה מעט נמוך יותר בקרב נשים (81.0%) מאשר בקרב גברים (82.7%). השיעור בשכבה החברתית כלכלית החלשה (79.6%) היה מעט נמוך יותר בהשוואה לשכבה החברתית כלכלית החזקה ביותר (85.5%).

תרשים 108: שיעור הטיפול בתרופות להורדת LDL לפי שנה, 2014-2018




תרשים 109: שיעור הטיפול בתרופות להורדת LDL לפי גיל ומין, 2018



תרשים 110: שיעור הטיפול בתרופות להורדת LDL

לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 67: שיעור הטיפול בתרופות להורדת LDL לפי גיל ומין -

מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל					
		סה"כ	70-79	60-69	50-59	40-49	35-39
זכר	מונה	45,780	12,791	18,137	11,083	3,473	296
	מכנה	55,362	14,686	21,831	13,868	4,531	446
	שיעור	82.7%	87.1%	83.1%	79.9%	76.6%	66.4%
	מונה	10,033	4,361	3,872	1,450	320	30
נקבה	מכנה	12,383	5,086	4,699	1,942	558	98
	שיעור	81.0%	85.7%	82.4%	74.7%	57.3%	30.6%
	מונה	55,813	17,152	22,009	12,533	3,793	326
	מכנה	67,745	19,772	26,530	15,810	5,089	544
סה"כ	שיעור	82.4%	86.7%	83.0%	79.3%	74.5%	59.9%


טבלה 68: שיעור הטיפול בתרופות להורדת LDL
לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי					
סה"כ	4	3	2	1	
316	29	94	109	84	מונה
523	55	154	175	139	מכנה
60.4%	52.7%	61.0%	62.3%	60.4%	שיעור
3,585	524	1,091	1,138	832	מונה
4,833	673	1,475	1,565	1,120	מכנה
74.2%	77.9%	74.0%	72.7%	74.3%	שיעור
11,982	1,648	3,800	4,112	2,422	מונה
15,099	1,982	4,710	5,298	3,109	מכנה
79.4%	83.1%	80.7%	77.6%	77.9%	שיעור
21,040	3,555	7,877	7,007	2,601	מונה
25,355	4,148	9,426	8,569	3,212	מכנה
83.0%	85.7%	83.6%	81.8%	81.0%	שיעור
16,485	3,339	6,269	5,032	1,845	מונה
19,010	3,781	7,159	5,872	2,198	מכנה
86.7%	88.3%	87.6%	85.7%	83.9%	שיעור
53,408	9,095	19,131	17,398	7,784	מונה
64,820	10,639	22,924	21,479	9,778	מכנה
82.4%	85.5%	83.5%	81.0%	79.6%	שיעור

רשימת ספרות

1. Israel Center for Disease Control ICDC. Israel National health Interview Survey (INHIS-2) 2007-2010. 2012;(July).
2. Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) final report. Circulation. 2002 Dec;106(25):3143-421.
3. Silverman MG, Ference BA, Im K, Wiviott SD, Giugliano RP, Grundy SM, et al. Association Between Lowering LDL-C and Cardiovascular Risk Reduction Among Different Therapeutic Interventions: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2016 Sep;316(12):1289-97.
4. Grundy SM, Cleeman JI, Merz CNB, Brewer HBJ, Clark LT, Hunninghake DB, et al. Implications of recent clinical trials for the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III guidelines. Circulation. 2004 Jul;110(2):227-39.
5. Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk: The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J [Internet]. 2019; Available from: <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz455>
6. החברה לחקר מניעה וטיפול בטרשת עורקים, האיגוד הקרדיולוגי בישראל, בישראל, המשפחה אר. [Internet]. [cited 2017 Dec 24]. Available from: <http://www.israel-surgery.org.il/beriatric-position-paper0117.pdf>

סוכרת



מחלת הסוכרת: שיעור ההימצאות, ביצוע בדיקות HbA1c, ואיזון סוכרת

רציונאל: סוכרת מסוג 2 הינה מחלה מטבולית המאופיינת ברמת גלוקוז גבוהה בנסיוב כתוצאה מתנגודת לאינסולין ברקמות הגוף, כגון שריר ושומן, במקביל לחסר יחסי של אינסולין ויצור יתר של גלוקוז בכבד. בעולם כולו ישנה עליה מתמשכת בהימצאות סוכרת, והיא נחשבת לאחד ממצבי החירום החשובים ביותר בתחום הבריאות במאה ה־21. בהשוואה לשנת 1980, מספר חולי הסוכרת בני 20-79 הוכפל כמעט פי ארבעה, וההערכה היא שכיום חיים בעולם כ־425 מיליון איש הסובלים מסוכרת, עם שיעור הימצאות עולמי של 8.8% (1). שיעורי ההימצאות של סוכרת עולים עם הגיל וגבוהים במקצת בגברים לעומת נשים. על פי סקר הבריאות הלאומי האחרון שיעור ההימצאות של חולי סוכרת בקרב האוכלוסייה הבוגרת בישראל הוא 8.4% (8.8% בגברים, 8.0% בנשים) (2). במידה וימשכו מגמות גידול האוכלוסייה והעליה בהיארעות הסוכרת בישראל מעריכים כי בשנת 2030 יהיו בארץ 1,200,000 חולי סוכרת. ב־2016 יוחסו 5.2% ממקרי התמותה בארץ (2291 פטירות) לסוכרת וסיבוכיה והיא הפכה לגורם התמותה הרביעי בחשיבותו, לאחר שאתות ממאירות, מחלות לב ומחלות זיהומיות (3). הטיפול במחלת הסוכרת נועד להשיג איזון מטבולי במשק הגלוקוז בגוף ולמנוע סיבוכים ופגיעה באיברי מטרה שונים כגון לב, כליות, עיניים וגפיים. אחד הכלים המקובלים למעקב אחר יעילות הטיפול הוא בדיקת רמות ההמוגלובין המסוכרר (HbA1c), המשקפת את מידת איזון הסוכרת ב־2-3 החודשים שקדמו לבדיקה, והיא בעלת ערך מנבא חזק להתפתחות סיבוכי המחלה (4,5). האיגוד האמריקאי לסוכרת ממליץ על ביצוע הבדיקה בתדירות של פעמיים בשנה עבור חולים מאוזנים ויציבים ובתדירות של כל שלושה חודשים עבור חולים שאינם מאוזנים או לאחר שינוי בטיפול (6). מחקרים הראו שאיזון הדוק של רמות הגלוקוז בדם מביא לירידה בסיכון להתפתחות סיבוכים מיקרו־וסקולרים של סוכרת, אך הוא פחות יעיל במניעת סיבוכים בכלי הדם הגדולים. בנוסף, נסיונות לאיזון קפדני יותר היו כרוכים בסיכון מוגבר להיפוגליקמיה והשלכותיה, בעיקר בקרב חולים מבוגרים, בעלי משך מחלה ארוך ואלו הסובלים מסיבוכי סוכרת (7-9). המגמה של התאמת יעדי האיזון למאפייני החולים התחזקה עם השנים וכיום יש נסיון לתפור את יעדי האיזון למידותיו של כל חולה וחולה תוך התחשבות במאפייניו הפרטניים (10). מדדי האיכות המתייחסים לאיזון רמות הגלוקוז בדם קובעים שני ערכי יעד שונים של HbA1c (7% או 8%) בהתאם לגיל המבוטח ולוותק אבחנת הסוכרת, ולאיזון שאינו מספק - רמת HbA1c מעל 9%.

מדדים:

- ✓ שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב בני 18 ומעלה
- ✓ שיעור הביצוע של בדיקת HbA1c בחולי סוכרת בני 18 ומעלה
- ✓ שיעור בעלי רמת HbA1c מאוזנת בחולי סוכרת בני 18-84
- ✓ שיעור בעלי רמת HbA1c גבוהה מ־9% בחולי סוכרת בני 18 ומעלה

שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב בני 18 ומעלה

הגדרת המדד: שיעור המבוטחים שהוגדרו כחולי סוכרת על פי רכישת שלוש תרופות לסוכרת או על פי בדיקות מעבדה, בשנה שקדמה לשנת המדד.


מכנה: כלל המבוטחים בני 18 ומעלה

מונה: מספר המבוטחים במכנה אשר רכשו לפחות שלושה מרשמים (בחודשים שונים) של תרופות לסוכרת, או בעלי תיעוד של רמת גלוקוז מעל 200 מ"ג/ד"ל (בשתי בדיקות שונות, בהפרש של לפחות 30 יום זו מזו) או רמת HbA1c מעל 6.5%, בשנה שקדמה לשנת המדד.


הערות: מדד תחלואה זה מגדיר את אוכלוסיית המכנה של רבים ממדדי איכות הטיפול הרפואי בחולי סוכרת בוגרים.

תוצאות: שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב בני 18 ומעלה בשנים 2014-2018 נותר יציב, ועמד על 9.7% ב-2018. השיעור היה נמוך יותר בקרב נשים (9.0%) מאשר בקרב גברים (10.5%). בכל קבוצות הגיל נצפה שיעור הימצאות גבוה יותר של סוכרת ככל שהמצב החברתי-כלכלי היה נמוך יותר (גרף 110).

תרשים 111: שיעור הימצאות סוכרת לפי שנה, 2014-2018



תרשים 112: שיעור הימצאות סוכרת לפי גיל ומין, 2018



תרשים 113: שיעור הימצאות סוכרת לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל, 2018



טבלה 69: שיעור הימצאות סוכרת לפי גיל ומין – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל									
		סה"כ	85+	75-84	65-74	55-64	45-54	35-44	25-34	18-24	
זכר	מונה	264,750	11,189	41,904	83,355	71,957	37,908	13,148	3,758	1,531	
	מכנה	2,531,390	40,500	122,366	268,259	352,379	416,220	502,855	542,067	286,744	
	שיעור	10.5%	27.6%	34.2%	31.1%	20.4%	9.1%	2.6%	0.7%	0.5%	
נקבה	מונה	249,479	16,904	51,192	79,135	61,128	26,888	9,173	3,565	1,494	
	מכנה	2,768,379	70,254	164,854	309,733	386,980	434,818	523,483	552,875	325,382	
	שיעור	9.0%	24.1%	31.1%	25.5%	15.8%	6.2%	1.8%	0.6%	0.5%	
סה"כ	מונה	514,229	28,093	93,096	162,490	133,085	64,796	22,321	7,323	3,025	
	מכנה	5,299,769	110,754	287,220	577,992	739,359	851,038	1,026,338	1,094,942	612,126	
	שיעור	9.7%	25.4%	32.4%	28.1%	18.0%	7.6%	2.2%	0.7%	0.5%	

טבלה 70: שיעור הימצאות סוכרת לפי מצב חברתי-כלכלי ומין – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		מצב חברתי-כלכלי					
		סה"כ	4	3	2	1	
זכר	מונה	252,851	38,205	87,967	84,200	42,479	
	מכנה	2,426,759	404,710	804,390	749,009	468,650	
	שיעור	10.4%	9.4%	10.9%	11.2%	9.1%	
נקבה	מונה	238,116	28,933	76,198	86,792	46,193	
	מכנה	2,655,363	455,829	903,788	817,712	478,034	
	שיעור	9.0%	6.3%	8.4%	10.6%	9.7%	
סה"כ	מונה	490,967	67,138	164,165	170,992	88,672	
	מכנה	5,082,122	860,539	1,708,178	1,566,721	946,684	
	שיעור	9.7%	7.8%	9.6%	10.9%	9.4%	

שיעור הביצוע של בדיקת HbA1c בחולי סוכרת בני 18 ומעלה


הגדרת המדד: שיעור חולי סוכרת שביצעו בדיקת HbA1c לפחות פעם אחת בשנת המדד

מכנה: חולי סוכרת בני 18 ומעלה


מונה: מספר המבוטחים במכנה אשר ביצעו בדיקת HbA1c בשנת המדד

תוצאות: שיעור הביצוע של בדיקת HbA1c בחולי סוכרת בני 18 ומעלה נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 90.7% ב-2018. השיעור היה דומה בקרב נשים (91.7%) וגברים (89.8%). השיעור היה דומה בין השכבות החברתיות-כלכליות השונות.

תרשים 114: שיעור ביצוע בדיקת HbA1c לפי שנה, 2014-2018



תרשים 115: שיעור ביצוע בדיקת HbA1c לפי גיל ומין, 2018



תרשים 116: שיעור ביצוע בדיקת HbA1c לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 71: שיעור ביצוע בדיקת HbA1c לפי גיל ומין -

מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל								
		סה"כ	85+	75-84	65-74	55-64	45-54	35-44	25-34	18-24
זכר	מונה	237,675	10,094	39,073	77,221	64,087	32,150	10,784	3,030	1,236
	מכנה	264,750	11,189	41,904	83,355	71,957	37,908	13,148	3,758	1,531
	שיעור	89.8%	90.2%	93.2%	92.6%	89.1%	84.8%	82.0%	80.6%	80.7%
נקבה	מונה	228,831	14,987	47,675	74,029	55,999	23,991	7,893	2,977	1,280
	מכנה	249,479	16,904	51,192	79,135	61,128	26,888	9,173	3,565	1,494
	שיעור	91.7%	88.7%	93.1%	93.5%	91.6%	89.2%	86.0%	83.5%	85.7%
סה"כ	מונה	466,506	25,081	86,748	151,250	120,086	56,141	18,677	6,007	2,516
	מכנה	514,229	28,093	93,096	162,490	133,085	64,796	22,321	7,323	3,025
	שיעור	90.7%	89.3%	93.2%	93.1%	90.2%	86.6%	83.7%	82.0%	83.2%

טבלה 72: שיעור ביצוע בדיקת HbA1c לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי					
	סה"כ	4	3	2	1
18-24	מונה	2,395	319	615	719
	מכנה	2,883	379	770	867
	שיעור	83.1%	84.2%	79.9%	82.9%
25-34	מונה	5,662	590	1,531	1,881
	מכנה	6,915	725	1,887	2,296
	שיעור	81.9%	81.4%	81.1%	81.9%
35-44	מונה	17,542	1,552	4,626	5,679
	מכנה	20,995	1,884	5,543	6,857
	שיעור	83.6%	82.4%	83.5%	82.8%
45-54	מונה	53,031	4,969	14,297	18,012
	מכנה	61,248	5,785	16,655	20,918
	שיעור	86.6%	85.9%	85.8%	86.1%
55-64	מונה	114,124	12,915	35,633	41,710
	מכנה	126,485	14,391	39,585	46,361
	שיעור	90.2%	89.7%	90.0%	90.0%
65-74	מונה	144,817	22,974	52,955	48,752
	מכנה	155,582	24,660	56,837	52,515
	שיעור	93.1%	93.2%	93.2%	92.8%
75-84	מונה	83,648	13,194	30,480	29,891
	מכנה	89,758	14,109	32,664	32,089
	שיעור	93.2%	93.5%	93.3%	93.2%
85+	מונה	24,186	4,623	9,108	8,127
	מכנה	27,101	5,205	10,224	9,089
	שיעור	89.2%	88.8%	89.1%	89.4%
סה"כ	מונה	445,405	61,136	149,245	154,771
	מכנה	490,967	67,138	164,165	170,992
	שיעור	90.7%	91.1%	90.9%	90.5%

שיעור בעלי רמת HbA1c מאוזנת בחולי סוכרת בני 18-84

הגדרת המדד: שיעור חולי סוכרת בני 18-84 עם רמת HbA1c מאוזנת


מכנה: חולי סוכרת בני 18-84 שביצעו בדיקת HbA1c בשנת המדד

מונה: מספר המבוטחים במכנה אשר תוצאתה האחרונה של בדיקת ה-HbA1c נמצאת בטווח הנחשב מאוזן עבורם: נמוכה או שווה ל-8% בקרב חולים בני 75 ומעלה או עם וותק מחלה העולה על 10 שנים, ונמוכה או שווה ל-7% בקרב שאר חולי הסוכרת


הערות: יעד האיזון מרובד הן על פי גיל החולה והן על פי משך מחלתו. חולה מוגדר כבעל משך מחלה ארוך אם ביצע רכישות של תרופות לטיפול בסוכרת 10 שנים לפני שנת המדד הנוכחית.

תוצאות: שיעור חולי הסוכרת בני 18-84, שמחלתם נחשבת מאוזנת (בעלי רמת HbA1c נמוכה או שווה ל-7% או 8% בהתאם לגיל ולוותק המחלה) עלה בין השנים 2014-2018, מ-66.4% בשנת 2014 ל-70.8% בשנת 2018. השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (72.9%) מאשר בקרב גברים (68.9%). שיעור האיזון עלה עם הגיל. השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (59.7%) היה נמוך באופן ניכר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (79.5%).


תרשים 117: שיעור בעלי רמת HbA1c מאוזנת לפי שנה, 2014-2018



תרשים 118: שיעור בעלי רמת HbA1c מאוזנת לפי גיל ומין, 2018



תרשים 119: שיעור בעלי רמת HbA1c מאוזנת לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 73: שיעור בעלי רמת HbA1c מאוזנת לפי גיל ומין – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל							
		18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	סה"כ
זכר	מונה	543	1,498	5,461	17,666	40,481	57,393	33,887	156,929
	מכנה	1,236	3,030	10,784	32,150	64,087	77,221	39,300	227,808
	שיעור	43.9%	49.4%	50.6%	54.9%	63.2%	74.3%	86.2%	68.9%
נקבה	מונה	576	1,804	4,588	13,868	37,063	56,868	41,384	156,151
	מכנה	1,280	2,977	7,893	23,991	55,999	74,029	47,927	214,096
	שיעור	45.0%	60.6%	58.1%	57.8%	66.2%	76.8%	86.3%	72.9%
סה"כ	מונה	1,119	3,302	10,049	31,534	77,544	114,261	75,271	313,080
	מכנה	2,516	6,007	18,677	56,141	120,086	151,250	87,227	441,904
	שיעור	44.5%	55.0%	53.8%	56.2%	64.6%	75.5%	86.3%	70.8%

טבלה 74: שיעור בעלי רמת HbA1c מאוזנת לפי מצב מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		מצב חברתי-כלכלי				
		1	2	3	4	סה"כ
18-24	מונה	289	316	312	159	1,076
	מכנה	742	719	615	319	2,395
	שיעור	38.9%	43.9%	50.7%	49.8%	44.9%
25-34	מונה	786	1,009	950	396	3,141
	מכנה	1,660	1,881	1,531	590	5,662
	שיעור	47.3%	53.6%	62.1%	67.1%	55.5%
35-44	מונה	2,673	3,037	2,798	1,008	9,516
	מכנה	5,685	5,679	4,626	1,552	17,542
	שיעור	47.0%	53.5%	60.5%	64.9%	54.2%
45-54	מונה	7,861	10,091	8,728	3,244	29,924
	מכנה	15,753	18,012	14,297	4,969	53,031
	שיעור	49.9%	56.0%	61.0%	65.3%	56.4%
55-64	מונה	13,401	26,588	24,593	9,509	74,091
	מכנה	23,866	41,710	35,633	12,915	114,124
	שיעור	56.2%	63.7%	69.0%	73.6%	64.9%
65-74	מונה	13,340	36,004	41,602	18,732	109,678
	מכנה	20,136	48,752	52,955	22,974	144,817
	שיעור	66.2%	73.9%	78.6%	81.5%	75.7%
75-84	מונה	8,207	25,632	26,886	11,949	72,674
	מכנה	10,142	30,056	30,667	13,253	84,118
	שיעור	80.9%	85.3%	87.7%	90.2%	86.4%
סה"כ	מונה	46,557	102,677	105,869	44,997	300,100
	מכנה	77,984	146,809	140,324	56,572	421,689
	שיעור	59.7%	69.9%	75.4%	79.5%	71.2%

שיעור בעלי רמת HbA1c גבוהה מ-9% בחולי סוכרת בני 18 ומעלה


הגדרת המדד: שיעור חולי סוכרת עם רמת HbA1c גבוהה מ-9%

מכנה: חולי סוכרת בני 18 ומעלה, שביצעו בדיקת HbA1c בשנת המדד


מונה: מספר המבוטחים במכנה בעלי תוצאה אחרונה של בדיקת ה-HbA1c הגבוהה מ-9%.

תוצאות: שיעור חולי הסוכרת בני 18 ומעלה שאינם מאוזנים (בעלי רמת HbA1c גבוהה מ-9%) ירד בין השנים 2014-2018, מ-11.6% בשנת 2014 ל-9.6% בשנת 2018. השיעור היה נמוך יותר בקרב נשים (9.0%) מאשר בקרב גברים (10.1%). השיעור היה גבוה כמעט פי 3 בשכבה החברתית כלכלית החלשה (15.5%) בהשוואה לשכבה החברתית כלכלית החזקה ביותר (5.3%).


תרשים 120: שיעור בעלי רמת HbA1c גבוהה מ-9% לפי שנה, 2014-2018



תרשים 121: שיעור בעלי רמת HbA1c גבוהה מ-9% לפי גיל ומין, 2018



תרשים 122: שיעור בעלי רמת HbA1c גבוהה מ-9% לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 75: שיעור בעלי רמת HbA1c גבוהה מ-9% לפי גיל ומין - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל								
		סה"כ	85+	75-84	65-74	55-64	45-54	35-44	25-34	18-24
זכר	מונה	24,054	519	2,050	5,258	7,625	5,479	2,154	675	294
	מכנה	237,675	10,094	39,073	77,221	64,087	32,150	10,784	3,030	1,236
	שיעור	10.1%	5.1%	5.2%	6.8%	11.9%	17.0%	20.0%	22.3%	23.8%
נקבה	מונה	20,665	787	2,582	4,957	6,251	3,884	1,388	469	347
	מכנה	228,831	14,987	47,675	74,029	55,999	23,991	7,893	2,977	1,280
	שיעור	9.0%	5.3%	5.4%	6.7%	11.2%	16.2%	17.6%	15.8%	27.1%
סה"כ	מונה	44,719	1,306	4,632	10,215	13,876	9,363	3,542	1,144	641
	מכנה	466,506	25,081	86,748	151,250	120,086	56,141	18,677	6,007	2,516
	שיעור	9.6%	5.2%	5.3%	6.8%	11.6%	16.7%	19.0%	19.0%	25.5%

טבלה 76: שיעור בעלי רמת HbA1c גבוהה מ-9% לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי					
	סה"כ	4	3	2	1
18-24	מונה	47	116	196	242
	מכנה	319	615	719	742
	שיעור	14.7%	18.9%	27.3%	32.6%
25-34	מונה	66	191	370	426
	מכנה	590	1,531	1,881	1,660
	שיעור	11.2%	12.5%	19.7%	25.7%
35-44	מונה	187	685	1,103	1,310
	מכנה	1,552	4,626	5,679	5,685
	שיעור	12.0%	14.8%	19.4%	23.0%
45-54	מונה	551	1,890	2,979	3,339
	מכנה	4,969	14,297	18,012	15,753
	שיעור	11.1%	13.2%	16.5%	21.2%
55-64	מונה	916	3,198	5,020	3,837
	מכנה	12,915	35,633	41,710	23,866
	שיעור	7.1%	9.0%	12.0%	16.1%
65-74	מונה	907	2,809	3,669	2,261
	מכנה	22,974	52,955	48,752	20,136
	שיעור	3.9%	5.3%	7.5%	11.2%
75-84	מונה	430	1,361	1,754	872
	מכנה	13,194	30,480	29,891	10,083
	שיעור	3.3%	4.5%	5.9%	8.6%
85+	מונה	160	437	495	171
	מכנה	4,623	9,108	8,127	2,328
	שיעור	3.5%	4.8%	6.1%	7.3%
סה"כ	מונה	3,264	10,687	15,586	12,458
	מכנה	61,136	149,245	154,771	80,253
	שיעור	5.3%	7.2%	10.1%	15.5%

ניטור סיבוכי מחלת הסוכרת: רטינופטיה סוכרתית

רציונאל: סוכרת היא סיבה מובילה לעיוורון במערב, והפגיעה ברשתית העין כתוצאה מסוכרת (רטינופטיה סוכרתית) היא סיבוכי נפוץ של המחלה (11,12). האיגוד האמריקאי לסוכרת (ADA) ממליץ לבצע בדיקת עיניים מקיפה, כולל בדיקת קרקעיות פעם בשנה בתוך 5 שנים מאבחנת סוכרת סוג 1 ובסמוך למועד האבחנה של סוכרת מסוג 2. בחולי סוכרת מאוזנים, לאחר בדיקה תקינה אחת או יותר ניתן לשקול תדירות נמוכה יותר (פעם בשנתיים) של בדיקת עיניים (6). בניסוח מדד האיכות התדירות הנדרשת לביקור אצל רופא עיניים מוגדרת על פי וותק המחלה: פעם בשנה בחולים עם משך מחלה ארוך (מעל 10 שנים) ופעם בשנתיים בקרב יתר חולי הסוכרת. אבחנה מוקדמת של פגיעה סוכרתית עינית חשובה ביותר לקבלת טיפול הולם (בד"כ פוטו קואגולציה באמצעות לייזר) ומניעת פגיעה בראייה ועיוורון. חשיבות הניטור הסדיר גבוהה במיוחד, מאחר והפגיעה העינית יכולה להיות אסתסימית עד לשלבים מתקדמים.

המדד:

✓ שיעור הביצוע של בדיקות עיניים בחולי סוכרת בני 18-84

שיעור הביצוע של בדיקות עיניים בחולי סוכרת בני 18-84

הגדרת המדד: חולי סוכרת בני 18-84 שביצעו בדיקת עיניים תקופתית

מכנה: חולי סוכרת בני 18-84


מונה: מספר המבוטחים במכנה אשר בקרו אצל רופא עיניים בתדירות הנדרשת במדד: פעם בשנה בחולים עם משך מחלה ארוך (מעל 10 שנים) ופעם בשנתיים בקרב יתר חולי הסוכרת.

הערות:


1. מאחר ותוצאות בדיקת העיניים אינן מקודדות בתיק הרפואי נכללים במכנה כל החולים אשר ביקרו אצל רופא עיניים בתדירות הנדרשת, בלי קשר לסיבת הביקור או לסוג הבדיקה שבוצעה במהלכו.
2. חולה מוגדר כבעל משך מחלה ארוך אם ביצע רכישות של תרופות לטיפול בסוכרת 10 שנים לפני שנת המדד הנוכחית. הנתונים הדרושים להפרדה בין חולי סוכרת עם משך מחלה ארוך לבין יתר חולי הסוכרת קיימים החל משנת המדד 2012.

תוצאות: שיעור הביצוע של בדיקות עיניים בחולי סוכרת בני 18-84 ירד בין השנים 2015-2018, מ-75.9% בשנת 2015, ל-72.5% ב-2018. השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (74.0%) מאשר בקרב גברים (71.1%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (70.9%) היה מעט נמוך יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (75.2%).

תרשים 123: שיעור ביצוע בדיקות עיניים בסוכרתיים לפי שנה, 2014-2018




תרשים 124: שיעור ביצוע בדיקות עיניים בסוכרתיים לפי גיל ומין, 2018



תרשים 125: שיעור ביצוע בדיקות עיניים בסוכרתיים

לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 77: שיעור ביצוע בדיקות עיניים בסוכרתיים לפי גיל ומין – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל							סה"כ
		18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	
זכר	מונה	939	2,241	8,380	25,277	49,676	62,516	31,234	180,263
	מכנה	1,531	3,758	13,148	37,908	71,957	83,355	41,904	253,561
	שיעור	61.3%	59.6%	63.7%	66.7%	69.0%	75.0%	74.5%	71.1%
	מונה	1,006	2,334	6,249	19,512	45,417	61,198	36,382	172,098
נקבה	מכנה	1,494	3,565	9,173	26,888	61,128	79,135	51,192	232,575
	שיעור	67.3%	65.5%	68.1%	72.6%	74.3%	77.3%	71.1%	74.0%
	מונה	1,945	4,575	14,629	44,789	95,093	123,714	67,616	352,361
	מכנה	3,025	7,323	22,321	64,796	133,085	162,490	93,096	486,136
	שיעור	64.3%	62.5%	65.5%	69.1%	71.5%	76.1%	72.6%	72.5%

טבלה 78: שיעור ביצוע בדיקות עיניים בסוכרתיים לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		מצב חברתי-כלכלי					סה"כ
		1	2	3	4		
18-24	מונה	573	519	493	273	1,858	
	מכנה	867	867	770	379	2,883	
	שיעור	66.1%	59.9%	64.0%	72.0%	64.4%	
	מונה	1,270	1,426	1,176	453	4,325	
25-34	מכנה	2,007	2,296	1,887	725	6,915	
	שיעור	63.3%	62.1%	62.3%	62.5%	62.5%	
	מונה	4,596	4,369	3,561	1,225	13,751	
	מכנה	6,711	6,857	5,543	1,884	20,995	
	שיעור	68.5%	63.7%	64.2%	65.0%	65.5%	
35-44	מונה	12,736	14,094	11,402	4,045	42,277	
	מכנה	17,890	20,918	16,655	5,785	61,248	
	שיעור	71.2%	67.4%	68.5%	69.9%	69.0%	
	מונה	18,787	32,726	28,461	10,379	90,353	
45-54	מכנה	26,148	46,361	39,585	14,391	126,485	
	שיעור	71.8%	70.6%	71.9%	72.1%	71.4%	
	מונה	15,817	39,183	44,287	19,293	118,580	
	מכנה	21,570	52,515	56,837	24,660	155,582	
	שיעור	73.3%	74.6%	77.9%	78.2%	76.2%	
55-64	מונה	7,225	22,658	24,554	10,877	65,314	
	מכנה	10,896	32,089	32,664	14,109	89,758	
	שיעור	66.3%	70.6%	75.2%	77.1%	72.8%	
	מונה	61,004	114,975	113,934	46,545	336,458	
65-74	מכנה	86,089	161,903	153,941	61,933	463,866	
	שיעור	70.9%	71.0%	74.0%	75.2%	72.5%	
	מונה	7,225	22,658	24,554	10,877	65,314	
	מכנה	10,896	32,089	32,664	14,109	89,758	
	שיעור	66.3%	70.6%	75.2%	77.1%	72.8%	
סה"כ	מונה	61,004	114,975	113,934	46,545	336,458	
	מכנה	86,089	161,903	153,941	61,933	463,866	
	שיעור	70.9%	71.0%	74.0%	75.2%	72.5%	
	מונה	7,225	22,658	24,554	10,877	65,314	

ניטור סיבוכי מחלת הסוכרת: נפרופתיה סוכרתית

רציונאל: 20%-40% מחולי הסוכרת יפתחו סיבוך של פגיעה כלייתית (6). סוכרת הינה הסיבה השכיחה ביותר לפגיעה בכליות, עד לאי ספיקת כליות סופנית, מצב בו יש צורך בטיפול דיאליזה או השתלת כליה. הבדיקה המעבדתית החיונית ביותר כסמן מוקדם לפגיעה כלייתית בחולי סוכרת היא מעקב אחר רמות האלבומין המופרש בשתן. כאשר תפקוד הכליה מתחיל להשתבש רמות האלבומין הנמדדות בשתן עולות באופן הדרגתי. הפרשה של מעל 300 מ"ג אלבומין ביממה היא גורם מנבא להתקדמות המחלה הכלייתית והתפתחות אי ספיקת כליות סופנית. בנוסף, אלבומינוריה היא סמן לסיכון גבוה למחלה קרדיווסקולרית. בדיקות לזיהוי אלבומינוריה (הפרשה מוגברת של חלבון האלבומין בשתן) יש לבצע לפחות אחת לשנה. עם זאת, חלק מהחולים יפתחו פגיעה כלייתית על רקע סוכרתי אשר תתבטא בירידה בערכי ה-GFR (Glomerular Filtration Rate) ללא הפרשה מוגברת של חלבון. עבור חולים אלו מעקב אחר ערכי ה-GFR יאפשר אבחנה של פגיעה כלייתית. בנוסף, המעקב אחר ערכי ה-GFR חשוב להערכה של דרגת החומרה של אי ספיקת הכליות, לאיתור וטיפול בחולים בסיכון לסיבוכים של אי ספיקת כליות (כמו הפרעות במאזן האלקטרוליטים או במטבוליזם העצם) ולהפנייתם של חולים באי ספיקת כליות מתקדמת להערכת נפרולוג והכנה לדיאליזה. מכאן שההמלצה היא לעקוב אחר התפקוד הכלייתי בכל חולי הסוכרת בתדירות של פעם בשנה, ובחולים עם ירידה בתפקוד הכלייתי בתדירות גבוהה אף יותר. חשיבות המעקב נובעת מכך שקיים טיפול יעיל להאטת הנזק הכלייתי מרגע שזה מזוהה, באמצעות תרופות מסוג ACEI (angiotensin converting enzyme inhibitors) או angiotensin receptor blockers (ARB) (בסוכרתיים הסובלים מיתר לחץ דם ומהפרשת חלבון מוגברת בשתן), כמו גם על ידי איזון מיטבי של יל"ד וערכי הגלוקוז (6).

מדדים:

- ✓ שיעור הביצוע של בדיקות לאיתור חלבון בשתן בחולי סוכרת בני 18-84
- ✓ שיעור התיעוד של GFR בחולי סוכרת בני 18-84
- ✓ שיעור חולי סוכרת עם פגיעה כלייתית בני 18-84

שיעור הביצוע של בדיקות לאיתור חלבון בשתן בחולי סוכרת בני 18-84


הגדרת המדד: שיעור חולי סוכרת בני 18-84 שביצעו בדיקת מיקרואלבומינוריה, פרוטאינוריה, יחס אלבומין/קריאטינין בשתן או יחס חלבון/קריאטינין בשתן בשנת המדד.

מכנה: חולי סוכרת בני 18 עד 84


מונה: מספר המבוטחים במכנה אשר ביצעו בדיקת מיקרואלבומינוריה, פרוטאינוריה, יחס אלבומין/קריאטינין בשתן או יחס חלבון/קריאטינין בשתן בשנת המדד.

תוצאות: שיעור הביצוע של בדיקות לאיתור חלבון בשתן בחולי סוכרת בני 18-84 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 81.2% ב־2018. השיעור היה דומה בקרב גברים ונשים ובין השכבות החברתיות-כלכליות השונות.

תרשים 126: שיעור ביצוע בדיקות לאיתור חלבון בשתן לפי שנה, 2014-2018



תרשים 127: שיעור ביצוע בדיקות לאיתור חלבון בשתן לפי גיל ומין, 2018



**תרשים 128: שיעור ביצוע בדיקות לאיתור חלבון בשתן
לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018**



**טבלה 79: שיעור ביצוע בדיקות לאיתור חלבון בשתן לפי גיל ומין –
מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

		גיל							
		סה"כ	75-84	65-74	55-64	45-54	35-44	25-34	18-24
זכר	מונה	207,021	35,178	71,121	58,443	29,099	9,548	2,577	1,055
	מכנה	253,561	41,904	83,355	71,957	37,908	13,148	3,758	1,531
	שיעור	81.6%	83.9%	85.3%	81.2%	76.8%	72.6%	68.6%	68.9%
נקבה	מונה	187,956	40,321	66,419	50,126	21,072	6,630	2,374	1,014
	מכנה	232,575	51,192	79,135	61,128	26,888	9,173	3,565	1,494
	שיעור	80.8%	78.8%	83.9%	82.0%	78.4%	72.3%	66.6%	67.9%
סה"כ	מונה	394,977	75,499	137,540	108,569	50,171	16,178	4,951	2,069
	מכנה	486,136	93,096	162,490	133,085	64,796	22,321	7,323	3,025
	שיעור	81.2%	81.1%	84.6%	81.6%	77.4%	72.5%	67.6%	68.4%

טבלה 80: שיעור ביצוע בדיקות לאיתור חלבון בשתן לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי					
סה"כ	4	3	2	1	
1,971	266	517	578	610	מונה
2,883	379	770	867	867	מכנה
68.4%	70.2%	67.1%	66.7%	70.4%	שיעור
4,674	509	1,254	1,547	1,364	מונה
6,915	725	1,887	2,296	2,007	מכנה
67.6%	70.2%	66.5%	67.4%	68.0%	שיעור
15,230	1,356	4,038	4,935	4,901	מונה
20,995	1,884	5,543	6,857	6,711	מכנה
72.5%	72.0%	72.8%	72.0%	73.0%	שיעור
47,434	4,528	12,850	16,074	13,982	מונה
61,248	5,785	16,655	20,918	17,890	מכנה
77.4%	78.3%	77.2%	76.8%	78.2%	שיעור
103,253	11,722	32,183	37,708	21,640	מונה
126,485	14,391	39,585	46,361	26,148	מכנה
81.6%	81.5%	81.3%	81.3%	82.8%	שיעור
131,772	21,022	48,290	44,249	18,211	מונה
155,582	24,660	56,837	52,515	21,570	מכנה
84.7%	85.2%	85.0%	84.3%	84.4%	שיעור
72,841	11,532	26,809	25,954	8,546	מונה
89,758	14,109	32,664	32,089	10,896	מכנה
81.2%	81.7%	82.1%	80.9%	78.4%	שיעור
377,175	50,935	125,941	131,045	69,254	מונה
463,866	61,933	153,941	161,903	86,089	מכנה
81.3%	82.2%	81.8%	80.9%	80.4%	שיעור

שיעור התיעוד של eGFR/GFR בחולי סוכרת בני 18–84

הגדרת המדד: שיעור חולי סוכרת בני 18 עד 84 עם תיעוד של GFR, eGFR או מרכיבי GFR (קראטינין) בשנת המדד


מכנה: חולי סוכרת בני 18 עד 84

מונה: מספר המבוטחים במכנה אשר עבורם קיים תיעוד של GFR, eGFR או מרכיבי GFR (רמות קראטינין בדם) בשנת המדד


הערות: ניתן לבצע חישוב של eGFR בהתבסס על רמות הקראטינין בדם על פי נוסחאות שונות. במסגרת התוכנית לא נעשה חישוב eGFR אלא נלקח הערך המחושב ממסדי הנתונים של קופות החולים.

תוצאות: שיעור התיעוד של תפקודי הכליות (estimated or measured glomerular filtration rate -) בחולי סוכרת בני 18–84 נותר יציב בין השנים 2014–2018 ועמד על 92.2% ב־2018. השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (93.5%) מאשר בקרב גברים (91.0%). השיעור היה דומה בין השכבות החברתיות־כלכליות השונות.


תרשים 129: שיעור תיעוד GFR בסוכרתיים לפי שנה, 2014-2018



תרשים 130: שיעור תיעוד GFR בסוכרתיים לפי גיל ומין, 2018



תרשים 131: שיעור תיעוד GFR בסוכרתיים לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 81: שיעור תיעוד GFR בסוכרתיים לפי גיל ומין – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל							
		18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	סה"כ
זכר	מונה	1,240	3,030	10,852	32,457	64,732	78,326	40,104	230,741
	מכנה	1,531	3,758	13,148	37,908	71,957	83,355	41,904	253,561
	שיעור	81.0%	80.6%	82.5%	85.6%	90.0%	94.0%	95.7%	91.0%
נקבה	מונה	1,305	3,098	8,069	24,215	56,606	75,162	48,964	217,419
	מכנה	1,494	3,565	9,173	26,888	61,128	79,135	51,192	232,575
	שיעור	87.3%	86.9%	88.0%	90.1%	92.6%	95.0%	95.6%	93.5%
סה"כ	מונה	2,545	6,128	18,921	56,672	121,338	153,488	89,068	448,160
	מכנה	3,025	7,323	22,321	64,796	133,085	162,490	93,096	486,136
	שיעור	84.1%	83.7%	84.8%	87.5%	91.2%	94.5%	95.7%	92.2%

טבלה 82: שיעור תיעוד GFR בסוכרתיים לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		מצב חברתי-כלכלי						
		1	2	3	4	סה"כ		
18-24	מונה	748	733	616	325	2,422		
	מכנה	867	867	770	379	2,883		
	שיעור	86.3%	84.5%	80.0%	85.8%	84.0%		
25-34	מונה	1,682	1,929	1,556	611	5,778		
	מכנה	2,007	2,296	1,887	725	6,915		
	שיעור	83.8%	84.0%	82.5%	84.3%	83.6%		
35-44	מונה	5,733	5,776	4,682	1,583	17,774		
	מכנה	6,711	6,857	5,543	1,884	20,995		
	שיעור	85.4%	84.2%	84.5%	84.0%	84.7%		
45-54	מונה	15,827	18,191	14,490	5,033	53,541		
	מכנה	17,890	20,918	16,655	5,785	61,248		
	שיעור	88.5%	87.0%	87.0%	87.0%	87.4%		
55-64	מונה	24,004	42,184	36,063	13,064	115,315		
	מכנה	26,148	46,361	39,585	14,391	126,485		
	שיעור	91.8%	91.0%	91.1%	90.8%	91.2%		
65-74	מונה	20,369	49,506	53,742	23,369	146,986		
	מכנה	21,570	52,515	56,837	24,660	155,582		
	שיעור	94.4%	94.3%	94.6%	94.8%	94.5%		
75-84	מונה	10,320	30,683	31,337	13,551	85,891		
	מכנה	10,896	32,089	32,664	14,109	89,758		
	שיעור	94.7%	95.6%	95.9%	96.0%	95.7%		
סה"כ	מונה	78,683	149,002	142,486	57,536	427,707		
	מכנה	86,089	161,903	153,941	61,933	463,866		
	שיעור	91.4%	92.0%	92.6%	92.9%	92.2%		

שיעור חולי סוכרת עם פגיעה כלייתית בני 18–84

הגדרת המדד: שיעור חולי הסוכרת בני 18 עד 84 עם פגיעה כלייתית אשר אובחנה על סמך בדיקה לא תקינה של תפקודי כליות ו/או הפרשה פתולוגית של חלבון/אלבומין בשתן בשנה הקודמת לשנת המדד.

מכנה: חולי סוכרת בני 18 עד 84 אשר ביצעו בדיקה להפרשת חלבון בשתן (מיקרואלבומינוריה, פרוטאינוריה, יחס אלבומין-קראטינין או יחס חלבון/קראטינין) ו/או להערכת התפקוד הכלייתי (רמת קראטינין, GFR או eGFR) בשנה הקודמת לשנת המדד.

מונה: מספר המבוטחים במכנה המקיימים לפחות אחד מהתנאים הבאים בשנה הקודמת לשנת המדד, על סמך הבדיקה האחרונה:


1. בדיקה לא תקינה של הפרשת חלבון או אלבומין בשתן: (הפרשת אלבומין בשתן גבוהה מ-30 מ"ג/יום) או (הפרשת חלבון בשתן גבוה מ-150 מ"ג/יום) או (יחס אלבומין לקראטינין גבוה מ-30 מ"ג/גרם) או (יחס חלבון לקראטינין גבוה מ-200 מ"ג/גרם או 0.2 מ"ג/מ"ג). או:

2. אם קיים ערך של eGFR/GFR אז: הערך נמוך מ-60 מ"ל/דקה/1.73 מ². אם לא קיימים ערכי eGFR/GFR אז קראטינין גבוה מ-1.5 מ"ג/ד"ל (132 מיקרומול/ליטר).


הערות: ניתן לבצע חישוב של eGFR בהתבסס על רמות הקראטינין בדם על פי נוסחאות שונות. במסגרת התוכנית לא נעשה חישוב eGFR אלא נלקח הערך המחושב ממסדי הנתונים של קופות החולים.

תוצאות: שיעור חולי הסוכרת בני 18–84 הסובלים מפגיעה כלייתית עלה בין השנים 2014–2017 מ-30.5% ב-2014 ל-32.7% בשנת 2017 אך ירד ל-32.1% ב-2018. השיעור היה נמוך יותר בקרב נשים (29.8%) מאשר בקרב גברים (34.3%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (32.7%) היה מעט גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (30.1%). ניתן לראות כי בכל שכבות הגיל, שיעור הסובלים מפגיעה כלייתית גבוה במידה ניכרת בקרב השכבה החברתית-כלכלית החלשה, ופוחת עם העלייה במצב החברתי-כלכלי (ראה טבלה 82).


תרשים 132: שיעור חולי סוכרת עם פגיעה כלייתית לפי שנה, 2014–2018



תרשים 133: שיעור חולי סוכרת עם פגיעה כלייתית לפי גיל ומין, 2018



תרשים 134: שיעור חולי סוכרת עם פגיעה כלייתית לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 83: שיעור חולי סוכרת עם פגיעה כלייתית לפי גיל ומין
מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל							
		18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	סה"כ
זכר	מונה	111	547	2,562	8,332	19,185	30,005	21,572	82,314
	מכנה	1,325	3,363	12,053	34,861	67,453	80,114	40,766	239,935
	שיעור	8.4%	16.3%	21.3%	23.9%	28.4%	37.5%	52.9%	34.3%
נקבה	מונה	126	516	1,529	5,157	12,780	22,544	23,796	66,448
	מכנה	1,338	3,277	8,620	25,552	58,185	76,527	49,800	223,299
	שיעור	9.4%	15.7%	17.7%	20.2%	22.0%	29.5%	47.8%	29.8%
סה"כ	מונה	237	1,063	4,091	13,489	31,965	52,549	45,368	148,762
	מכנה	2,663	6,640	20,673	60,413	125,638	156,641	90,566	463,234
	שיעור	8.9%	16.0%	19.8%	22.3%	25.4%	33.5%	50.1%	32.1%

טבלה 84: שיעור חולי סוכרת עם פגיעה כלייתית
לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		מצב חברתי-כלכלי						
		1	2	3	4	סה"כ		
18-24	מונה	106	62	42	13	223		
	מכנה	778	744	676	342	2,540		
	שיעור	13.6%	8.3%	6.2%	3.8%	8.8%		
25-34	מונה	367	367	197	51	982		
	מכנה	1,854	2,077	1,700	647	6,278		
	שיעור	19.8%	17.7%	11.6%	7.9%	15.6%		
35-44	מונה	1,390	1,299	904	212	3,805		
	מכנה	6,250	6,348	5,117	1,723	19,438		
	שיעור	22.2%	20.5%	17.7%	12.3%	19.6%		
45-54	מונה	4,255	4,481	3,014	892	12,642		
	מכנה	16,818	19,499	15,446	5,336	57,099		
	שיעור	25.3%	23.0%	19.5%	16.7%	22.1%		
55-64	מונה	7,093	11,583	8,602	2,851	30,129		
	מכנה	24,805	43,863	37,252	13,465	119,385		
	שיעור	38.7%	34.5%	31.6%	29.9%	33.3%		
65-74	מונה	8,041	17,512	17,324	7,097	49,974		
	מכנה	20,795	50,695	54,773	23,717	149,980		
	שיעור	38.7%	34.5%	31.6%	29.9%	33.3%		
75-84	מונה	5,481	15,597	15,866	6,663	43,607		
	מכנה	10,537	31,160	31,826	13,805	87,328		
	שיעור	52.0%	50.1%	49.9%	48.3%	49.9%		
סה"כ	מונה	26,733	50,901	45,949	17,779	141,362		
	מכנה	81,837	154,386	146,790	59,035	442,048		
	שיעור	32.7%	33.0%	31.3%	30.1%	32.0%		

ניטור תחלואה נלווית שכיחה לסוכרת

רצינאל: סוכרת מסוג 2 הינה מחלה מטבולית המאופיינת ברמת גלוקוז גבוהה בנסיוב כתוצאה מתנגודת לאינסולין ברקמות הגוף, כגון שריר ושומן, במקביל לחסר יחסי של אינסולין ויצור יתר של גלוקוז בכבד. מחלות נלוות לסוכרת הינן מצבי בריאות המופיעים בשכיחות גבוהה יותר בקרב חולי סוכרת לעומת פרטים דומים מבחינת גיל אשר אינם סובלים מסוכרת. רבות מהמחלות הנלוות מקשות על איזון הסוכרת ותורמות לפגיעה הסוכרתית באברי מטרה, ואיזון מיטבי שלהן מסייע במניעה או בעיכוב של פגיעה זו. מדדי האיכות מתייחסים כיום לשלוש מחלות נלוות שכיחות: יתר לחץ דם, דיסליפידמיה והשמנת יתר. מחלות נלוות אלו מהוות גורם סיכון עצמאי לתחלואה במחלות לב וכלי דם המהוות את גורם התמותה השכיח ביותר בקרב חולי סוכרת (13).

מעריכים כי כ־80% מחולי סוכרת הבוגרים סובלים גם מיתר לחץ דם. שיעור זה גבוה פי שניים לפחות בהשוואה לאוכלוסיה הכללית. תחלואה כפולה בסוכרת ויתר לחץ דם מעלה, כאמור, את הסיכון למחלות לב וכלי דם ואף תורמת לפגיעה בכלי דם קטנים המתבטאת בפגיעה סוכרתית עינית וכלייתית (5,4). חולי סוכרת חייבים באיזון קפדני של לחץ הדם, כשערך הסף להגדרת יתר לחץ דם בחולי סוכרת, בדומה לכלל האוכלוסיה נקבע על 140/90 מ"מ"כ (6).

כמו כן, מומלץ לבצע ניטור של רמת הכולסטרול על-ידי מדידת הרכב שומני הדם אחת לשנה, שכן טיפול אינטנסיבי להפחתת רמת כולסטרול LDL מביא לירידה משמעותית בסיכון להתקפי לב, לשבץ מוחי, ולתמותה בקרב חולי סוכרת (6). הטיפול המקובל משלב שינוי באורח החיים ושימוש בתרופות ממשפחת הסטטינים. ההנחיות הישראליות של החברה לחקר, מניעה וטיפול בטרשת העורקים משנת 2014 מדגישות את החשיבות של המשך השימוש בערכי מטרה לאיזון רמות ה־LDL. בחולי סוכרת המצויים בסיכון גבוה לתחלואות לב וכלי דם (לא קיימים כגורמי סיכון נוספים מעבר לסוכרת) יש לשאוף לערכי כולסטרול LDL של 100 מ"ג/ד"ל ומטה, ובחולי סוכרת המצויים בסיכון גבוה מאד (קיים לפחות גורם סיכון אחד בנוסף לסוכרת) יש לשאוף לערכי LDL שווים או נמוכים מ־70 מ"ג/ד"ל (14). הגדרת הממד מאמצת את ערך היעד של 100 מ"ג/ד"ל כרף העליון של רמת ה־LDL עבור כלל חולי הסוכרת.

השמנת יתר מהווה גורם סיכון חשוב להתפתחות סוכרת מסוג 2, נוסף על כך שהיא מקשה על איזון ערכי הסוכר, מחמירה מחלות נלוות אחרות ומהווה גורם סיכון לתחלואה לבבית (6). בחולים סוכרתיים הסובלים מעודף משקל, גם ירידה מתונה וקבועה במשקל הוכחה כמשפרת את איזון הסוכרת, את השליטה ביתר לחץ דם ובדיסליפידמיה ומפחיתה את הצורך בטיפול תרופתי במצבים אלו. ההנחיות לטיפול בסוכרת כוללות מעקב אחר משקל הגוף ושמירה על משקל גוף תקין, באמצעות קיום אורח חיים הכולל תזונה נכונה ופעילות גופנית סדירה, טיפול התנהגותי ובמידת הצורך, טיפול תרופתי וניתוח בריאטרי. ניתוחים בריאטריים (מטבוליים) הוכחו כאמצעי יעיל לירידה במשקל, לאיזון סוכרת ולהפחתת גורמי הסיכון למחלות לב וכלי דם. הם מומלצים לחולים סוכרתיים עם BMI של 40 ק"ג/מ² ומעלה או לחולים עם BMI בין 35 ק"ג/מ² ו־40 ק"ג/מ² הסובלים מסוכרת לא מאוזנת.

מדדים:

לחץ דם

- ✓ שיעור התייעוד של מדידות לחץ דם בחולי סוכרת בני 18 ומעלה
- ✓ שיעור בעלי לחץ דם נמוך או שווה ל-140/90 מ"מ כספית בחולי סוכרת בני 18 ומעלה

רמות כולסטרול

- ✓ שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול בחולי סוכרת בני 18 ומעלה
- ✓ שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל בחולי סוכרת בני 18-80

משקל הגוף

- ✓ שיעור התייעוד של מרכיבי BMI בחולי סוכרת בני 20-64
- ✓ שיעור ההימצאות של עודף משקל בחולי סוכרת בני 20-64
- ✓ שיעור ההימצאות של השמנת יתר בחולי סוכרת בני 20-64
- ✓ שיעור ההימצאות של השמנת יתר חולנית בחולי סוכרת בני 20-64
- ✓ שיעור התייעוד של מרכיבי BMI בחולי סוכרת בני 65-84
- ✓ שיעור ההימצאות של השמנת יתר והשמנת יתר חולנית בחולי סוכרת בני 65-84

הערות: ה-BMI (Body Mass Index) הוא מדד למצב התזונתי של אדם, למשקלו בהתחשב בגובהו. הוא מחושב כמנה של משקל הגוף בק"ג חלקי ריבוע הגובה במטרים.

שיעור התיעוד של מדידות לחץ דם בחולי סוכרת בני 18 ומעלה


הגדרת המדד: שיעור חולי סוכרת בגילאי 18 ומעלה עם תיעוד מדידת לחץ דם אחת לפחות בשנת המדד

מכנה: חולי סוכרת בני 18 ומעלה


מונה: מספר המבוטחים במכנה עם תיעוד לחץ דם לפחות פעם אחת בשנת המדד.

תוצאות: שיעור התיעוד של ערכי לחץ דם בחולי סוכרת בני 18 ומעלה נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 90.7% ב-2018. השיעור היה דומה בקרב גברים ונשים. השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (91.8%) היה מעט גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (89.8%).


תרשים 135: שיעור תיעוד מדידות לחץ דם בסוכרתיים לפי שנה, 2014-2018



תרשים 136: שיעור תיעוד מדידות לחץ דם בסוכרתיים לפי גיל ומין, 2018



תרשים 137: שיעור תיעוד מדידות לחץ דם בסוכרתיים לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 85: שיעור תיעוד מדידות לחץ דם בסוכרתיים לפי גיל ומין -

מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל								
		סה"כ	85+	75-84	65-74	55-64	45-54	35-44	25-34	18-24
זכר	מונה	238,889	10,175	39,322	77,359	64,631	32,594	10,751	2,910	1,147
	מכנה	264,750	11,189	41,904	83,355	71,957	37,908	13,148	3,758	1,531
	שיעור	90.2%	90.9%	93.8%	92.8%	89.8%	86.0%	81.8%	77.4%	74.9%
נקבה	מונה	227,436	14,470	47,264	73,954	56,103	23,853	7,739	2,851	1,202
	מכנה	249,479	16,904	51,192	79,135	61,128	26,888	9,173	3,565	1,494
	שיעור	91.2%	85.6%	92.3%	93.5%	91.8%	88.7%	84.4%	80.0%	80.5%
סה"כ	מונה	466,325	24,645	86,586	151,313	120,734	56,447	18,490	5,761	2,349
	מכנה	514,229	28,093	93,096	162,490	133,085	64,796	22,321	7,323	3,025
	שיעור	90.7%	87.7%	93.0%	93.1%	90.7%	87.1%	82.8%	78.7%	77.7%

**טבלה 86: שיעור תיעוד מדידות לחץ דם בסוכרתיים
לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

מצב חברתי-כלכלי					
	1	2	3	4	סה"כ
18-24	מונה	726	573	285	2,236
	מכנה	867	770	379	2,883
	שיעור	83.7%	75.2%	74.4%	75.2%
25-34	מונה	1,640	1,421	560	5,425
	מכנה	2,007	1,887	725	6,915
	שיעור	81.7%	78.6%	77.2%	78.5%
35-44	מונה	5,762	4,468	1,463	17,357
	מכנה	6,711	5,543	1,884	20,995
	שיעור	85.9%	82.6%	77.7%	82.7%
45-54	מונה	16,000	14,252	4,903	53,294
	מכנה	17,890	16,655	5,785	61,248
	שיעור	89.4%	86.7%	84.8%	87.0%
55-64	מונה	24,362	35,445	12,767	114,697
	מכנה	26,148	39,585	14,391	126,485
	שיעור	93.2%	90.9%	88.7%	90.7%
65-74	מונה	20,414	48,909	22,768	144,882
	מכנה	21,570	52,515	24,660	155,582
	שיעור	94.6%	93.1%	92.3%	93.1%
75-84	מונה	10,191	29,854	13,057	83,474
	מכנה	10,896	32,089	14,109	89,758
	שיעור	93.5%	93.0%	92.5%	93.0%
85+	מונה	2,308	7,958	4,487	23,771
	מכנה	2,583	9,089	5,205	27,101
	שיעור	89.4%	87.6%	86.2%	87.7%
סה"כ	מונה	81,403	155,103	60,290	445,136
	מכנה	88,672	170,992	67,138	490,967
	שיעור	91.8%	90.7%	89.8%	90.7%

שיעור בעלי לחץ דם נמוך או שווה ל-140/90 מ"מ כספית בחולי סוכרת בני 18 ומעלה

הגדרת המדד: שיעור חולי סוכרת בגילאי 18 ומעלה שערכי מדידת לחץ הדם האחרונה שלהם היו סיסטולי 140 מ"מ"כ או פחות יחד עם דיאסטולי 90 מ"מ"כ או פחות.


מכנה: חולי סוכרת בני 18 ומעלה עם תיעוד של מדידת לחץ דם אחת לפחות בשנת המדד.

מונה: מספר המבוטחים במכנה עם ערכי מדידת לחץ דם אחרונה של סיסטולי 140 מ"מ"כ או פחות יחד עם דיאסטולי 90 מ"מ"כ או פחות.


הערות: בשנת 2017 פורסמו קווים מנחים עדכניים למניעת, אבחון וטיפול ביתר לחץ דם מטעם ה־American College of Cardiology וה־American Heart Association המגדירים ערך סף חדש של 130/80 מ"מ כספית לקביעת אבחנה של יתר לחץ דם באוכלוסייה הכללית ובחולי סוכרת בפרט (15). קווים מנחים אלו לא אומצו בינתיים בישראל והגדרת המדד נותרה כשהיתה.

תוצאות: שיעור חולי הסוכרת בני 18 ומעלה שעמדו ביעד האיזון (לחץ דם נמוך או שווה ל-140/90 מ"מ כספית) נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 83.0% ב-2018. השיעור היה דומה בקרב נשים וגברים. השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (85.4%) היה מעט גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (82.3%).


**תרשים 138: שיעור בעלי לחץ דם נמוך או שווה ל-140/90 מ"מ בסוכרתיים
לפי שנה, 2014-2018**



**תרשים 139: שיעור בעלי לחץ דם נמוך או שווה ל-140/90 מ"מ בסוכרתיים
לפי גיל ומין, 2018**



**תרשים 140: שיעור בעלי לחץ דם נמוך או שווה ל-140/90 מ"מ בסוכרתיים
לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018**



טבלה 87: שיעור בעלי לחץ דם נמוך או שווה ל-140/90 מ"מ בסוכרתיים
לפי גיל ומין – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל							
		18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
זכר	מונה	1,112	2,716	9,573	28,009	53,875	63,576	31,583	8,092
	מכנה	1,147	2,910	10,751	32,594	64,631	77,359	39,322	10,175
	שיעור	96.9%	93.3%	89.0%	85.9%	83.4%	82.2%	80.3%	79.5%
נקבה	מונה	1,170	2,734	7,119	21,133	48,147	60,789	36,278	10,936
	מכנה	1,202	2,851	7,739	23,853	56,103	73,954	47,264	14,470
	שיעור	97.3%	95.9%	92.0%	88.6%	85.8%	82.2%	76.8%	75.6%
סה"כ	מונה	2,282	5,450	16,692	49,142	102,022	124,365	67,861	19,028
	מכנה	2,349	5,761	18,490	56,447	120,734	151,313	86,586	24,645
	שיעור	97.1%	94.6%	90.3%	87.1%	84.5%	82.2%	78.4%	77.2%

טבלה 88: שיעור בעלי לחץ דם נמוך או שווה ל-140/90 מ"מ בסוכרתיים
לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		מצב חברתי-כלכלי				
		1	2	3	4	סה"כ
18-24	מונה	702	637	560	275	2,174
	מכנה	726	652	573	285	2,236
	שיעור	96.7%	97.7%	97.7%	96.5%	97.2%
25-34	מונה	1,545	1,706	1,348	535	5,134
	מכנה	1,640	1,804	1,421	560	5,425
	שיעור	94.2%	94.6%	94.9%	95.5%	94.6%
35-44	מונה	5,260	5,045	4,015	1,331	15,651
	מכנה	5,762	5,664	4,468	1,463	17,357
	שיעור	91.3%	89.1%	89.9%	91.0%	90.2%
45-54	מונה	14,150	15,621	12,302	4,273	46,346
	מכנה	16,000	18,139	14,252	4,903	53,294
	שיעור	88.4%	86.1%	86.3%	87.2%	87.0%
55-64	מונה	20,902	35,318	29,907	10,747	96,874
	מכנה	24,362	42,123	35,445	12,767	114,697
	שיעור	85.8%	83.8%	84.4%	84.2%	84.5%
65-74	מונה	16,937	39,939	43,381	18,833	119,090
	מכנה	20,414	48,909	52,791	22,768	144,882
	שיעור	83.0%	81.7%	82.2%	82.7%	82.2%
75-84	מונה	8,183	23,323	23,689	10,234	65,429
	מכנה	10,191	29,854	30,372	13,057	83,474
	שיעור	80.3%	78.1%	78.0%	78.4%	78.4%
85+	מונה	1,852	6,160	6,946	3,399	18,357
	מכנה	2,308	7,958	9,018	4,487	23,771
	שיעור	80.2%	77.4%	77.0%	75.8%	77.2%
סה"כ	מונה	69,531	127,749	122,148	49,627	369,055
	מכנה	81,403	155,103	148,340	60,290	445,136
	שיעור	85.4%	82.4%	82.3%	82.3%	82.9%

שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול בחולי סוכרת בני 18 ומעלה


הגדרת המדד: שיעור חולי סוכרת אשר ביצעו לפחות בדיקה אחת של כולסטרול LDL או non-HDL בשנת המדד

מכנה: חולי סוכרת בני 18 ומעלה


מונה: מספר המבוטחים במכנה אשר ביצעו בדיקת כולסטרול LDL או כולסטרול non-HDL בשנת המדד.

תוצאות: שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול בחולי סוכרת בני 18 ומעלה נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 90.9% ב-2018. השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (92.0%) מאשר בקרב גברים (89.9%). השיעור היה דומה בין השכבות החברתיות-כלכליות השונות.

תרשים 141: שיעור ביצוע בדיקת כולסטרול בסוכרתיים לפי שנה, 2014-2018




תרשים 142: שיעור ביצוע בדיקת כולסטרול בסוכרתיים לפי גיל ומין, 2018



תרשים 143: שיעור ביצוע בדיקת כולסטרול בסוכרתיים

לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 89: שיעור ביצוע בדיקת כולסטרול בסוכרתיים לפי גיל ומין -

מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל								
		סה"כ	85+	75-84	65-74	55-64	45-54	35-44	25-34	18-24
זכר	מונה	238,130	10,188	39,347	77,477	64,142	32,084	10,735	2,969	1,188
	מכנה	264,750	11,189	41,904	83,355	71,957	37,908	13,148	3,758	1,531
	שיעור	89.9%	91.1%	93.9%	92.9%	89.1%	84.6%	81.6%	79.0%	77.6%
	מכנה	229,543	15,044	47,948	74,410	56,137	23,986	7,856	2,912	1,250
נקבה	מכנה	249,479	16,904	51,192	79,135	61,128	26,888	9,173	3,565	1,494
	שיעור	92.0%	89.0%	93.7%	94.0%	91.8%	89.2%	85.6%	81.7%	83.7%
	מכנה	467,673	25,232	87,295	151,887	120,279	56,070	18,591	5,881	2,438
	שיעור	90.9%	89.8%	93.8%	93.5%	90.4%	86.5%	83.3%	80.3%	80.6%
סה"כ	מכנה	514,229	28,093	93,096	162,490	133,085	64,796	22,321	7,323	3,025
	שיעור	90.9%	89.8%	93.8%	93.5%	90.4%	86.5%	83.3%	80.3%	80.6%
	מכנה	514,229	28,093	93,096	162,490	133,085	64,796	22,321	7,323	3,025
	שיעור	90.9%	89.8%	93.8%	93.5%	90.4%	86.5%	83.3%	80.3%	80.6%

**טבלה 90: שיעור ביצוע בדיקת כולסטרול בסוכרתיים
לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

מצב חברתי-כלכלי						
	סה"כ	4	3	2	1	
18-24	מונה	2,320	306	590	708	716
	מכנה	2,883	379	770	867	867
	שיעור	80.5%	80.7%	76.6%	81.7%	82.6%
25-34	מונה	5,543	584	1,474	1,852	1,633
	מכנה	6,915	725	1,887	2,296	2,007
	שיעור	80.2%	80.6%	78.1%	80.7%	81.4%
35-44	מונה	17,463	1,546	4,607	5,642	5,668
	מכנה	20,995	1,884	5,543	6,857	6,711
	שיעור	83.2%	82.1%	83.1%	82.3%	84.5%
45-54	מונה	52,970	4,964	14,289	18,009	15,708
	מכנה	61,248	5,785	16,655	20,918	17,890
	שיעור	86.5%	85.8%	85.8%	86.1%	87.8%
55-64	מונה	114,300	12,921	35,683	41,784	23,912
	מכנה	126,485	14,391	39,585	46,361	26,148
	שיעור	90.4%	89.8%	90.1%	90.1%	91.4%
65-74	מונה	145,451	23,072	53,211	48,996	20,172
	מכנה	155,582	24,660	56,837	52,515	21,570
	שיעור	93.5%	93.6%	93.6%	93.3%	93.5%
75-84	מונה	84,163	13,251	30,738	30,057	10,117
	מכנה	89,758	14,109	32,664	32,089	10,896
	שיעור	93.8%	93.9%	94.1%	93.7%	92.9%
85+	מונה	24,331	4,668	9,219	8,120	2,324
	מכנה	27,101	5,205	10,224	9,089	2,583
	שיעור	89.8%	89.7%	90.2%	89.3%	90.0%
סה"כ	מונה	446,541	61,312	149,811	155,168	80,250
	מכנה	490,967	67,138	164,165	170,992	88,672
	שיעור	91.0%	91.3%	91.3%	90.7%	90.5%

שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל בחולי סוכרת בני 18-80

הגדרת המדד: שיעור חולי סוכרת בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל


מכנה: חולי סוכרת בני 18-80 שביצעו בדיקת כולסטרול LDL או non-HDL בשנת המדד.

מונה: מספר המבוטחים במכנה עם רמת LDL נמוכה או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל (או רמת כולסטרול non-HDL נמוכה מ-130 מ"ג/ד"ל) (תוצאה אחרונה).


תוצאות: שיעור חולי הסוכרת בני 18-80 שהגיעו ליעד האיזון בכולסטרול (רמת LDL נמוכה או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל) נותר יציב בין השנים 2014-2018, ועמד על 66.0% בשנת 2018. השיעור היה נמוך יותר בקרב נשים (62.8%) מאשר בקרב גברים (69.0%). הפער היה בולט במיוחד מגיל 45 ומעלה. השיעור הכולל בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (65.0%) היה מעט נמוך יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (67.7%). הקשר בין מצב חברתי-כלכלי ושיעור האיזון היה הפוך בגברים לעומת נשים: בקרב הגברים שיעור האיזון היה גבוה ככל שהמצב החברתי-כלכלי היה גבוה ובקרב הנשים נצפה יחס הפוך בין שיעור האיזון למצב החברתי-כלכלי (תרשים 146).

תרשים 144: בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל בסוכרתיים


לפי שנה, 2018-2014



**תרשים 145: בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל בסוכרתיים
לפי גיל ומין, 2018**



**תרשים 146: בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל בסוכרתיים
לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018**



**טבלה 91: בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל בסוכרתיים
לפי גיל ומין - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

		גיל							
		סה"כ	70-79	60-69	50-59	40-49	30-39	20-29	
זכר	מונה	146,046	45,658	56,471	29,252	10,706	2,642	1,066	251
	מכנה	211,768	58,479	78,394	47,056	20,104	5,444	1,927	364
	שיעור	69.0%	78.1%	72.0%	62.2%	53.3%	48.5%	55.3%	69.0%
נקבה	מונה	121,362	42,753	46,596	21,330	7,297	2,116	1,086	184
	מכנה	193,185	61,639	72,089	38,303	14,304	4,406	2,122	322
	שיעור	62.8%	69.4%	64.6%	55.7%	51.0%	48.0%	51.2%	57.1%
סה"כ	מונה	267,408	88,411	103,067	50,582	18,003	4,758	2,152	435
	מכנה	404,953	120,118	150,483	85,359	34,408	9,850	4,049	686
	שיעור	66.0%	73.6%	68.5%	59.3%	52.3%	48.3%	53.1%	63.4%

טבלה 92: בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל בסוכרתיים לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי					
	1	2	3	4	סה"כ
18-19	מונה	121	127	105	58
	מכנה	195	187	177	87
	שיעור	62.1%	67.9%	59.3%	66.7%
20-29	מונה	618	650	528	239
	מכנה	1,127	1,236	1,000	482
	שיעור	54.8%	52.6%	52.8%	49.6%
30-39	מונה	1,451	1,446	1,156	372
	מכנה	2,901	3,002	2,468	858
	שיעור	50.0%	48.2%	46.8%	43.4%
40-49	מונה	5,576	5,459	4,322	1,485
	מכנה	10,215	10,649	8,618	2,949
	שיעור	54.6%	51.3%	50.2%	50.4%
50-59	מונה	12,744	17,020	13,270	4,627
	מכנה	20,915	29,041	22,879	8,004
	שיעור	60.9%	58.6%	58.0%	57.8%
60-69	מונה	16,162	34,503	33,852	13,657
	מכנה	23,324	51,021	49,712	19,599
	שיעור	69.3%	67.6%	68.1%	69.7%
70-79	מונה	11,466	28,250	31,197	13,811
	מכנה	15,429	39,087	42,174	18,644
	שיעור	74.3%	72.3%	74.0%	74.1%
סה"כ	מונה	48,138	87,455	84,430	34,249
	מכנה	74,106	134,223	127,028	50,623
	שיעור	65.0%	65.2%	66.5%	67.7%

שיעור התיעוד של מרכיבי BMI בחולי סוכרת בני 20-64


הגדרת המדד: שיעור חולי סוכרת בגילאי 20-64 אשר ניתן היה לחשב עבורם את ערך ה-BMI בשנת המדד

מכנה: חולי סוכרת בני 20-64

מונה: מספר המבוטחים במכנה עם תיעוד מרכיבי חישוב BMI (משקל וגובה- תיעוד משקל בשנת המדד וגובה פעם אחת אחרי גיל 18).

תוצאות: שיעור התיעוד של מרכיבי BMI בחולי סוכרת בני 20-64 עמד על 84.8% ב־2018, נמוך במעט בהשוואה לשנת 2014 (90.5%). השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (86.4%) מאשר בקרב גברים (83.6%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (88.1%) היה מעט גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (80.9%).


תרשים 147: תיעוד מרכיבי BMI בסוכרתיים לפי שנה, 2015-2018



תרשים 148: תיעוד מרכיבי BMI בסוכרתיים לפי גיל ומין, 2018



תרשים 149: תיעוד מרכיבי BMI בסוכרתיים לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 93: תיעוד מרכיבי BMI בסוכרתיים לפי גיל ומין - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

	גיל						
		סה"כ	55-64	45-54	35-44	25-34	20-24
זכר	מונה	99,514	54,109	31,116	10,557	2,903	829
	מכנה	119,040	63,149	37,908	13,148	3,758	1,077
	שיעור	83.6%	85.7%	82.1%	80.3%	77.2%	77.0%
נקבה	מונה	81,267	47,017	22,978	7,538	2,839	895
	מכנה	94,048	53,315	26,888	9,173	3,565	1,107
	שיעור	86.4%	88.2%	85.5%	82.2%	79.6%	80.8%
סה"כ	מונה	180,781	101,126	54,094	18,095	5,742	1,724
	מכנה	213,088	116,464	64,796	22,321	7,323	2,184
	שיעור	84.8%	86.8%	83.5%	81.1%	78.4%	78.9%

טבלה 94: תיעוד מרכיבי BMI בסוכרתיים לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי					
	סה"כ	4	3	2	1
20-24	מונה	526	502	412	207
	מכנה	632	645	543	267
	שיעור	83.2%	77.8%	75.9%	77.5%
25-34	מונה	1,656	1,801	1,417	533
	מכנה	2,007	2,296	1,887	725
	שיעור	82.5%	78.4%	75.1%	73.5%
35-44	מונה	5,693	5,534	4,319	1,409
	מכנה	6,711	6,857	5,543	1,884
	שיעור	84.8%	80.7%	77.9%	74.8%
45-54	מונה	15,604	17,347	13,446	4,582
	מכנה	17,890	20,918	16,655	5,785
	שיעור	87.2%	82.9%	80.7%	79.2%
55-64	מונה	21,177	35,404	29,017	10,249
	מכנה	23,422	40,747	34,151	12,320
	שיעור	90.4%	86.9%	85.0%	83.2%
סה"כ	מונה	44,656	60,588	48,611	16,980
	מכנה	50,662	71,463	58,779	20,981
	שיעור	88.1%	84.8%	82.7%	80.9%

שיעור ההימצאות של עודף משקל בחולי סוכרת בני 20-64


הגדרת המדד: שיעור חולי סוכרת בגילאי 20-64 אשר סובלים מעודף משקל

מכנה: חולי סוכרת בני 20-64 עם תיעוד BMI (תיעוד משקל בשנת המדד וגובה פעם אחת אחרי גיל 18).


מונה: מספר המבוטחים במכנה עם ערך BMI אחרון גדול או שווה ל-25 ק"ג/מ² וקטן מ-30 ק"ג/מ².

תוצאות: שיעור ההימצאות של עודף משקל בקרב חולי סוכרת בני 20-64 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 35.0%. השיעור היה נמוך יותר במידה ניכרת בקרב נשים (28.7%) מאשר בקרב גברים (40.0%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (31.9%) היה נמוך יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (39.9%).

תרשים 150: שיעור הימצאות עודף משקל בסוכרתיים לפי שנה, 2014-2018




תרשים 151: שיעור הימצאות עודף משקל בסוכרתיים לפי גיל ומין, 2018



תרשים 152: שיעור הימצאות עודף משקל בסוכרתיים

לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 95: שיעור הימצאות עודף משקל בסוכרתיים לפי גיל ומין -

מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל					
		סה"כ	55-64	45-54	35-44	25-34	20-24
זכר	מונה	39,844	22,979	12,119	3,655	883	208
	מכנה	99,514	54,109	31,116	10,557	2,903	829
	שיעור	40.0%	42.5%	38.9%	34.6%	30.4%	25.1%
	מונה	23,352	14,225	6,158	1,935	780	254
נקבה	מכנה	81,267	47,017	22,978	7,538	2,839	895
	שיעור	28.7%	30.3%	26.8%	25.7%	27.5%	28.4%
	מונה	63,196	37,204	18,277	5,590	1,663	462
	מכנה	180,781	101,126	54,094	18,095	5,742	1,724
סה"כ	שיעור	35.0%	36.8%	33.8%	30.9%	29.0%	26.8%

טבלה 96: שיעור הימצאות עודף משקל בסוכרתיים
לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי					
סה"כ	4	3	2	1	
435	53	117	126	139	מונה
1,647	207	412	502	526	מכנה
26.4%	25.6%	28.4%	25.1%	26.4%	שיעור
1,550	153	414	534	449	מונה
5,407	533	1,417	1,801	1,656	מכנה
28.7%	28.7%	29.2%	29.7%	27.1%	שיעור
5,218	467	1,365	1,664	1,722	מונה
16,955	1,409	4,319	5,534	5,693	מכנה
30.8%	33.1%	31.6%	30.1%	30.2%	שיעור
17,225	1,755	4,891	5,682	4,897	מונה
50,979	4,582	13,446	17,347	15,604	מכנה
33.8%	38.3%	36.4%	32.8%	31.4%	שיעור
35,248	4,349	11,382	12,489	7,028	מונה
95,847	10,249	29,017	35,404	21,177	מכנה
36.8%	42.4%	39.2%	35.3%	33.2%	שיעור
59,676	6,777	18,169	20,495	14,235	מונה
170,835	16,980	48,611	60,588	44,656	מכנה
34.9%	39.9%	37.4%	33.8%	31.9%	שיעור

שיעור ההימצאות של השמנת יתר בחולי סוכרת בני 20-64


הגדרת המדד: שיעור חולי סוכרת בגילאי 20-64 אשר סובלים מהשמנת יתר

מכנה: חולי סוכרת בני 20-64 עם תיעוד BMI (תיעוד משקל בשנת המדד וגובה פעם אחת אחרי גיל 18).


מונה: מספר המבוטחים במכנה עם ערך BMI אחרון גדול או שווה ל-30 ק"ג/מ² וקטן מ-35 ק"ג/מ².

תוצאות: שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב חולי סוכרת בני 20-64 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 30.4%. ב-2018, השיעור היה דומה בקרב גברים ונשים. השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (32.0%) היה גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (27.9%).

תרשים 153: שיעור הימצאות השמנת יתר בסוכרתיים לפי שנה, 2014-2018




תרשים 154: שיעור הימצאות השמנת יתר בסוכרתיים לפי גיל ומין, 2018



תרשים 155: שיעור הימצאות השמנת יתר בסוכרתיים

לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 97: שיעור הימצאות השמנת יתר בסוכרתיים

לפי גיל ומין - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל					
		20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	סה"כ
זכר	מונה	92	611	3,176	9,784	16,279	29,942
	מכנה	829	2,903	10,557	31,116	54,109	99,514
	שיעור	11.1%	21.0%	30.1%	31.4%	30.1%	30.1%
נקבה	מונה	136	633	2,233	7,360	14,697	25,059
	מכנה	895	2,839	7,538	22,978	47,017	81,267
	שיעור	15.2%	22.3%	29.6%	32.0%	31.3%	30.8%
סה"כ	מונה	228	1,244	5,409	17,144	30,976	55,001
	מכנה	1,724	5,742	18,095	54,094	101,126	180,781
	שיעור	13.2%	21.7%	29.9%	31.7%	30.6%	30.4%

טבלה 98: שיעור הימצאות השמנת יתר בסוכרתיים
לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי					
	סה"כ	1	2	3	4
20-24	מונה	80	73	48	16
	מכנה	526	502	412	207
	שיעור	15.2%	14.5%	11.7%	7.7%
25-34	מונה	439	389	266	83
	מכנה	1,656	1,801	1,417	533
	שיעור	26.5%	21.6%	18.8%	15.6%
35-44	מונה	1,813	1,654	1,242	344
	מכנה	5,693	5,534	4,319	1,409
	שיעור	31.8%	29.9%	28.8%	24.4%
45-54	מונה	5,139	5,470	4,198	1,352
	מכנה	15,604	17,347	13,446	4,582
	שיעור	32.9%	31.5%	31.2%	29.5%
55-64	מונה	6,821	11,030	8,613	2,950
	מכנה	21,177	35,404	29,017	10,249
	שיעור	32.2%	31.2%	29.7%	28.8%
סה"כ	מונה	14,292	18,616	14,367	4,745
	מכנה	44,656	60,588	48,611	16,980
	שיעור	32.0%	30.7%	29.6%	27.9%

שיעור ההימצאות של השמנת יתר חולנית בחולי סוכרת בני 20-64

הגדרת המדד: שיעור חולי סוכרת בגילאי 20-64 אשר סובלים מהשמנת יתר חולנית


מכנה: חולי סוכרת בני 20-64 עם תיעוד BMI (תיעוד משקל בשנת המדד וגובה פעם אחת אחרי גיל 18)

מונה: מספר המבוטחים במכנה עם ערך BMI אחרון גדול או שווה ל-35 ק"ג/מ².


הערות: ערך הסף של השמנת יתר חולנית נקבע על 35 ק"ג/מ² ולא 40 ק"ג/מ² כמקובל באוכלוסייה הכללית, מאחר ועל פי הנחיות משרד הבריאות חולים סוכרתיים בעלי BMI של 35 ק"ג/מ² ומעלה מעומדים לניתוח בריאטרי.

תוצאות: שיעור ההימצאות של השמנת יתר חולנית בקרב חולי סוכרת בני 20-64 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 20.6% ב-2018. השיעור היה גבוה כמעט פי 2 בקרב נשים (27.9%) מאשר בקרב גברים (14.6%). השיעור היה גבוה פי 1.7 בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (24.5%) בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (14.4%). הפער בין השכבה החברתית-כלכלית הנמוכה והגבוהה היה בולט בעיקר בקרב נשים (תרשים 158).


**תרשים 156: שיעור הימצאות השמנת יתר חולנית בסוכרתיים
לפי שנה, 2014-2018**



**תרשים 157: שיעור הימצאות השמנת יתר חולנית בסוכרתיים
לפי גיל ומין, 2018**



**תרשים 158: שיעור הימצאות השמנת יתר חולנית בסוכרתיים
לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018**



טבלה 99: שיעור הימצאות השמנת יתר חולנית בסוכרתיים לפי מצב גיל ומין - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל					
		20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	סה"כ
זכר	מונה	75	465	2,033	5,094	6,884	14,551
	מכנה	829	2,903	10,557	31,116	54,109	99,514
	שיעור	9.0%	16.0%	19.3%	16.4%	12.7%	14.6%
נקבה	מונה	97	611	2,202	7,078	12,714	22,702
	מכנה	895	2,839	7,538	22,978	47,017	81,267
	שיעור	10.8%	21.5%	29.2%	30.8%	27.0%	27.9%
סה"כ	מונה	172	1,076	4,235	12,172	19,598	37,253
	מכנה	1,724	5,742	18,095	54,094	101,126	180,781
	שיעור	10.0%	18.7%	23.4%	22.5%	19.4%	20.6%

טבלה 100: שיעור הימצאות השמנת יתר חולנית בסוכרתיים לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		מצב חברתי-כלכלי				
		1	2	3	4	סה"כ
20-24	מונה	71	52	34	9	166
	מכנה	526	502	412	207	1,647
	שיעור	13.5%	10.4%	8.3%	4.3%	10.1%
25-34	מונה	380	350	225	63	1,018
	מכנה	1,656	1,801	1,417	533	5,407
	שיעור	22.9%	19.4%	15.9%	11.8%	18.8%
35-44	מונה	1,445	1,366	936	240	3,987
	מכנה	5,693	5,534	4,319	1,409	16,955
	שיעור	25.4%	24.7%	21.7%	17.0%	23.5%
45-54	מונה	3,987	4,076	2,608	809	11,480
	מכנה	15,604	17,347	13,446	4,582	50,979
	שיעור	25.6%	23.5%	19.4%	17.7%	22.5%
55-64	מונה	5,067	7,302	4,807	1,329	18,505
	מכנה	21,177	35,404	29,017	10,249	95,847
	שיעור	23.9%	20.6%	16.6%	13.0%	19.3%
סה"כ	מונה	10,950	13,146	8,610	2,450	35,156
	מכנה	44,656	60,588	48,611	16,980	170,835
	שיעור	24.5%	21.7%	17.7%	14.4%	20.6%

שיעור התיעוד של מרכיבי BMI בחולי סוכרת בני 65-84


הגדרת המדד: שיעור חולי סוכרת בגילאי 65-84 אשר ניתן היה לחשב עבורם את ערך ה-BMI בשנת המדד.

מכנה: חולי סוכרת בני 65-84


מונה: מספר המבוטחים במכנה עם תיעוד מרכיבי חישוב BMI (משקל: לפחות פעם אחת בשנת המדד, גובה: לפחות פעם אחת מגיל 65 ועד גיל 83).

תוצאות: שיעור התיעוד של מרכיבי BMI בחולי סוכרת בני 65-84 עמד על 88.4% בשנת 2018, נמוך במעט לעומת שנת 2014 (90.5%). השיעור היה דומה בקרב גברים ונשים. השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (90.4%) היה מעט גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (86.6%).

תרשים 159: תיעוד מרכיבי BMI בסוכרתיים לפי שנה, 2015-2018



תרשים 160: תיעוד מרכיבי BMI בסוכרתיים לפי גיל ומין, 2018



תרשים 161: תיעוד מרכיבי BMI בסוכרתיים לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 101: תיעוד מרכיבי BMI בסוכרתיים לפי גיל ומין - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל				
		סה"כ	80-84	75-79	70-74	65-69
זכר	מונה	108,612	13,037	22,122	33,887	39,566
	מכנה	122,772	14,794	24,623	37,663	45,692
	שיעור	88.5%	88.1%	89.8%	90.0%	86.6%
		112,005	16,628	24,849	33,459	37,069
נקבה	מונה	126,819	19,394	28,290	37,085	42,050
	מכנה	126,819	19,394	28,290	37,085	42,050
	שיעור	88.3%	85.7%	87.8%	90.2%	88.2%
		220,617	29,665	46,971	67,346	76,635
סה"כ	מונה	249,591	34,188	52,913	74,748	87,742
	מכנה	249,591	34,188	52,913	74,748	87,742
	שיעור	88.4%	86.8%	88.8%	90.1%	87.3%

טבלה 102: תיעוד מרכיבי BMI בסוכרתיים לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי					
	סה"כ	4	3	2	1
65-69	מונה	73,187	10,657	26,247	25,583
	מכנה	83,936	12,583	30,350	29,187
	שיעור	87.2%	84.7%	86.5%	87.7%
70-74	מונה	64,469	10,647	23,825	20,993
	מכנה	71,646	12,077	26,487	23,328
	שיעור	90.0%	88.2%	89.9%	90.0%
75-79	מונה	45,137	6,724	16,256	16,122
	מכנה	50,919	7,656	18,177	18,317
	שיעור	88.6%	87.8%	89.4%	88.0%
80-84	מונה	28,644	4,656	10,669	10,203
	מכנה	33,053	5,421	12,240	11,802
	שיעור	86.7%	85.9%	87.2%	86.5%
סה"כ	מונה	211,437	32,684	76,997	72,901
	מכנה	239,554	37,737	87,254	82,634
	שיעור	88.3%	86.6%	88.2%	88.2%

שיעור ההימצאות של השמנת יתר והשמנת יתר חולנית בחולי סוכרת בני 65-84


הגדרת המדד: שיעור חולי סוכרת בגילאי 65-84 אשר סובלים מהשמנת יתר והשמנת יתר חולנית

מכנה: חולי סוכרת בני 65-84 עם תיעוד BMI (תיעוד משקל בשנת המדד וגובה פעם אחת אחרי גיל 65).


מונה: מספר המבוטחים במכנה עם ערך BMI אחרון גדול או שווה ל-30 ק"ג/מ²

תוצאות: שיעור ההימצאות של השמנת יתר והשמנת יתר חולנית בקרב חולי סוכרת בני 65-84 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 43.3% ב-2018. השיעור היה גבוה יותר במידה ניכרת בקרב נשים (50.6%) מאשר בקרב גברים (35.8%). השיעור היה גבוה כמעט פי 1.5 בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (50.8%) בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (35.1%). הקשר בין שיעור גבוה של השמנת יתר והשמנת יתר חולנית לבין מצב חברתי-כלכלי נמוך היה בולט יותר בנשים לעומת גברים.


תרשים 162: שיעור ההימצאות של השמנת יתר והשמנת יתר חולנית בחולי סוכרת בני 65-84 לפי שנה, 2014-2018



**תרשים 163: שיעור הימצאות השמנת יתר והשמנת יתר חולנית
בחולי סוכרת בני 65-84 לפי גיל ומין, 2018**



**תרשים 164: שיעור הימצאות השמנת יתר והשמנת יתר חולנית
בחולי סוכרת בני 65-84 לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018**



**טבלה 103: שיעור הימצאות השמנת יתר והשמנת יתר חולנית
בחולי סוכרת בני 65-84 לפי מצב גיל ומין - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

		גיל				
		סה"כ	80-84	75-79	70-74	65-69
זכר	מונה	38,880	3,858	7,107	12,413	15,502
	מכנה	108,612	13,037	22,122	33,887	39,566
	שיעור	35.8%	29.6%	32.1%	36.6%	39.2%
נקבה	מונה	56,689	7,539	11,937	17,052	20,161
	מכנה	112,005	16,628	24,849	33,459	37,069
	שיעור	50.6%	45.3%	48.0%	51.0%	54.4%
סה"כ	מונה	95,569	11,397	19,044	29,465	35,663
	מכנה	220,617	29,665	46,971	67,346	76,635
	שיעור	43.3%	38.4%	40.5%	43.8%	46.5%

**טבלה 104: שיעור הימצאות השמנת יתר והשמנת יתר חולנית בסוכרתיים
לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

מצב חברתי-כלכלי					
	סה"כ	4	3	2	1
65-69	מונה	5,724	12,774	11,328	4,165
	מכנה	10,700	25,583	26,247	10,657
	שיעור	53.5%	49.9%	43.2%	39.1%
70-74	מונה	4,669	9,907	9,812	3,780
	מכנה	9,004	20,993	23,825	10,647
	שיעור	51.9%	47.2%	41.2%	35.5%
75-79	מונה	2,861	7,212	6,077	2,128
	מכנה	6,035	16,122	16,256	6,724
	שיעור	47.4%	44.7%	37.4%	31.6%
80-84	מונה	1,399	4,324	3,858	1,396
	מכנה	3,116	10,203	10,669	4,656
	שיעור	44.9%	42.4%	36.2%	30.0%
סה"כ	מונה	14,653	34,217	31,075	11,469
	מכנה	28,855	72,901	76,997	32,684
	שיעור	50.8%	46.9%	40.4%	35.1%

שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בחולי סוכרת בני 18 ומעלה

הגדרת המדד: שיעור חולי סוכרת אשר קיבלו חיסון נגד שפעת עונתית

רציונאל: חולים במחלות כרוניות בכל הגילאים, ובהם חולי סוכרת, נמצאים בסיכון מוגבר למחלת השפעת ולסיבוכיה בהשוואה לאנשים בריאים. חולי סוכרת נמצאים בסיכון מוגבר פי 2-4 לתמותה משפעת ביחס לאוכלוסייה הבריאה. בנוסף, חולי סוכרת נוטים יותר לחלות בשפעת בזמן התפרצות השפעת העונתית. משרד הבריאות ממליץ על חיסון שנתי נגד מחלת השפעת לכלל האוכלוסייה, אך חשיבותו גדולה במיוחד בקרב חולים כרוניים, ובכללם חולי סוכרת (16).


מכנה: חולי סוכרת בני 18 ומעלה

מונה: מספר המבוטחים במכנה אשר חוסנו בפועל נגד שפעת עונתית


הערות: תקופת המדד הינה מ'1 בספטמבר של שנת המדד ועד 28 בפברואר בשנה שאחריה, בחפיפה לעונת מתן החיסון.

תוצאות: שיעור חולי הסוכרת בני 18 ומעלה שקבלו חיסון נגד שפעת עלה מ-61.6% בשנת 2014 ל-63.6% בשנת 2015, וירד בשנים הבאות, לכדי 59.8% בשנת 2018. השיעור היה מעט נמוך יותר בקרב נשים (59.2%) מאשר בקרב גברים (60.5%). השיעור היה דומה בין השכבות החברתיות לכלליות השונות.

תרשים 165: שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בסוכרתיים לפי שנה, 2014-2018




תרשים 166: שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בסוכרתיים לפי גיל ומין, 2018



תרשים 167: שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בסוכרתיים

לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



**טבלה 105: שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בסוכרתיים
לפי גיל ומין – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

		גיל									
		18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	סה"כ	
זכר	מונה	649	1,497	5,495	17,633	38,700	56,009	31,067	8,398	159,448	
	מכנה	1,528	3,752	13,128	37,860	71,820	83,100	41,578	10,936	263,702	
	שיעור	42.5%	39.9%	41.9%	46.6%	53.9%	67.4%	74.7%	76.8%	60.5%	
נקבה	מונה	671	1,487	4,150	13,342	32,357	49,357	34,393	11,245	147,002	
	מכנה	1,491	3,560	9,155	26,847	61,041	78,920	50,839	16,544	248,397	
	שיעור	45.0%	41.8%	45.3%	49.7%	53.0%	62.5%	67.7%	68.0%	59.2%	
סה"כ	מונה	1,320	2,984	9,645	30,975	71,057	105,366	65,460	19,643	306,450	
	מכנה	3,019	7,312	22,283	64,707	132,861	162,020	92,417	27,480	512,099	
	שיעור	43.7%	40.8%	43.3%	47.9%	53.5%	65.0%	70.8%	71.5%	59.8%	

**טבלה 106: שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בסוכרתיים
לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

		מצב חברתי-כלכלי						
		1	2	3	4	סה"כ		
18-24	מונה	464	343	292	154	1,253		
	מכנה	865	866	768	379	2,878		
	שיעור	53.6%	39.6%	38.0%	40.6%	43.5%		
25-34	מונה	975	893	652	262	2,782		
	מכנה	2,004	2,293	1,883	724	6,904		
	שיעור	48.7%	38.9%	34.6%	36.2%	40.3%		
35-44	מונה	3,501	2,831	1,934	703	8,969		
	מכנה	6,696	6,851	5,538	1,878	20,963		
	שיעור	52.3%	41.3%	34.9%	37.4%	42.8%		
45-54	מונה	10,116	9,795	6,739	2,386	29,036		
	מכנה	17,849	20,892	16,644	5,779	61,164		
	שיעור	56.7%	46.9%	40.5%	41.3%	47.5%		
55-64	מונה	15,881	24,090	19,728	7,551	67,250		
	מכנה	26,092	46,282	39,530	14,374	126,278		
	שיעור	60.9%	52.1%	49.9%	52.5%	53.3%		
65-74	מונה	14,623	32,741	36,563	16,833	100,760		
	מכנה	21,473	52,374	56,676	24,616	155,139		
	שיעור	68.1%	62.5%	64.5%	68.4%	64.9%		
75-84	מונה	7,712	21,564	23,076	10,727	63,079		
	מכנה	10,793	31,847	32,440	14,038	89,118		
	שיעור	71.5%	67.7%	71.1%	76.4%	70.8%		
85+	מונה	1,808	6,032	7,173	3,918	18,931		
	מכנה	2,524	8,876	10,005	5,108	26,513		
	שיעור	71.6%	68.0%	71.7%	76.7%	71.4%		
סה"כ	מונה	55,080	98,289	96,157	42,534	292,060		
	מכנה	88,296	170,281	163,484	66,896	488,957		
	שיעור	62.4%	57.7%	58.8%	63.6%	59.7%		

שיעור קבלת חיסון נגד פניאומוקוק בחולי סוכרת בני 65-74

הגדרת המדד: שיעור חולי סוכרת אשר קיבלו חיסון נגד פניאומוקוק

רציונאל: חולים במחלות כרוניות בכל הגילאים, ובהם חולי סוכרת, מועדים יותר לזיהומים פניאומוקוקליים בהשוואה לאנשים בריאים. חולי סוכרת מצויים בסיכון מוגבר לתחלואה ותמותה מבקטרמיה (זיהום בדם) כתוצאה מחיידק הפניאומוקוק (17). לפי המלצות משרד הבריאות חולי סוכרת בוגרים אמורים לקבל מנה אחת של חיסון נגד זיהומים פניאומוקוקליים באמצעות התרכיב הפוליסכרידי (הכולל 23 זנים של החיידק, PPV23) (16). לחולים מעל גיל 65 אשר קיבלו מנה אחת או יותר של התרכיב הפוליסכרידי לפני גיל 65, מומלץ לתת מנה אחת אחרי שמלאו להם 65 שנים, אם מאז קבלת המנה האחרונה חלפו 5 שנים לפחות.

מכנה: חולי סוכרת בני 65-74


מונה: מספר המבוטחים במכנה אשר חוסנו נגד פניאומוקוק פעם אחת אחרי גיל 65 או בחמש השנים האחרונות

הערות: מדד זה מתייחס לחיסונים נגד זיהומים פניאומוקוקליים הניתנים באמצעות התרכיב הפוליסכרידי (הכולל 23 זנים של החיידק) בקרב אוכלוסיית חולי סוכרת בני 65-74.


תוצאות: שיעור חולי הסוכרת המבוגרים, בני 65-74, שקבלו חיסון נגד פניאומוקוק נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 84.4% ב-2018. השיעור היה מעט נמוך יותר בקרב נשים (83.0%) מאשר בקרב גברים (85.8%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (88.5%) היה מעט גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (84.6%).

תרשים 168: שיעור קבלת חיסון נגד פניאומוקוק בחולי סוכרת בני 65-74


לפי שנה, 2018-2014



תרשים 169: שיעור קבלת חיסון נגד פניאומוקוק בחולי סוכרת בני 65-74 לפי גיל ומין, 2018



תרשים 170: שיעור קבלת חיסון נגד פניאומוקוק בחולי סוכרת בני 65-74 לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 107: שיעור קבלת חיסון נגד פניאומוקוק בחולי סוכרת בני 65-74 לפי גיל ומין - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל		
		סה"כ	70-74	65-69
זכר	מונה	68,026	32,460	35,566
	מכנה	79,261	35,306	43,955
	שיעור	85.8%	91.9%	80.9%
	מונה	62,277	30,655	31,622
נקבה	מכנה	75,040	34,643	40,397
	שיעור	83.0%	88.5%	78.3%
	מונה	130,303	63,115	67,188
	מכנה	154,301	69,949	84,352
	שיעור	84.4%	90.2%	79.7%

טבלה 108: שיעור קבלת חיסון נגד פניאומוקוק בחולי סוכרת בני 65-74 לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי					
	סה"כ	4	3	2	1
65-69	מונה	9,434	22,061	22,959	9,762
	מכנה	11,113	27,907	29,367	12,293
	שיעור	84.9%	79.1%	78.2%	79.4%
70-74	מונה	8,134	19,385	22,486	10,428
	מכנה	8,727	21,595	25,117	11,564
	שיעור	93.2%	89.8%	89.5%	90.2%
סה"כ	מונה	17,568	41,446	45,445	20,190
	מכנה	19,840	49,502	54,484	23,857
	שיעור	88.5%	83.7%	83.4%	84.6%

סוכרת בקרב בני 2-17

רציונאל: התחלואה בסוכרת בקרב אוכלוסיית הילדים והנוער היא במרבית המקרים בסוכרת מסוג 1. עם זאת, במקביל לעליה בשיעור השמנת היתר בקרב ילדים ובני נוער נצפית גם עליה במקרי סוכרת מסוג 2. על פי נתוני רשם הסוכרת של המלכ"ם, היארעות סוכרת מסוג 1 בקרב ילדים ונוער (גילאים 0-17) עלתה מ־8 מקרים ל־100,000 בשנת 1997 ל־13.8 מקרים ל־100,000 בשנת 2015. בשנה זו אובחנו 382 מקרים חדשים של סוכרת מסוג 1 בקרב בני 0-17 (18).

לסוכרת בגיל הילדות והנוער מאפיינים מיוחדים הכוללים בין היתר שינוי ברגישות לאינסולין עם ההתבגרות והגדילה, משטרי אכילה ופעילות גופנית פחות סדירים, היכולת המשתנה לטיפול עצמי, הצורך בשיתוף המשפחה בטיפול והצורך לתת מענה לשעות בהן הילד מצוי בבית הספר או במעון. כדי להבטיח מענה הולם לצרכים המיוחדים הללו ממליץ האיגוד האמריקאי לסוכרת שהטיפול בילדים ובני נוער יעשה במסגרת מרפאות סוכרת ייעודיות, רב־תחומיות. במסגרת זו יכללו בנוסף לפן הרפואי גם חינוך של הילד והמשפחה לטיפול עצמי בסוכרת, הדרכה של תזונאית והתייחסות לצד הרגשי והפסיכולוגי של המחלה. איזון מיטבי של רמות הגלוקוז בדמם של חולי סוכרת חשוב למניעת סיבוכים בטווח הקצר (רמות גלוקוז גבוהות, חמצת מטבולית, היפוגליקמיה) ובטווח הארוך - פגיעה מיקרר ומאקרו־ואסקולארית (המתבטאת במחלות לב וכלי דם, עיוורון, פגיעה בעצבים פריפריים ואי ספיקת כליות). המעקב אחר רמת הגלוקוז בדם מבוצע הן ברמה היומיומית על־ידי מדידה עצמית של החולה, והן אחת לתקופה על־ידי בדיקת המוגלובין מסוכרר (HbA1c), המשקפת את רמת הגלוקוז הממוצעת בדם בשלושת החודשים שקדמו לבדיקה. בדומה למבוגרים, גם בילדים יש למצוא את האיזון בין השאיפה להגיע לרמות גלוקוז בדם הקרובות לערך התקין ובין המגבלה של הסיכון להיפוגליקמיה. על פי המלצות ה־ADA רמת ה־HbA1c המגדירה איזון סוכרת טוב באוכלוסיית החולים הצעירים מגיל 18 היא 7.5%. רמת HbA1c מעל 9% מעידה על מחלה בלתי־מאוזנת (6).

בדומה לחולי סוכרת מבוגרים, ילדים חולי סוכרת מצויים בסיכון מוגבר למחלת השפעת ולסיבוכיה בהשוואה לאנשים בריאים. משרד הבריאות ממליץ על חיסון שנתי נגד מחלת השפעת לכלל האוכלוסייה מגיל 6 חודשים ומעלה, אך חשיבותו גדולה במיוחד בקרב חולים כרוניים, ובכללם ילדים חולי סוכרת (16).

מדדים:

- ✓ שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב בני 2-17
- ✓ שיעור המבקרים במרפאת סוכרת ילדים בקרב חולי סוכרת בני 2-17
- ✓ שיעור הביצוע של בדיקת HbA1c בחולי סוכרת בני 2-17
- ✓ שיעור בעלי רמת HbA1c גבוהה מ־9% בחולי סוכרת בני 2-17
- ✓ שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בחולי סוכרת בני 2-17

שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב בני 2-17

הגדרת המדד: שיעור המבוטחים בני 2-17 שהוגדרו כחולי סוכרת על פי רכישת שלושה מרשמים (בחודשים שונים) של תרופות ממשפחת האינסולין בשנה הקודמת לשנת המדד.


מכנה: כלל המבוטחים בני 2-17.

מונה: מספר המבוטחים במכנה אשר רכשו לפחות שלושה מרשמים (בחודשים שונים) של תרופות ממשפחת האינסולין בשנה הקודמת לשנת המדד.

קיימת הפרדה בין מדדי הסוכרת המתייחסים למבוגרים (מגיל 18 ואילך) ולאוכלוסיית הילדים והנוער (גילאים 2-17). לאוכלוסייה זו מאפיינים מיוחדים בין היתר מאחר ובגיל הילדות והנעורים מדובר במרבית המקרים בסוכרת מסוג 1 המחייבת טיפול תרופתי קבוע באופן בלעדי באינסולין. לכן הגדרת החולי בקבוצת גיל הילדות והנעורים מתבססת על רכישת תרופות ממשפחת האינסולין בלבד, בלי שיש צורך להסמך על בדיקות מעבדה. הגדרת אוכלוסיית החולים מתבססת על ערכים מהשנה שקדמה לשנת המדד. זאת כדי שהגדרות כל מדדי המשנה, הבודקים את איכות הטיפול במחלת הסוכרת, יהיו מבוססות על ההנחה שהמטופלים היו מוגדרים כחולי סוכרת במשך כל שנת המדד. מאחר והגדרת האוכלוסייה נסמכת על נתונים מהשנה הקודמת לשנת המדד, ניתן להכליל בה פעוטות מגיל שנתיים ומעלה בלבד.

תוצאות: שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב ילדים ובני נוער (בני 2-17) נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 0.1% ב-2018. השיעור היה דומה בקרב בנות ובנים. השיעור היה דומה בין השכבות החברתיות-כלכליות השונות.

תרשים 171: שיעור הימצאות סוכרת בקרב בני 2-17 לפי שנה, 2014-2018



תרשים 172: שיעור הימצאות סוכרת בקרב בני 2-17 לפי גיל ומין, 2018



תרשים 173: שיעור הימצאות סוכרת בקרב בני 2-17 לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 109: שיעור הימצאות סוכרת בקרב בני 2-17 לפי גיל ומין - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל				
		2-4	5-9	10-14	15-19	סה"כ
זכר	מונה	39	254	640	589	1,522
	מכנה	259,517	404,413	369,150	200,925	1,234,005
	שיעור	0.0%	0.1%	0.2%	0.3%	0.1%
נקבה	מונה	38	284	654	521	1,497
	מכנה	245,302	385,189	350,109	190,251	1,170,851
	שיעור	0.0%	0.1%	0.2%	0.3%	0.1%
סה"כ	מונה	77	538	1,294	1,110	3,019
	מכנה	504,819	789,602	719,259	391,176	2,404,856
	שיעור	0.0%	0.1%	0.2%	0.3%	0.1%

טבלה 110: שיעור הימצאות סוכרת בקרב בני 2-17 לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		מצב חברתי-כלכלי				
		1	2	3	4	סה"כ
2-4	מונה	23	12	26	13	74
	מכנה	128,160	141,372	143,008	65,552	478,092
	שיעור	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
5-9	מונה	123	165	133	89	510
	מכנה	204,839	210,858	225,017	112,076	752,790
	שיעור	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
10-14	מונה	333	349	359	193	1,234
	מכנה	193,923	191,501	197,932	104,408	687,764
	שיעור	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
15-19	מונה	271	324	294	163	1,052
	מכנה	113,878	107,525	100,484	51,472	373,359
	שיעור	0.2%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%
סה"כ	מונה	750	850	812	458	2,870
	מכנה	640,800	651,256	666,441	333,508	2,292,005
	שיעור	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%

שיעור המבקרים במרפאת סוכרת ילדים בקרב חולי סוכרת בני 2-17

הגדרת המדד: שיעור חולי סוכרת בני 2-17 אשר ביקרו במרפאת סוכרת ילדים לפחות פעם אחת בשנת המדד.


מכנה: חולי סוכרת בני 2-17

מונה: מספר המבוטחים במכנה אשר ביקרו במרפאת סוכרת ילדים בשנת המדד.


הערות: לאור המורכבות של הניטור והטיפול בסוכרת בגיל הילדות והנעורים, מומלץ שהללו יבוצעו על ידי צוות רב תחומי המרוכז במרפאות סוכרת ייעודיות. המדד המתייחס לשיעור המבקרים במרפאת סוכרת ילדים (בקהילה או בבתי החולים) מגלם בתוכו את רוב מדדי הטיפול בסוכרת. זאת, מתוך הנחה שבמרפאות אלו ניתנים טיפול וניטור מיטביים ומקיפים ולכן ניתן לראות בהם "קופסא שחורה" מבחינת מדידת איכות הטיפול.

תוצאות: שיעור המבקרים במרפאת סוכרת ילדים בקרב חולי סוכרת בני 2-17 נותר יציב בין השנים 2014-2018 ועמד על 86.8% ב-2018. השיעור היה דומה בקרב בנות ובנים. השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה ביותר (83.1%) היה נמוך בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (92.4%).


תרשים 174: שיעור המבקרים במרפאת סוכרת ילדים לפי שנה, 2014-2018



תרשים 175: שיעור המבקרים במרפאת סוכרת ילדים לפי גיל ומין, 2018



תרשים 176: שיעור המבקרים במרפאת סוכרת ילדים לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 111: שיעור המבקרים במרפאת סוכרת ילדים לפי גיל ומין - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

	גיל					
	סה"כ	15-19	10-14	5-9	2-4	
זכר	1,326	504	554	232	36	מונה
	1,522	589	640	254	39	מכנה
	87.1%	85.6%	86.6%	91.3%	92.3%	שיעור
נקבה	1,294	438	565	255	36	מונה
	1,497	521	654	284	38	מכנה
	86.4%	84.1%	86.4%	89.8%	94.7%	שיעור
סה"כ	2,620	942	1,119	487	72	מונה
	3,019	1,110	1,294	538	77	מכנה
	86.8%	84.9%	86.5%	90.5%	93.5%	שיעור

טבלה 112: שיעור המבקרים במרפאת סוכרת ילדים לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי					
סה"כ	4	3	2	1	
69	13	24	10	22	מונה
74	13	26	12	23	מכנה
93.2%	100.0%	92.3%	83.3%	95.7%	שיעור
461	81	121	148	111	מונה
510	89	133	165	123	מכנה
90.4%	91.0%	91.0%	89.7%	90.2%	שיעור
1,072	175	314	305	278	מונה
1,234	193	359	349	333	מכנה
86.9%	90.7%	87.5%	87.4%	83.5%	שיעור
891	154	252	273	212	מונה
1,052	163	294	324	271	מכנה
84.7%	94.5%	85.7%	84.3%	78.2%	שיעור
2,493	423	711	736	623	מונה
2,870	458	812	850	750	מכנה
86.9%	92.4%	87.6%	86.6%	83.1%	שיעור

שיעור הביצוע של בדיקת HbA1c בחולי סוכרת בני 17-2


הגדרת המדד: שיעור חולי סוכרת בני 17-2 שביצעו בדיקת HbA1c לפחות פעם אחת בשנת המדד.

מכנה: חולי סוכרת בני 17-2

מונה: מספר המבוטחים במכנה אשר ביצעו בדיקת HbA1c בשנת המדד.

תוצאות: שיעור הביצוע של בדיקת HbA1c בחולי סוכרת בני 17-2 נותר יציב בין השנים 2014-2018, ועמד על 77.4% ב-2018. השיעור היה דומה בקרב בנות ובנים. השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (82.7%) היה גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (67.9%).


תרשים 177: שיעור ביצוע בדיקת HbA1c לפי שנה, 2014-2018



תרשים 178: שיעור ביצוע בדיקת HbA1c לפי גיל ומין, 2018



תרשים 179: שיעור ביצוע בדיקת HbA1c לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 113: שיעור ביצוע בדיקת HbA1c לפי גיל ומין -

מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

	גיל					
	סה"כ	15-19	10-14	5-9	2-4	
זכר	1,169	471	492	180	26	מונה
	1,522	589	640	254	39	מכנה
	76.8%	80.0%	76.9%	70.9%	66.7%	שיעור
	1,169	431	507	208	23	מונה
נקבה	1,497	521	654	284	38	מכנה
	78.1%	82.7%	77.5%	73.2%	60.5%	שיעור
	2,338	902	999	388	49	מונה
	3,019	1,110	1,294	538	77	מכנה
סה"כ	77.4%	81.3%	77.2%	72.1%	63.6%	שיעור

טבלה 114: שיעור ביצוע בדיקת HbA1c לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי					
	1	2	3	4	סה"כ
2-4	מונה	19	8	13	7
	מכנה	23	12	26	13
	שיעור	82.6%	66.7%	50.0%	53.8%
					63.5%
5-9	מונה	99	116	91	55
	מכנה	123	165	133	89
	שיעור	80.5%	70.3%	68.4%	61.8%
					70.8%
10-14	מונה	270	283	261	131
	מכנה	333	349	359	193
	שיעור	81.1%	81.1%	72.7%	67.9%
					76.6%
15-19	מונה	232	269	234	118
	מכנה	271	324	294	163
	שיעור	85.6%	83.0%	79.6%	72.4%
					81.1%
סה"כ	מונה	620	676	599	311
	מכנה	750	850	812	458
	שיעור	82.7%	79.5%	73.8%	67.9%
					76.9%

שיעור בעלי רמת HbA1c גבוהה מ־9% בחולי סוכרת בני 2-17


הגדרת המדד: שיעור חולי סוכרת בני 2-17 עם רמת HbA1c גבוהה מ־9%

מכנה: חולי סוכרת בני 2-17, שביצעו בדיקת HbA1c בשנת המדד

מונה: מספר המבוטחים במכנה אשר התוצאה של בדיקת ה־HbA1c האחרונה שלהם גבוהה מ־9%.

תוצאות: שיעור הילדים ובני הנוער (בני 2-17) שמחלתם נחשבת בלתי מאוזנת (בעלי רמת HbA1c גבוהה מ־9%) ירד בין השנים 2014-2018, מ־37.1% בשנת 2014 ל־34.0% בשנת 2018. השיעור היה דומה בקרב בנות ובנים. השיעור היה גבוה פי 3.1 בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (46.1%) בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (14.8%).

תרשים 180: שיעור בעלי רמת HbA1c גבוהה מ-9% לפי שנה, 2014-2018



תרשים 181: שיעור בעלי רמת HbA1c גבוהה מ-9% לפי גיל ומין, 2018



תרשים 182: שיעור בעלי רמת HbA1c גבוהה מ-9% לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



**טבלה 115: שיעור בעלי רמת HbA1c גבוהה מ-9%
לפי גיל ומין – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

		גיל				
		2-4	5-9	10-14	15-19	סה"כ
זכר	מונה	4	46	195	146	391
	מכנה	26	180	492	471	1,169
	שיעור	15.4%	25.6%	39.6%	31.0%	33.4%
נקבה	מונה	7	50	194	154	405
	מכנה	23	208	507	431	1,169
	שיעור	30.4%	24.0%	38.3%	35.7%	34.6%
סה"כ	מונה	11	96	389	300	796
	מכנה	49	388	999	902	2,338
	שיעור	22.4%	24.7%	38.9%	33.3%	34.0%

**טבלה 116: שיעור בעלי רמת HbA1c גבוהה מ-9%
לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

		מצב חברתי-כלכלי				
		1	2	3	4	סה"כ
2-4	מונה	9	1	0	1	11
	מכנה	19	8	13	7	47
	שיעור	47.4%	12.5%	0.0%	14.3%	23.4%
5-9	מונה	36	32	12	3	83
	מכנה	99	116	91	55	361
	שיעור	36.4%	27.6%	13.2%	5.5%	23.0%
10-14	מונה	144	116	68	25	353
	מכנה	270	283	261	131	945
	שיעור	53.3%	41.0%	26.1%	19.1%	37.4%
15-19	מונה	97	99	61	17	274
	מכנה	232	269	234	118	853
	שיעור	41.8%	36.8%	26.1%	14.4%	32.1%
סה"כ	מונה	286	248	141	46	721
	מכנה	620	676	599	311	2,206
	שיעור	46.1%	36.7%	23.5%	14.8%	32.7%

שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בחולי סוכרת בני 17-2

הגדרת המדד: שיעור חולי סוכרת בני 17-2 אשר קיבלו חיסון נגד שפעת עונתית


מכנה: חולי סוכרת בני 17-2

מונה: מספר המבוטחים במכנה אשר חוסנו בפועל נגד שפעת עונתית


הערות: תקופת המדד הינה מ־1 בספטמבר של שנת המדד ועד 28 בפברואר בשנה שאחריה, בחפיפה לעונת מתן החיסון לשפעת.

תוצאות: שיעור הילדים ובני הנוער חולי הסוכרת אשר קבלו חיסון נגד שפעת עלה מ־49.8% בשנת 2014 ל־54.8% בשנת 2015, אך בשנים 2016-2018 נצפתה ירידה בשיעור המחוסנים, לכדי 41.1% בשנת 2018. השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב בנות (42.9%) מאשר בקרב בנים (39.4%). השיעור היה גבוה כמעט פי 1.5 בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (50.0%) בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (36.0%).


תרשים 183: שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בילדים סוכרתיים לפי שנה, 2014-2018



תרשים 184: שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בילדים סוכרתיים לפי גיל ומין, 2018



תרשים 185: שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בילדים סוכרתיים לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 117: שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בילדים סוכרתיים לפי גיל ומין - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל				
		סה"כ	15-19	10-14	5-9	2-4
זכר	מונה	599	221	254	115	9
	מכנה	1,522	589	640	254	39
	שיעור	39.4%	37.5%	39.7%	45.3%	23.1%
נקבה	מונה	642	234	264	124	20
	מכנה	1,497	521	654	284	38
	שיעור	42.9%	44.9%	40.4%	43.7%	52.6%
סה"כ	מונה	1,241	455	518	239	29
	מכנה	3,019	1,110	1,294	538	77
	שיעור	41.1%	41.0%	40.0%	44.4%	37.7%


**טבלה 118: שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בילדים סוכרתיים
לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

מצב חברתי-כלכלי					
	סה"כ	4	3	2	1
2-4	מונה	29	6	9	6
	מכנה	74	13	26	12
	שיעור	39.2%	46.2%	34.6%	50.0%
					34.8%
5-9	מונה	223	37	49	69
	מכנה	510	89	133	165
	שיעור	43.7%	41.6%	36.8%	41.8%
					55.3%
10-14	מונה	489	67	112	147
	מכנה	1,234	193	359	349
	שיעור	39.6%	34.7%	31.2%	42.1%
					48.9%
15-19	מונה	426	55	108	127
	מכנה	1,052	163	294	324
	שיעור	40.5%	33.7%	36.7%	39.2%
					50.2%
סה"כ	מונה	1,167	165	278	349
	מכנה	2,870	458	812	850
	שיעור	40.7%	36.0%	34.2%	41.1%
					50.0%

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 8th edn [Internet]. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation. 2017 [cited 2019 Sep 10]. Available from: <http://www.diabetesatlas.org>
2. משרד הבריאות המרכז הלאומי לבקרת מחלות. סקר בריאות לאומי בישראל 2013-2015 [Internet]. 2017 [cited 2019 Sep 10]. Available from: https://www.health.gov.il/publicationsfiles/inhis_3.pdf
3. 2016 [Internet]. 2018. Available from: https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2018/363/05_18_363b.pdf
4. National Diabetes Information Clearinghouse. DCCT and EDIC : The Diabetes Control and Complications Trial and Follow-up Study [Internet]. 2008. Available from: <file:///C:/Users/leahab/Downloads/DCCT-EDIC.pdf>
5. Hayes AJ, Leal J, Gray AM, Holman RR, Clarke PM. UKPDS Outcomes Model 2: A new version of a model to simulate lifetime health outcomes of patients with type 2 diabetes mellitus using data from the 30 year united kingdom prospective diabetes Study: UKPDS 82. Diabetologia. 2013;56(9):1925–33.
6. American Diabetes Association (ADA). Standard of medical care in diabetes – 2017. Diabetes Care. 2017;40 (sup 1)(January):s4–128.
7. The ADVANCE Collaborative Group. Intensive Blood Glucose Control and Vascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. N Engl J Med [Internet]. 2008 Jun 12;358(24):2560–72. Available from: <https://doi.org/10.1056/NEJMoa0802987>
8. Duckworth W, Abraira C, Moritz T, Reda D, Emanuele N, Reaven PD, et al. Glucose Control and Vascular Complications in Veterans with Type 2 Diabetes. N Engl J Med [Internet]. 2009 Jan 8;360(2):129–39. Available from: <https://doi.org/10.1056/NEJMoa0808431>
9. Effects of Intensive Glucose Lowering in Type 2 Diabetes. N Engl J Med [Internet]. 2008 Jun 12;358(24):2545–59. Available from: <https://doi.org/10.1056/NEJMoa0802743>
10. פרופ' איתמר חז דעמ. קביעת יעד מטרה לאיוון סוכרת בחולה הבוגד. The medical group; 2015.
11. Skaat A, Chetrit A, Belkin M, Kinori M, Kalter-Leibovici O. Time Trends in the Incidence and Causes of Blindness in Israel. Am J Ophthalmol [Internet]. 2012;153(2):214–221.e1. Available from: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002939411006775>
12. משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. ראייה ועיוורון נתונים סטטיסטיים 2017. Available from: <http://www.molsa.gov.il/Populations/Disabilities/Blindness/VisionAndBlindness/StatisticalData/Pages/StatisticalData.aspx>
13. נחמה גולדברג, מרים אבורבה צח, משרד הבריאות המרכז הלאומי לבקרת מחלות. סיבות מוות. מובילות 2000-2014. 2017.
14. החברה לחקר מניעה וטיפול בטרשת עורקים, האיגוד הקרדילוגי בישראל, בישראל, המשפחה אר. [Internet]. [cited 2017 Dec 24]. Available from: <http://www.israel-surgery.org.il/beriatric-position-paper0117.pdf>

15. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, Casey DE, Collins KJ, Dennison Himmelfarb C, et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. J Am Coll Cardiol. 2018 May;71(19):e127 LP-e248.
16. האגף לאפידמיולוגיה משרד הבריאות. תדריך חיסונים 1999 [Internet]. 2015 [cited 2017 Dec 24]. Available from: https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/300_TUB.pdf
17. Pneumonia Can Be Prevented—Vaccines Can Help [Internet]. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2014. Available from: <http://www.cdc.gov/Features/Pneumonia/>
18. Ministry of Health I. 2015 לשנת 0-17 למחצית הראשונה לסוכרת בגילאי 0-17 לשנת 2015. Isr Cent Dis Control [Internet]. 2017; Available from: https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/diabetes_0-17_2015.pdf.pdf

שימוש בתרופות אנטיביוטיות



היקף השימוש בתרופות אנטיביוטיות סיסטמיות, ל-1000 איש, ליום

הגדרת המדד: היקף השימוש בתרופות אנטיביוטיות סיסטמיות, מבוטא ב-DDD ל-1000 איש, ליום.

רציונאל: תרופות אנטיביוטיות הן מהתרופות הנפוצות ביותר ברפואה בת זמננו, אך יעילותן של התרופות האנטיביוטיות הולכת ופוחתת עם השנים עקב התפשטותם של זני חיידקים עמידים. התפתחות עמידות לתרופות אנטיביוטיות תלויה בהיקף ואופן השימוש בתרופות אלו. שימוש מושכל ומופחת באנטיביוטיקה עשוי לצמצם את תופעת העמידות (1). לכן חיוני לעקוב אחר דפוסי השימוש בתרופות אנטיביוטיות ואחר הופעתם והתפשטותם של זנים עמידים.


מכנה: כלל המבוטחים, מבוטא באלפים.

מונה: סכום ה-DDD (Defined Daily Doses, מנות יומיות מוגדרות) של כל תכשירי האנטיביוטיקה במתן סיסטמי אשר הונפקו בפועל בשנת המדד מחולק ב-365 ימים. התכשירים הנכללים במונה הם מקבוצת הקוד J01 (תכשירים אנטי בקטריאליים לשימוש סיסטמי) עפ"י סיווג מ-ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) שאימץ ארגון הבריאות העולמי.


הערות: ה-DDD, מנה יומית מוגדרת, הוא מינון התחזוקה היומי הממוצע המשוער עבור טיפול תרופתי שניתן למבוגרים בהתוויה העיקרית שלו. ה-DDD נקבע ע"י ארגון הבריאות העולמי ומשמש לצורך הערכת הצריכה הכוללת של תרופות הכלולות בסיווג ה-ATC. הגדרת המדד אומצה מה-OECD על מנת לאפשר השוואה לנתונים בינלאומיים. יצוין, כי על פי הגדרת המדד של ה-OECD, כימות הצריכה מתבסס על מתן מרשם לתכשירי אנטיביוטיקה, בעוד שבמסגרת התכנית בוצע החישוב בהתבסס על ניפוקים בפועל.

תוצאות: היקף השימוש בתרופות אנטיביוטיות ירד בין השנים 2014-2018, מ-20.8 ל-19.1 DDD ל-1000 איש ליום. היקף השימוש היה גבוה יותר בקרב נשים לעומת גברים בכל קבוצות הגיל (22.4 לעומת 15.7 DDD ל-1000 איש ליום, בהתאמה). בקבוצות הגיל השונות בקרב האוכלוסיה הבוגרת, היקף השימוש היה גבוה יותר ככל שהמצב החברתי-כלכלי היה נמוך יותר (טבלה 120).


תרשים 186: היקף השימוש בתרופות אנטיביוטיות סיסטמיות, DDD ל-1000 איש ליום, לפי שנה, 2014-2018



תרשים 187: היקף השימוש בתרופות אנטיביוטיות סיסטמיות, DDD ל-1000 איש ליום, לפי גיל ומין, 2018



תרשים 188: היקף השימוש בתרופות אנטיביוטיות סיסטמיות, DDD ל-1000 איש ליום, לפי מצב חברתי-כלכלי וקבוצות גיל, 2018



**טבלה 119: היקף השימוש בתרופות אנטיביוטיות סיסטמיות, DDD
ל-1000 איש ליום, לפי גיל ומין – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

		גיל			
		0-19	20-64	65+	סה"כ
זכר	מונה	5,487,233	12,793,810	5,119,415	23,400,458
	מכנה	1,528,169	2,113,842	435,306	4,077,317
	היקף שימוש	9.8	16.6	32.2	15.7
	היקף שימוש	9.8	16.6	32.2	15.7
נקבה	מונה	5,627,845	21,031,648	7,912,334	34,571,827
	מכנה	1,455,670	2,224,075	549,658	4,229,403
	היקף שימוש	10.6	25.9	39.4	22.4
	היקף שימוש	10.6	25.9	39.4	22.4
סה"כ	מונה	11,115,079	33,825,457	13,031,749	57,972,285
	מכנה	2,983,839	4,337,917	984,964	8,306,720
	היקף שימוש	10.2	21.4	36.2	19.1
	היקף שימוש	10.2	21.4	36.2	19.1

**טבלה 120: היקף השימוש בתרופות אנטיביוטיות סיסטמיות, DDD
ל-1000 איש ליום, לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

		מצב חברתי-כלכלי				
		1	2	3	4	סה"כ
0-19	מונה	3,226,685	3,216,353	2,876,108	1,154,747	10,473,892
	מכנה	828,954	816,902	801,935	389,707	2,837,498
	היקף השימוש	10.7	10.8	9.8	8.1	10.1
	היקף השימוש	10.7	10.8	9.8	8.1	10.1
20-64	מונה	6,687,700	10,285,460	10,580,285	4,747,193	32,300,639
	מכנה	822,203	1,278,249	1,373,940	681,757	4,156,149
	היקף השימוש	22.3	22.0	21.1	19.1	21.3
	היקף השימוש	22.3	22.0	21.1	19.1	21.3
65+	מונה	1,415,066	3,795,243	4,735,764	2,606,672	12,552,744
	מכנה	93,808	297,157	363,945	195,913	950,823
	היקף השימוש	41.3	35.0	35.7	36.5	36.2
	היקף השימוש	41.3	35.0	35.7	36.5	36.2
סה"כ	מונה	11,329,450	17,297,056	18,192,158	8,508,612	55,327,276
	מכנה	1,744,965	2,392,308	2,539,820	1,267,377	7,944,470
	היקף השימוש	17.8	19.8	19.6	18.4	19.1
	היקף השימוש	17.8	19.8	19.6	18.4	19.1

פרופורציית השימוש בתרופות אנטיביוטיות מקו שני מתוך סך התרופות האנטיביוטיות

הגדרת המדד: פרופורציית השימוש בתרופות אנטיביוטיות מסוג צפלוספורינים וקווינלונים, מתוך סך התרופות האנטיביוטיות.

רציונאל: תרופות אנטיביוטיות מקבוצות הצפלוספורינים והקווינלונים מצויות בשימוש פומי שכיח ברפואת הקהילה, והן בעלות טווח כיסוי מיקרוביולוגי רחב ביחס לתרופות אנטיביוטיות אחרות המשמשות בקהילה. התפתחות עמידות לתרופות אנטיביוטיות תלויה במידת השימוש ובאופן השימוש באנטיביוטיקה. שימוש מושכל ומופחת בתרופות אנטיביוטיות רחבות-טווח עשוי לצמצם את היקף תופעת העמידות (2,1). מעקב אחר מידת השימוש בתרופות אנטיביוטיות רחבות-טווח עשוי לסייע בהנחלת השימוש המושכל בהן.


מכנה: סכום ה־DDD (Defined Daily Doses, מנות יומיות מוגדרות) של כל תכשירי האנטיביוטיקה במתן סיסטמי אשר הונפקו בפועל בשנת המדד.

מונה: סכום ה־DDD של אנטיביוטיקות קו שני אשר הונפקו בשנת המדד. אנטיביוטיקות קו שני הוגדרו ע"י ה־OECD כתכשירים ממשפחות הצפלוספורינים, קרבפנמים וקווינלונים (קבוצות קוד J01D ו־J01M עפ"י סיווג ה־ATC). תכשירים אלו אינם אמורים לשמש לטיפול אמפירי ראשוני במרבית הזיהומים המטופלים בקהילה.


הערות: ה־DDD, מנה יומית מוגדרת, הוא מינון התחזוקה היומי הממוצע המשוער עבור טיפול תרופתי שניתן למבוגרים בהתוויה העיקרית שלו. ה־DDD נקבע ע"י ארגון הבריאות העולמי ומשמש לצורך הערכת הצריכה הכוללת של תרופות הכלולות בסיווג ה־ATC. הגדרת המדד אומצה מה־OECD על מנת לאפשר השוואה לנתונים בינלאומיים. יצוין, כי על פי הגדרת המדד של ה־OECD, כימות הצריכה מתבסס על מתן מרשם לתכשירי אנטיביוטיקה, בעוד שבמסגרת הדו"ח בוצע החישוב בהתבסס על ניפוקים בפועל.

תוצאות: פרופורציית השימוש בתרופות אנטיביוטיות מסוג צפלוספורינים וקווינלונים, מתוך סך התרופות האנטיביוטיות עלה בין השנים 2014-2018, מ־22.1% בשנת 2014 ל־25.2% בשנת 2018. השיעור היה גבוה יותר בקרב נשים (26.9%) מאשר בקרב גברים (22.8%). בקרב האוכלוסייה המבוגרת (גיל 65 ומעלה) פרופורציית השימוש באנטיביוטיקות קו שני היתה גבוהה יותר ככל שהמצב החברתי־כלכלי היה גבוה יותר (טבלה 122).


תרשים 189: פרופורציית השימוש בתרופות אנטיביוטיות מקו שני (צבולספורינים וקווינולונים) מתוך סך התרופות האנטיביוטיות, לפי שנה, 2014-2018



תרשים 190: פרופורציית השימוש בתרופות אנטיביוטיות מקו שני (צבולספורינים וקווינולונים) מתוך סך התרופות האנטיביוטיות, לפי גיל ומין, 2018



תרשים 191: פרופורציית השימוש בתרופות אנטיביוטיות מקו שני (צבולספורינים וקווינולונים) מתוך סך התרופות האנטיביוטיות, לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 121: פרופורציית השימוש בתרופות אנטיביוטיות מקו שני (צפלוספורינים וקווינולונים) מתוך סך התרופות האנטיביוטיות, לפי גיל ומין – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018


גיל					
		סה"כ			
		0-19	20-64	65+	סה"כ
זכר	מונה	472,957	2,922,905	1,949,795	5,345,656
	מכנה	5,487,233	12,793,780	5,119,445	23,400,458
	שיעור	8.6%	22.8%	38.1%	22.8%
נקבה	מונה	680,212	5,705,669	2,904,959	9,290,841
	מכנה	5,627,845	21,031,648	7,912,334	34,571,827
	שיעור	12.1%	27.1%	36.7%	26.9%
סה"כ	מונה	1,153,169	8,628,574	4,854,754	14,636,497
	מכנה	11,115,079	33,825,427	13,031,779	57,972,285
	שיעור	10.4%	25.5%	37.3%	25.2%

טבלה 122: פרופורציית השימוש בתרופות אנטיביוטיות מקו שני (צפלוספורינים וקווינולונים) מתוך סך התרופות האנטיביוטיות, לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי					
	1	2	3	4	סה"כ
0-19	מונה	347,398	323,016	290,469	120,710
	מכנה	3,226,685	3,216,353	2,876,108	1,154,747
	שיעור	10.8%	10.0%	10.1%	10.5%
20-64	מונה	1,699,991	2,603,870	2,684,409	1,207,124
	מכנה	6,687,700	10,285,460	10,580,255	4,747,198
	שיעור	25.4%	25.3%	25.4%	25.4%
65+	מונה	553,401	1,454,400	1,753,379	906,845
	מכנה	1,415,066	3,795,243	4,735,794	2,606,672
	שיעור	39.1%	38.3%	37.0%	34.8%
סה"כ	מונה	2,600,791	4,381,285	4,728,257	2,234,679
	מכנה	11,329,450	17,297,056	18,192,158	8,508,617
	שיעור	23.0%	25.3%	26.0%	26.3%

1. Michael CA, Dominey-Howes D, Labbate M. The antimicrobial resistance crisis: causes, consequences, and management. Front public Heal [Internet]. 2014 Sep 16;2:145. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25279369>
2. התוכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל. הטיפול באנטיביוטיקה ברפואת הקהילה בישראל בראי התוכנית הלאומית למדדי איכות. הרפואה. 158;2019.

בריאות נפש



מדדי בריאות הנפש

רקע

חוק ביטוח בריאות ממלכתי שנחקק ב־1994 העביר את האחריות למרבית שרותי הבריאות לקופות החולים (לצד הסדרת זכותם של כלל תושבי מדינת ישראל לקבל שרותי בריאות והגדרת סל שירותי הבריאות), אך לא כלל את שירותי בריאות הנפש (כמו גם הגריאטריה והרפואה המונעת), שנותרו באותה עת מחוץ לסל השירותים שבאחריות קופות החולים. ביולי 2015 נכנסה לתוקף הרפורמה בשירותי בריאות הנפש, אשר העבירה את האחריות הביטוחית על מתן שירותי בריאות הנפש ממשדד הבריאות לקופות החולים (1).

בהמשך לכך, נוסחו והוטמעו במסגרת התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה, מספר מדדים שנועדו לשקף את איכות הטיפול בתחום זה. בשלב ראשון, נבחרו שני תחומים: רצף הטיפול הפסיכיאטרי (בתי־חולים-קהילה), וניטור תחלואה גופנית באנשים עם מחלות נפש קשה.

שיעור המפגשים הטיפוליים עם אנשי בריאות הנפש בקהילה תוך 14 יום משחרור מאשפוז פסיכיאטרי ממושך

הגדרת המדד: שיעור המקרים בהם התקיים מפגש טיפולי עם אנשי בריאות הנפש בקהילה תוך 14 ימים מהשחרור מאשפוז פסיכיאטרי שמשכו בין 14 ל-365 ימים, בקרב בני 18 ומעלה.

רציונאל: מעקב רפואי לאחר אירוע רפואי אקוטי, כדוגמת אשפוז, הינו פרקטיקה מקובלת, והודגם כמפחית את הסיכון לתוצאי בריאות שליליים, גם בתחום בריאות הנפש. שיפור רצף הטיפול בין בתי החולים לקהילה תורם להפחתת הסיבוכים בתקופה הפוסט-אקוטית, תקופה המהווה גם חלון הזדמנויות לחיזוק הקשר בין המטופל למטפלים בקהילה, ולשיפור ההיענות להמשך הטיפול (2). בקרב מטופלים עם מחלות נפש, נמצא כי מעקב יזום חוזר בקהילה ומפגש פנים-אל-פנים עם המטופל יכולים להפחית את שיעור ניסיונות ההתאבדות (3) והאשפוזים הפסיכיאטריים החוזרים (4).


מכנה: מבוטחים בני 18 ומעלה אשר השתחררו מאשפוז פסיכיאטרי ממושך (שמשכו בין 14 ל-365 ימים) במהלך שנת המדד.

מונה: מבוטחים במכנה אשר תועד עבורם מגע עם איש בריאות הנפש בקהילה תוך 14 ימים ממועד השחרור.


הערות: (1) הגדרת "אשפוז פסיכיאטרי" כוללת אשפוזים במוסדות הפסיכיאטרים, או לחילופין במחלקות הפסיכיאטריות בבתי החולים הכלליים. (2) "מגע עם איש בריאות הנפש בקהילה" כולל: ביקור במסגרת אמבולטורית של מוסד פסיכיאטרי אשפוזי, ביקור ביחידה לבריאות הנפש בקהילה אצל כל איש מקצוע למעט רופא משפחה, או ביקור שאינו ביחידה לבריאות הנפש אצל פסיכיאטר, פסיכיאטר ילדים, פסיכולוג, עו"ס בריאות הנפש, או אח בריאות הנפש. (3) נכללים רק ביקורים בנוכחות המטופל (לא כולל קשר טלפוני).

תוצאות: שיעור המגע הטיפולי (תוך 14 ימים) לאחר שחרור מאשפוז פסיכיאטרי ממושך עמד בשנת 2018 על 37.3%, עליה קלה לעומת שנת 2015 בה השיעור עמד על 32.5%. השיעור היה מעט גבוה יותר בנשים (38.7%) בהשוואה לגברים (36.3%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (36.7%) היה גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החלשה (32.9%).


**תרשים 192: שיעור המקרים בהם התקיים מגע טיפולי עם איש בריאות הנפש
בקהילה לפי שנה, 2015-2018**



**תרשים 193: שיעור המקרים בהם התקיים מגע טיפולי עם איש בריאות הנפש
בקהילה לפי גיל ומין, 2018**



**תרשים 194: שיעור המקרים בהם התקיים מגע טיפולי עם איש בריאות הנפש
בקהילה לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018**



**טבלה 123: שיעור המקרים בהם התקיים מגע טיפולי עם איש בריאות הנפש
בקהילה לפי גיל ומין - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

		גיל									
		סה"כ	85+	75-84	65-74	55-64	45-54	35-44	25-34	18-24	
זכר	מונה	1,614	3	24	82	187	251	334	477	256	
	מכנה	4,451	12	62	245	491	683	966	1,268	724	
	שיעור	36.3%	25.0%	38.7%	33.5%	38.1%	36.7%	34.6%	37.6%	35.4%	
נקבה	מונה	1,321	3	48	113	229	225	239	286	178	
	מכנה	3,412	20	168	362	561	566	587	677	471	
	שיעור	38.7%	15.0%	28.6%	31.2%	40.8%	39.8%	40.7%	42.2%	37.8%	
סה"כ	מונה	2,935	6	72	195	416	476	573	763	434	
	מכנה	7,863	32	230	607	1,052	1,249	1,553	1,945	1,195	
	שיעור	37.3%	18.8%	31.3%	32.1%	39.5%	38.1%	36.9%	39.2%	36.3%	

**טבלה 124: שיעור המקרים בהם התקיים מגע טיפולי עם איש בריאות הנפש
בקהילה לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

	סה"כ	4	3	2	1	
18-24	מונה	421	53	126	163	79
	מכנה	1,156	143	342	416	255
	שיעור	36.4%	37.1%	36.8%	39.2%	31.0%
25-34	מונה	734	63	234	317	120
	מכנה	1,872	182	592	759	339
	שיעור	39.2%	34.6%	39.5%	41.8%	35.4%
35-44	מונה	558	58	169	236	95
	מכנה	1,506	148	458	615	285
	שיעור	37.1%	39.2%	36.9%	38.4%	33.3%
45-54	מונה	455	43	156	186	70
	מכנה	1,197	104	390	484	219
	שיעור	38.0%	41.3%	40.0%	38.4%	32.0%
55-64	מונה	395	39	128	170	58
	מכנה	1,015	104	317	439	155
	שיעור	38.9%	37.5%	40.4%	38.7%	37.4%
65+	מונה	266	47	102	100	17
	מכנה	843	145	304	311	83
	שיעור	31.6%	32.4%	33.6%	32.2%	20.5%
סה"כ	מונה	2,829	303	915	1,172	439
	מכנה	7,589	826	2,403	3,024	1,336
	שיעור	37.3%	36.7%	38.1%	38.8%	32.9%

ניטור תחלואה גופנית בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה

רציונאל: הגדרת מחלת נפש קשה (Severe Mental Illness- SMI) כוללת סכיזופרניה, הפרעה סכיזואפקטיבית והפרעה דו־קוטבית (בי־פולרית). תחלואה קרדיוסקולרית וגורמי הסיכון לתחלואה זו שכיחים יותר באנשים עם SMI בהשוואה לאוכלוסיה הכללית. כך, השמנה שכיחה פי 1.5 עד שניים בקרב מבוגרים עם מחלת נפש קשה, בהשוואה לשיעורה ביתר האוכלוסיה, ושיעור ההימצאות של סוכרת גבוה פי שניים עד שלושה באוכלוסיה זו. בנוסף, מדווח כי גיל ההופעה של מחלת הסוכרת באוכלוסיה זו הינו מוקדם יותר, וכי שכיחותם וחומרתם של סיבוכי הסוכרת גבוהות יותר בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה בהשוואה לשאר האוכלוסיה; בכלל זה שכיחות סיבוכים מיקרו־ומאקרו־וסקולארים, דיסרגולציה מטבולית אקוטית, ותמותה הקשורה בסוכרת. המנגנונים האחראים לקשרים אלו הינם מורכבים, וכוללים היבטים גנטיים, סביבתיים, התנהגותיים וכן כאלה הקשורים בטיפול התרופתי־האנטיפסיכוטי (5).

הערות: לפירוט אודות הרציונאל למדדים העוסקים בסוכרת ובהשמנה, נא ראו הפרקים הרלוונטים.

מדדים:

- ✓ שיעור ההימצאות של מחלת נפש קשה (SMI) בקרב בני 18 ומעלה
- ✓ שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב אנשים עם SMI בני 18 ומעלה
- ✓ שיעור הביצוע של בדיקת HbA1c בקרב חולי SMI וסוכרת בני 18 ומעלה
- ✓ שיעור בעלי רמת HbA1c מאוזנת בקרב חולי SMI וסוכרת בני 18 ומעלה
- ✓ שיעור בעלי רמת HbA1c בלתי־מאוזנת (גבוהה מ־9%) בקרב חולי SMI וסוכרת בני 18 ומעלה
- ✓ שיעור התייעוד של מרכיבי BMI בקרב אנשים עם SMI בני 20-64
- ✓ שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב אנשים עם SMI בני 20-64

שיעור ההימצאות של מחלת נפש קשה (SMI) בבני 18 ומעלה


הגדרת המדד: שיעור ההימצאות של Severe Mental Illness-SMI (סכיזופרניה, הפרעה סכיזואפקטיבית או הפרעה דו־קוטבית), בקרב בני 18 ומעלה.

מכנה: מבוטחים בני 18 ומעלה


מונה: מספר המבוטחים במכנה שיש להם אחת או יותר מהאבחנות הבאות: סכיזופרניה, הפרעה סכיזואפקטיבית או הפרעה דו־קוטבית, ובתנאי שהאבחנה ניתנה על ידי פסיכיאטר (מספיקה אבחנה יחידה, אבחנת ביקור או אבחנה כרונית), או קיימת אבחנה כרונית או שתי אבחנות ביקור שניתנו במועדים שונים על ידי רופא אחר.

תוצאות: שיעור חולי SMI (סכיזופרניה, הפרעה סכיזואפקטיבית או הפרעה דו־קוטבית), בקרב בני 18 ומעלה עמד על 1.3% בשנת 2018. השיעור היה יציב למדי בשנים 2015-2018. השיעור היה גבוה יותר בקרב גברים (1.5%) בהשוואה לנשים (1.1%). בבחינה לפי מצב חברתי־כלכלי (מ־1 נמוך ועד 4-גבוה) נצפה שיעור ההימצאות הגבוה ביותר בקרב בעלי מצב חברתי־כלכלי בינוני-נמוך (קבוצה 2: 1.8% בקרב גברים, ו־1.4% בקרב נשים), וירד עם העליה במצב חברתי כלכלי (קבוצה 4: 1.0% בקרב גברים ו־0.9% בקרב נשים). בקרב קבוצת בעלי מצב חברתי־כלכלי הנמוך ביותר (1) נצפה שיעור הימצאות של 1.5% בגברים (כמו בקבוצה 3), ושל 1.0% בלבד בקרב נשים. יש לציין כי השיעור בקרב גברים גבוה מהשיעור בקרב נשים בכל קבוצות מצב חברתי־כלכלי (ופי 1.5 בסך הכל).


תרשים 195: שיעור הימצאות SMI לפי שנה, 2015-2018



תרשים 196: שיעור הימצאות SMI לפי גיל ומין, 2018



תרשים 197: שיעור הימצאות SMI לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 125: שיעור הימצאות SMI לפי גיל ומין – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל								
		18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
זכר	מונה	3,033	8,080	9,212	7,896	6,209	3,595	1,038	198	39,261
	מכנה	325,053	566,592	517,894	425,219	357,145	271,176	123,411	40,719	2,627,209
	שיעור	0.9%	1.4%	1.8%	1.9%	1.7%	1.3%	0.8%	0.5%	1.5%
נקבה	מונה	1,580	4,554	6,218	6,537	6,623	4,502	1,963	511	32,488
	מכנה	359,101	573,619	537,024	442,630	392,033	312,882	166,191	70,585	2,854,065
	שיעור	0.4%	0.8%	1.2%	1.5%	1.7%	1.4%	1.2%	0.7%	1.1%
סה"כ	מונה	4,613	12,634	15,430	14,433	12,832	8,097	3,001	709	71,749
	מכנה	684,154	1,140,211	1,054,918	867,849	749,178	584,058	289,602	111,304	5,481,274
	שיעור	0.7%	1.1%	1.5%	1.7%	1.7%	1.4%	1.0%	0.6%	1.3%

**טבלה 126: שיעור הימצאות SMI לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל –
מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018**

מצב חברתי-כלכלי					
	סה"כ	4	3	2	1
18-24	מונה	4,484	394	1,270	1,613
	מכנה	651,602	68,090	158,258	204,169
	שיעור	0.7%	0.6%	0.8%	0.5%
25-34	מונה	12,159	1,385	3,840	4,398
	מכנה	1,087,945	154,485	346,731	349,064
	שיעור	1.1%	0.9%	1.1%	1.3%
35-44	מונה	14,876	1,783	4,976	5,308
	מכנה	1,009,509	182,757	350,102	288,329
	שיעור	1.5%	1.0%	1.4%	1.8%
45-54	מונה	13,857	1,642	4,546	5,191
	מכנה	836,255	159,036	286,516	246,608
	שיעור	1.7%	1.0%	1.6%	2.1%
55-64	מונה	12,325	1,385	4,105	4,989
	מכנה	720,325	126,456	258,104	236,264
	שיעור	1.7%	1.1%	1.6%	2.1%
65-74	מונה	7,816	1,209	2,972	2,808
	מכנה	563,146	117,782	217,818	170,940
	שיעור	1.4%	1.0%	1.4%	1.6%
75-84	מונה	2,892	495	1,108	1,036
	מכנה	279,921	54,074	105,053	92,568
	שיעור	1.0%	0.9%	1.1%	1.1%
85+	מונה	691	159	248	224
	מכנה	107,756	24,057	41,074	33,649
	שיעור	0.6%	0.7%	0.6%	0.7%
סה"כ	מונה	69,100	8,452	23,065	25,567
	מכנה	5,256,459	886,737	1,763,656	1,621,591
	שיעור	1.3%	1.0%	1.3%	1.6%

שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב חולי SMI, בני 18 ומעלה


הגדרת המדד: שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב חולי SMI, בני 18 ומעלה.

מכנה: מבוטחים בני 18 ומעלה עם SMI


מונה: מבוטחים במכנה החולים בסוכרת לפי תרופות או מעבדה (ראה הגדרות בפרק "סוכרת").

תוצאות: שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב חולי SMI, בני 18 ומעלה עמד על 14.9% בשנת 2018, שיעור הגבוה פי 1.5 משיעור ההימצאות של סוכרת בכלל האוכלוסייה בשנה זו (9.7%). השיעור היה גבוה יותר בקרב נשים (16.6%) מאשר בקרב גברים (13.4%), וכן נצפה כי מחלת הסוכרת מגיעה לשכיחות מקסימלית בגילאי 65-74 בקרב מבוגרים עם SMI (32.5% בקרב גברים ו-32.6% בקרב נשים). זאת, לעומת האוכלוסייה הכללית בה השיעורים הגבוהים ביותר של מחלת הסוכרת מגיעים לשיא בקבוצת גיל מבוגרת יותר, 75-84 שנים (34.2% בקרב גברים ו-31.1% בקרב נשים). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (14.8%) היה גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (12.3%).


תרשים 198: שיעור הימצאות סוכרת בקרב חולי SMI לפי שנה, 2015-2018



תרשים 199: שיעור הימצאות סוכרת בקרב חולי SMI לפי גיל ומין, 2018



תרשים 200: שיעור הימצאות סוכרת בקרב חולי SMI לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 127: שיעור הימצאות סוכרת בקרב חולי SMI לפי גיל ומין - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל								
		סה"כ	85+	75-84	65-74	55-64	45-54	35-44	25-34	18-24
זכר	מונה	5,230	50	321	1,164	1,595	1,300	610	171	19
	מכנה	38,893	198	1,034	3,581	6,173	7,825	9,124	7,989	2,969
	שיעור	13.4%	25.3%	31.0%	32.5%	25.8%	16.6%	6.7%	2.1%	0.6%
נקבה	מונה	5,333	114	577	1,464	1,680	971	393	121	13
	מכנה	32,203	509	1,959	4,488	6,591	6,486	6,155	4,491	1,524
	שיעור	16.6%	22.4%	29.5%	32.6%	25.5%	15.0%	6.4%	2.7%	0.9%
סה"כ	מונה	10,563	164	898	2,628	3,275	2,271	1,003	292	32
	מכנה	71,096	707	2,993	8,069	12,764	14,311	15,279	12,480	4,493
	שיעור	14.9%	23.2%	30.0%	32.6%	25.7%	15.9%	6.6%	2.3%	0.7%

טבלה 128: שיעור הימצאות סוכרת בקרב חולי SMI לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי					
	סה"כ	4	3	2	1
18-24	מונה	8	15	7	2
	מכנה	1,182	1,579	1,229	375
	שיעור	0.7%	0.9%	0.6%	0.5%
25-34	מונה	70	101	85	26
	מכנה	2,487	4,358	3,789	1,371
	שיעור	2.8%	2.3%	2.2%	1.9%
35-44	מונה	245	370	292	63
	מכנה	2,779	5,236	4,947	1,764
	שיעור	8.8%	7.1%	5.9%	3.6%
45-54	מונה	497	843	659	156
	מכנה	2,455	5,139	4,510	1,632
	שיעור	20.2%	16.4%	14.6%	9.6%
55-64	מונה	541	1,319	991	270
	מכנה	1,835	4,963	4,082	1,377
	שיעור	29.5%	26.6%	24.3%	19.6%
65-74	מונה	292	980	905	354
	מכנה	823	2,801	2,960	1,204
	שיעור	35.5%	35.0%	30.6%	29.4%
75-84	מונה	91	301	342	127
	מכנה	250	1,034	1,106	494
	שיעור	36.4%	29.1%	30.9%	25.7%
85+	מונה	17	48	62	32
	מכנה	59	224	247	159
	שיעור	28.8%	21.4%	25.1%	20.1%
סה"כ	מונה	1,761	3,977	3,343	1,030
	מכנה	11,870	25,334	22,870	8,376
	שיעור	14.8%	15.7%	14.6%	12.3%

שיעור הביצוע של בדיקת HbA1c בקרב חולי SMI וסוכרת, בני 18 ומעלה


הגדרת המדד: שיעור הביצוע של בדיקת HbA1c בקרב חולי SMI וסוכרת, בני 18 ומעלה

מכנה: מבוטחים בני 18 ומעלה עם SMI וסוכרת (לפי תרופות או מעבדה)


מונה: מספר המבוטחים במכנה אשר ביצעו בדיקת HbA1c בשנת המדד

תוצאות: שיעור הביצוע של בדיקת HbA1c בקרב חולי SMI וסוכרת, בני 18 ומעלה עמד על 89.9% בשנת 2018, בדומה לשיעור בקרב האוכלוסייה הכללית של חולי הסוכרת (90.7%). השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (90.5%) מאשר בקרב גברים (89.3%). השיעור היה דומה בין השכבות החברתיות-כלכליות השונות.


תרשים 201: שיעור ביצוע בדיקת HbA1c בקרב חולי SMI וסוכרת לפי שנה, 2015-2018



תרשים 202: שיעור ביצוע בדיקת HbA1c בקרב חולי SMI וסוכרת
לפי גיל ומין, 2018



תרשים 203: שיעור ביצוע בדיקת HbA1c בקרב חולי SMI וסוכרת
לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 129: שיעור ביצוע בדיקת HbA1c בקרב חולי SMI וסוכרת
לפי גיל ומין - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל								
		סה"כ	85+	75-84	65-74	55-64	45-54	35-44	25-34	18-24
זכר	מונה	4,670	43	298	1,069	1,430	1,138	538	136	18
	מכנה	5,230	50	321	1,164	1,595	1,300	610	171	19
	שיעור	89.3%	86.0%	92.8%	91.8%	89.7%	87.5%	88.2%	79.5%	94.7%
נקבה	מונה	4,826	100	516	1,334	1,533	888	344	99	12
	מכנה	5,333	114	577	1,464	1,680	971	393	121	13
	שיעור	90.5%	87.7%	89.4%	91.1%	91.3%	91.5%	87.5%	81.8%	92.3%
סה"כ	מונה	9,496	143	814	2,403	2,963	2,026	882	235	30
	מכנה	10,563	164	898	2,628	3,275	2,271	1,003	292	32
	שיעור	89.9%	87.2%	90.6%	91.4%	90.5%	89.2%	87.9%	80.5%	93.8%

טבלה 130: שיעור ביצוע בדיקת HbA1c בקרב חולי SMI וסוכרת לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי					
סה"כ	4	3	2	1	
30	2	6	14	8	מונה
32	2	7	15	8	מכנה
93.8%	100.0%	85.7%	93.3%	100.0%	שיעור
227	17	68	82	60	מונה
282	26	85	101	70	מכנה
80.5%	65.4%	80.0%	81.2%	85.7%	שיעור
855	59	251	323	222	מונה
970	63	292	370	245	מכנה
88.1%	93.7%	86.0%	87.3%	90.6%	שיעור
1,926	142	602	740	442	מונה
2,155	156	659	843	497	מכנה
89.4%	91.0%	91.4%	87.8%	88.9%	שיעור
2,826	244	899	1,184	499	מונה
3,121	270	991	1,319	541	מכנה
90.5%	90.4%	90.7%	89.8%	92.2%	שיעור
2,316	326	822	898	270	מונה
2,531	354	905	980	292	מכנה
91.5%	92.1%	90.8%	91.6%	92.5%	שיעור
781	120	303	277	81	מונה
861	127	342	301	91	מכנה
90.7%	94.5%	88.6%	92.0%	89.0%	שיעור
138	25	56	41	16	מונה
159	32	62	48	17	מכנה
86.8%	78.1%	90.3%	85.4%	94.1%	שיעור
9,099	935	3,007	3,559	1,598	מונה
10,111	1,030	3,343	3,977	1,761	מכנה
90.0%	90.8%	89.9%	89.5%	90.7%	שיעור

שיעור בעלי רמת HbA1c מאוזנת בקרב חולי SMI וסוכרת, בני 18-74


הגדרת המדד: שיעור בעלי רמת HbA1c מאוזנת בקרב חולי SMI וסוכרת, בני 18-74.

מכנה: מבוטחים בני 18 ומעלה עם SMI וסוכרת (לפי תרופות או מעבדה), שביצעו בדיקת HbA1c בשנת המדד.


מונה: מספר המבוטחים במכנה אשר רמת HbA1c האחרונה שלהם בשנת המדד נמוכה או שווה ל-7% בקרב חולים בגילאי 18-74 שהיו חולי סוכרת פחות מ-10 שנים, או ל-8% בקרב חולים בגילאי 74-18 שהיו חולי סוכרת לפחות 10 שנים, או בקרב חולים בגילאי 75-84 ללא תלות בותק המחלה.

תוצאות: שיעור בעלי רמת HbA1c מאוזנת בקרב חולי SMI וסוכרת בני 18-84 עמד על 71.8% בשנת 2018. זאת, בדומה לשיעור האיזון באוכלוסיית הסוכרתיים הכללית, שעמד בשנה זו על 70.8%. השיעור היה מעט גבוה יותר בקרב נשים (72.9%) מאשר בקרב גברים (70.7%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (65.1%) היה נמוך יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (77.9%). קשר ישיר דומה בין מצב חברתי-כלכלי לאיזון סוכרת מתקיים גם באוכלוסיית הסוכרתיים הכללית, אף עם מדרג מעט חזק יותר (פי 1.3 מאוזנים בשכבה החברתית-כלכלית החזקה בהשוואה לשכבה החלשה בקרב אוכלוסיית הסוכרתיים הכללית, ופי 1.2 בקרב חולי סוכרת ו-SMI). שיעור האיזון עלה עם העליה בגילאי החולים.


תרשים 204: שיעור בעלי רמת HbA1c מאוזנת בחולי SMI וסוכרת לפי שנה, 2015-2018



תרשים 205: שיעור בעלי רמת HbA1c מאוזנת בחולי SMI וסוכרת לפי גיל ומין, 2018



תרשים 206: שיעור בעלי רמת HbA1c מאוזנת בחולי SMI וסוכרת לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 131: שיעור בעלי רמת HbA1c מאוזנת בחולי SMI וסוכרת לפי גיל ומין - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל							
		סה"כ	75-84	65-74	55-64	45-54	35-44	25-34	18-24
זכר	מונה	3,270	265	815	1,023	739	333	84	11
	מכנה	4,624	297	1,067	1,430	1,138	538	136	18
	שיעור	70.7%	89.2%	76.4%	71.5%	64.9%	61.9%	61.8%	61.1%
נקבה	מונה	3,441	440	1,021	1,089	575	240	69	7
	מכנה	4,722	516	1,330	1,533	888	344	99	12
	שיעור	72.9%	85.3%	76.8%	71.0%	64.8%	69.8%	69.7%	58.3%
סה"כ	מונה	6,711	705	1,836	2,112	1,314	573	153	18
	מכנה	9,346	813	2,397	2,963	2,026	882	235	30
	שיעור	71.8%	86.7%	76.6%	71.3%	64.9%	65.0%	65.1%	60.0%

טבלה 132: שיעור בעלי רמת HbA1c מאוזנת בחולי SMI וסוכרת לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי					
סה"כ	4	3	2	1	
18	2	1	10	5	מונה
30	2	6	14	8	מכנה
60.0%	100.0%	16.7%	71.4%	62.5%	שיעור
148	11	48	50	39	מונה
227	17	68	82	60	מכנה
65.2%	64.7%	70.6%	61.0%	65.0%	שיעור
555	38	166	220	131	מונה
855	59	251	323	222	מכנה
64.9%	64.4%	66.1%	68.1%	59.0%	שיעור
1,245	102	403	473	267	מונה
1,926	142	602	740	442	מכנה
64.6%	71.8%	66.9%	63.9%	60.4%	שיעור
2,010	185	660	842	323	מונה
2,826	244	899	1,184	499	מכנה
71.1%	75.8%	73.4%	71.1%	64.7%	שיעור
1,773	262	646	666	199	מונה
2,310	323	821	896	270	מכנה
76.8%	81.1%	78.7%	74.3%	73.7%	שיעור
676	107	267	236	66	מונה
780	120	303	276	81	מכנה
86.7%	89.2%	88.1%	85.5%	81.5%	שיעור
6,425	707	2,191	2,497	1,030	מונה
8,954	907	2,950	3,515	1,582	מכנה
71.8%	77.9%	74.3%	71.0%	65.1%	שיעור

שיעור בעלי רמת HbA1c גבוהה מ־9% בקרב חולי SMI וסוכרת, בני 18 ומעלה

הגדרת המדד: שיעור בעלי רמת HbA1c גבוהה מ־9% בקרב חולי SMI וסוכרת, בני 18 ומעלה.


מכנה: מבוטחים בני 18 ומעלה עם SMI וסוכרת (לפי תרופות או מעבדה), שביצעו בדיקת HbA1c בשנת המדד.

מונה: מספר המבוטחים במכנה אשר רמת HbA1c האחרונה שלהם בשנת המדד גבוהה מ־9%.


תוצאות: שיעור בעלי רמת HbA1c גבוהה מ־9% בקרב חולי SMI וסוכרת, בני 18 ומעלה עמד על 10.9% בשנת 2018, מעט גבוה יותר בהשוואה לשיעור באוכלוסיית הסוכרתיים הכללית (9.6%). השיעור היה מעט נמוך יותר בקרב נשים (10.7%) מאשר בקרב גברים (11.1%). השיעור היה גבוה פי 1.8 בשכבה החברתית־כלכלית החלשה (14.3%) בהשוואה לשכבה החברתית־כלכלית החזקה ביותר (8.0%).

תרשים 207: שיעור בעלי רמת HbA1c גבוהה מ־9% בחולי SMI וסוכרת


לפי שנה, 2018–2015



**תרשים 208: שיעור בעלי רמת HbA1c גבוהה מ-9% בחולי SMI וסוכרת
לפי גיל ומין, 2018**



**תרשים 209: שיעור בעלי רמת HbA1c גבוהה מ-9% בחולי SMI וסוכרת
לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018**



טבלה 133: שיעור בעלי רמת HbA1c גבוהה מ-9% בחולי SMI וסוכרת לפי גיל ומין - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל							
		18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
זכר	מונה	2	21	84	184	133	79	14	3
	מכנה	18	136	538	1,138	1,430	1,069	298	43
	שיעור	11.1%	15.4%	15.6%	16.2%	9.3%	7.4%	4.7%	7.0%
נקבה	מונה	2	9	46	127	197	101	32	4
	מכנה	12	99	344	888	1,533	1,334	516	100
	שיעור	16.7%	9.1%	13.4%	14.3%	12.9%	7.6%	6.2%	4.0%
סה"כ	מונה	4	30	130	311	330	180	46	7
	מכנה	30	235	882	2,026	2,963	2,403	814	143
	שיעור	13.3%	12.8%	14.7%	15.4%	11.1%	7.5%	5.7%	4.9%

טבלה 134: שיעור בעלי רמת HbA1c גבוהה מ-9% בחולי SMI וסוכרת לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		מצב חברתי-כלכלי			
		1	2	3	4
18-24	מונה	1	2	1	0
	מכנה	8	14	6	2
	שיעור	12.5%	14.3%	16.7%	0.0%
25-34	מונה	7	13	8	1
	מכנה	60	82	68	17
	שיעור	11.7%	15.9%	11.8%	5.9%
35-44	מונה	38	51	26	9
	מכנה	222	323	251	59
	שיעור	17.1%	15.8%	10.4%	15.3%
45-54	מונה	81	106	88	19
	מכנה	442	740	602	142
	שיעור	18.3%	14.3%	14.6%	13.4%
55-64	מונה	67	132	95	23
	מכנה	499	1,184	899	244
	שיעור	13.4%	11.1%	10.6%	9.4%
65-74	מונה	27	80	51	16
	מכנה	270	898	822	326
	שיעור	10.0%	8.9%	6.2%	4.9%
75-84	מונה	5	18	16	6
	מכנה	81	277	303	120
	שיעור	6.2%	6.5%	5.3%	5.0%
85+	מונה	2	3	1	1
	מכנה	16	41	56	25
	שיעור	12.5%	7.3%	1.8%	4.0%
סה"כ	מונה	228	405	286	75
	מכנה	1,598	3,559	3,007	935
	שיעור	14.3%	11.4%	9.5%	8.0%

שיעור התיעוד של מרכיבי BMI בקרב חולי SMI, בני 20-64


הגדרת המדד: שיעור התיעוד של מרכיבי BMI בקרב חולי SMI, בני 20-64

מכנה: חולי SMI בני 20-64


מונה: מספר המבוטחים במכנה עם תיעוד מרכיבי BMI (משקל: לפחות פעם אחת בשנת המדד, גובה: לפחות פעם אחת אחרי גיל 18).

תוצאות: שיעור התיעוד של מרכיבי BMI בקרב חולי SMI, בני 20-64 עמד על 54.0% בשנת 2018. שיעור זה נמוך במידה ניכרת בהשוואה לשיעור בתיעוד של מרכיבי BMI באוכלוסייה הכללית, שעמד בשנה זו על 89.6%. בסך הכל הודגמה ירידה בשיעורי התיעוד בין השנים 2015-2018. השיעור היה גבוה יותר בקרב נשים (58.9%) מאשר בקרב גברים (50.4%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (54.3%) היה מעט גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (48.4%). השיעור עלה באופן מונוטוני העליה בגיל.


תרשים 210: תיעוד מרכיבי BMI בחולי SMI לפי שנה, 2015-2018



תרשים 211: תיעוד מרכיבי BMI בחולי SMI לפי גיל ומין, 2018



תרשים 212: תיעוד מרכיבי BMI בחולי SMI לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 135: תיעוד מרכיבי BMI בחולי SMI לפי גיל ומין

מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

		גיל					
		סה"כ	55-64	45-54	35-44	25-34	20-24
זכר	מונה	16,833	4,058	4,472	4,293	3,097	913
	מכנה	33,378	5,691	7,896	9,212	8,080	2,499
	שיעור	50.4%	71.3%	56.6%	46.6%	38.3%	36.5%
נקבה	מונה	14,484	4,404	3,921	3,290	2,252	617
	מכנה	24,603	6,008	6,537	6,218	4,554	1,286
	שיעור	58.9%	73.3%	60.0%	52.9%	49.5%	48.0%
סה"כ	מונה	31,317	8,462	8,393	7,583	5,349	1,530
	מכנה	57,981	11,699	14,433	15,430	12,634	3,785
	שיעור	54.0%	72.3%	58.2%	49.1%	42.3%	40.4%

טבלה 136: תיעוד מרכיבי BMI בחולי SMI לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי						
סה"כ	4	3	2	1		
1,483	137	438	538	370	מונה	20-24
3,674	342	1,055	1,345	932	מכנה	
40.4%	40.1%	41.5%	40.0%	39.7%	שיעור	
5,150	520	1,630	1,930	1,070	מונה	25-34
12,159	1,385	3,840	4,398	2,536	מכנה	
42.4%	37.5%	42.4%	43.9%	42.2%	שיעור	
7,288	768	2,379	2,708	1,433	מונה	35-44
14,876	1,783	4,976	5,308	2,809	מכנה	
49.0%	43.1%	47.8%	51.0%	51.0%	שיעור	
8,027	862	2,622	3,041	1,502	מונה	45-54
13,857	1,642	4,546	5,191	2,478	מכנה	
57.9%	52.5%	57.7%	58.6%	60.6%	שיעור	
8,100	806	2,618	3,363	1,313	מונה	55-64
11,242	1,241	3,723	4,559	1,719	מכנה	
72.1%	64.9%	70.3%	73.8%	76.4%	שיעור	
30,048	3,093	9,687	11,580	5,688	מונה	סה"כ
55,808	6,393	18,140	20,801	10,474	מכנה	
53.8%	48.4%	53.4%	55.7%	54.3%	שיעור	

שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב חולי SMI, בני 20-64


הגדרת המדד: שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב חולי SMI, בני 20-64

מכנה: חולי SMI עם תיעוד מרכיבי BMI (משקל: לפחות פעם אחת בשנת המדד, גובה: לפחות פעם אחת אחרי גיל 18) בגילאי 20-64.


מונה: מספר המבוטחים במכנה עם ערך BMI גדול או שווה 30 ק"ג/מ².

תוצאות: שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב חולי SMI בני 20-64 עמד על 40.9% בשנת 2018. שיעור זה גבוה פי 1.7 משיעור ההימצאות של השמנת יתר בגילאים אלו באוכלוסיה הכללית (23.8%). השיעור היה גבוה יותר בקרב נשים (46.1%) מאשר בקרב גברים (36.4%). השיעור בשכבה החברתית-כלכלית החלשה (45.9%) היה גבוה יותר בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר (33.9%). כמו כן, שיעורי ההשמנה עלו עם העליה בגיל. קשרים אלו בין שיעור ההמצאות של השמנת יתר למין, גיל ומצב חברתי-כלכלי באוכלוסיה זו דומים לקשרים שנצפו באוכלוסיה הכללית.


תרשים 213: שיעור ההימצאות של השמנת יתר בחולי SMI לפי שנה, 2015-2018



תרשים 214: שיעור הימצאות השמנת יתר בחולי SMI לפי גיל ומין, 2018



תרשים 215: שיעור הימצאות השמנת יתר בחולי SMI לפי מצב חברתי-כלכלי ומין, 2018



טבלה 137: שיעור הימצאות השמנת יתר בחולי SMI לפי גיל ומין - מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018


		גיל						
		סה"כ	55-64	45-54	35-44	25-34	20-24	
זכר	מונה	6,124	1,399	1,788	1,629	1,038	270	
	מכנה	16,833	4,058	4,472	4,293	3,097	913	
	שיעור	36.4%	34.5%	40.0%	37.9%	33.5%	29.6%	
נקבה	מונה	6,674	2,060	2,002	1,549	869	194	
	מכנה	14,484	4,404	3,921	3,290	2,252	617	
	שיעור	46.1%	46.8%	51.1%	47.1%	38.6%	31.4%	
סה"כ	מונה	12,798	3,459	3,790	3,178	1,907	464	
	מכנה	31,317	8,462	8,393	7,583	5,349	1,530	
	שיעור	40.9%	40.9%	45.2%	41.9%	35.7%	30.3%	

טבלה 138: שיעור הימצאות השמנת יתר בחולי SMI לפי מצב חברתי-כלכלי וגיל – מספרים מוחלטים ושיעורים, 2018

מצב חברתי-כלכלי					
	סה"כ	4	3	2	1
20-24	מונה	448	32	120	179
	מכנה	1,483	137	438	538
	שיעור	30.2%	23.4%	27.4%	33.3%
25-34	מונה	1,843	141	562	693
	מכנה	5,150	520	1,630	1,930
	שיעור	35.8%	27.1%	34.5%	35.9%
35-44	מונה	3,070	250	938	1,191
	מכנה	7,288	768	2,379	2,708
	שיעור	42.1%	32.6%	39.4%	44.0%
45-54	מונה	3,617	325	1,135	1,414
	מכנה	8,027	862	2,622	3,041
	שיעור	45.1%	37.7%	43.3%	46.5%
55-64	מונה	3,326	299	1,020	1,393
	מכנה	8,100	806	2,618	3,363
	שיעור	41.1%	37.1%	39.0%	41.4%
סה"כ	מונה	12,304	1,047	3,775	4,870
	מכנה	30,048	3,093	9,687	11,580
	שיעור	40.9%	33.9%	39.0%	42.1%

1. הרפורמה בבריאות הנפש [Internet]. Available from: https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/reform/Pages/default.aspx
2. Dixon L, Goldberg R, Iannone V, Lucksted A, Brown C, Kreyenbuhl J, et al. Use of a critical time intervention to promote continuity of care after psychiatric inpatient hospitalization. *Psychiatr Serv*. 2009 Apr;60(4):451–8.
3. Luxton DD, June JD, Comtois KA. Can postdischarge follow-up contacts prevent suicide and suicidal behavior? A review of the evidence. *Crisis*. 2013 Jan;34(1):32–41.
4. Barekattain M, Maracy MR, Rajabi F, Baratian H. Aftercare services for patients with severe mental disorder: A randomized controlled trial. *J Res Med Sci*. 2014 Mar;19(3):240–5.
5. Holt RIG, Mitchell AJ. Diabetes mellitus and severe mental illness: mechanisms and clinical implications. *Nat Rev Endocrinol*. 2015 Feb;11(2):79–89.

ממצאים נבחרים לפי קופות



בפרק זה מוצגים ערכי שבעה מדדים נבחרים לפי קופה, בתחומים שונים: ביצוע בדיקות סיקור לסרטן צוואר הרחם, קבלת חיסון נגד שפעת, שימוש יתר בבנזודיאזפינים, טיפול תרופתי הולם לאחר שבר בצוואר הירך, ביצוע ספירומטריה בחולים ובאוכלוסיה בסיכון ל-COPD, איזון ערכי כולסטרול LDL באוכלוסיה הכללית ורמת LDL נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל או טיפול בסטטינים בעצימות גבוהה לאחר צנתור לבבי או ניתוח מעקפים. מדדים אלו בעלי חשיבות לבריאות הציבור, ומשקפים עשייה רחבת-היקף ברפואת הקהילה במגוון תחומים.

ערכי המדדים מוצגים בחלוקה לפי קופה, לאחר תקנון למין, גיל ומצב חברתי-כלכלי, בליווי רווחי סמך של 95%. כפי שפורט בפרק השיטות, מצב חברתי-כלכלי נקבע בדו"ח זה על סמך האשכול אליו משויך האזור הסטטיסטי של כתובת המגורים. חלוקה זו מבוססת על ממצאי מפקדי האוכלוסין של הלמ"ס, ועוברת השלמה וטיוב של הנתונים על-ידי חברת פוינטס. התקנון, כמו גם הריבוד בשאר פרקי הדו"ח הנוכחי, בוצעו תוך חלוקה לארבע קבוצות. עבור 4.4% מהמבוטחים כתובות המגורים לא היו שלמות, ולכן הם אינם נכללים במדדים המתוקננים. לצד השיעורים המתוקננים של כל קופה, מוצג עבור כל מדד גם השיעור הלאומי לשנת 2018. אלו הם שיעורים גולמיים ואינם כרוכים בערכים חסרים.

שיעור הנשים בגיל 35-54 אשר ביצעו בדיקות סיקור לסרטן צוואר הרחם ב־3 השנים האחרונות


הגדרת המדד: שיעור הנשים בגיל 35-54 אשר ביצעו לפחות בדיקת סיקור ציטולוגית (פאפ) אחת בשלוש השנים האחרונות.

רצינאל: סרטן צוואר הרחם עונה על הקריטריונים לסיקור וגילוי מוקדם, בהתחשב בתקופת החביון הארוכה של התפתחותו, קיומם של נגעים טרום סרטניים, וקיומו של טיפול המונע התקדמות של נגעים אלו לנגעים ממאירים (1). מטרתו העיקרית של הסיקור היא גילויים של נגעים טרום ממאירים, ומתן טיפול מונע עוד בטרם התפתחו נגעים ממאירים. ברוב הארצות המפותחות, מומלץ על סיקור לגילוי מוקדם של סרטן צוואר הרחם, בין אם במסגרת תכנית סיקור יזומה, ובין אם במסגרת סיקור מזדמן (1-3) במרבית המדינות מבוצע כיום סיקור באמצעות בדיקת פאפ בגילאים 25-65 שנים בתדירות של אחת ל־3 שנים. גם בישראל, המלצת משרד הבריאות היא סיקור באמצעות בדיקת פאפ לנשים בגילאים 25-65 שנים אחת לשלוש שנים (4). החל מ־1995, משטחי צוואר הרחם נכללים בסל הבריאות עבור נשים בגיל 35-54 שנים בלבד (5). בארצות בהן קיים סיקור, נצפתה ירידה משמעותית ביותר בשיעורי התחלואה והתמותה מסרטן צוואר הרחם, לצד העליה בשיעורי הסיקור באמצעות בדיקת הפאפ. בארצות אלו עיקר התחלואה בסרטן צוואר הרחם נצפית בנשים שלא עברו סיקור נאות (1,2,6,7)

מכנה: נשים מבוטחות בגיל 35-54

מונה: מספר הנשים במכנה אשר עברו בדיקת סיקור ציטולוגית (בדיקת פאפ) לסרטן צוואר הרחם, לפחות פעם אחת בשנת המדד או בשנתיים שקדמו לשנת המדד.

תרשים 216: שיעור הנשים שביצעו בדיקות סיקור לסרטן צוואר הרחם ב־3 השנים האחרונות לפי קופה, 2018



בשנת 2018, עמד שיעור הנשים בגילאי 35-54 אשר ביצעו בדיקות סיקור לסרטן צוואר הרחם ב־3 השנים האחרונות בישראל על 51.5%. השיעורים המתוקננים שנצפו בקופות השונות היו: כללית 47.1% (CI 47.0%, 47.3% 95%), לאומית 43.6% (CI 43.2%, 44.0% 95%), מאוחדת 48.3% (95% 48.6%, CI 48.1%), ומכבי 64.0% (CI 63.8%, 64.2% 95%). בשנת 2014 עמד השיעור הממוצע של ביצוע בדיקות סיקור לסרטן צוואר הרחם בנשים בגילאים 20-69 ב־23 מדינות OECD על 63.0%, כשהשיעור בישראל עבור טווח גילאים 35-54 בשנה זו היה 48.1%. אוסטריה הגיעה לשיעור הגבוה ביותר מבין המדינות החברות (86.6%). שבדיה, אנגליה ופורטוגל הציגו שיעורים הגבוהים מ־70%. השיעורים הנמוכים ביותר בקרב המדינות החברות נצפו באיטליה, הונגריה ולטביה (עם 40.5%, 35.9% ו־25.0% בהתאמה) (8). בארצות הברית דווחו שיעורי סיקור גבוהים במיוחד גם בשנת 2015, עם 81.0% מהנשים בגילאי 21-65 אשר ביצעו סיקור בהתאם להמלצות (9).

שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בקרב בני 65 ומעלה


רצינאל: מחלת השפעת היא מחלה זיהומית נגיפית המתבטאת לרוב בחום גבוה, צמרמורות, כאבי גרון ושיעול, כאבי שרירים וראש ותשישות. הסיכון המרכזי המופיע בעקבות שפעת עונתית הוא דלקת ריאות, אך תחלואה בשפעת אף מחמירה תחלואה כרונית קיימת ותורמת לתמותה בעונת החורף ממחלות ריאה ולב (10,11). גורמי סיכון לסיבוכי המחלה כוללים גיל (קשישים או ילדים צעירים מאד), הריון, מחלות רקע כרוניות כגון סוכרת, השמנת יתר חולנית, מחלות לב, מחלות דרכי הנשימה ומחלות המדכאות את מערכת החיסון. הטיפול בשפעת כולל בדרך כלל טיפול תומך וטיפול בסיבוכי המחלה (דלקת ריאות ומצוקה נשימתית). לאור זאת, האמצעי היעיל ביותר הינו מניעה ראשונית על ידי חיסון נגד נגיף השפעת. היעילות האפשרית של החיסון במניעת שפעת וסיבוכיה כוללת מניעת תחלואה של הפרט וכן צמצום ההעברה והגבלת היקפי ההתפרצויות. שפעת עונתית מתחילה בדרך כלל בחודשי הסתיו (אוקטובר-נובמבר) ומגיעה לשיאה בחורף (דצמבר-ינואר) (12). בשל ההשתנות השנתית של זני השפעת יש צורך בחיסון חוזר כל שנה (13).

מכנה: כלל המבוטחים בני 65 ומעלה

מונה: מספר המבוטחים במכנה אשר חוסנו בפועל נגד שפעת עונתית

הערות: תקופת המדד הינה מ' 1 בספטמבר של שנת המדד ועד 28 בפברואר בשנה שאחריה, בחפיפה לתקופת מתן החיסון.

תרשים 217: שיעור קבלת חיסון נגד שפעת לפי קופה, 2018



בשנת 2018, עמד שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בקרב מבוגרים בני 65 ומעלה על 60.4%. השיעורים המתוקננים שנצפו בקופות השונות היו: כללית 61.4% (95% 61.6%, CI 61.3%), לאומית 71.5% (95% 71.9%, CI 71.2%), מאוחדת 56.1% (95% 56.4%, CI 55.7%), ומכבי 55.4% (95% 55.6%, CI 55.2%).

על פי נתוני 2018 או השנה האחרונה עבורה קיימים נתונים שיעורי ההתחסנות הגבוהים ביותר דווחו בקוריאאה (82.7%), במקסיקו (82.3%), בבריטניה (70.6%) ובארה"ב (67.5%). בדומה לשיעור הנצפה ביוון (48.9%), בשבדיה (49.4%), ובצרפת (49.7%). בתחתית הטבלה ניתן היה למצוא את המדינות סלובניה, פולין, טורקיה, לטביה ואסטוניה בהן פחות מ-10% מהמבוגרים בני 65 ומעלה קיבלו את החיסון העונתי נגד שפעת (14). כמו כן, דוח ארגון ה-OECD לשנת 2017 מציין כי בעשור שבין 2005 ל-2015 חלה ירידה בשיעור המתחסנים הממוצע במדינות הארגון, מ-49% בשנת 2005 ל-43% בשנת 2015. ישראל צוינה כאחת המדינות בהן חלה עליה בשיעור המתחסנים נגד נגיף השפעת בתקופה זו (15).

שיעור שימוש היתר בבנזודיאזפינים בקרב בני 65 ומעלה

הגדרת המדד: שיעור המבוטחים בני 65 ומעלה עם שימוש יתר בבנזודיאזפינים בשנת המדד.


רצינאל: הבנזודיאזפינים הן תרופות מרגיעות ומשרות שינה ותיקות. לכל הבנזודיאזפינים פוטנציאל להתפתחות תלות נפשית וגופנית, בעיקר במינון גבוה ולאחר מתן ממושך. הפסקה או מיתון פתאומי של טיפול כרוני עלולים לגרום תסמיני גמילה, חלקם מסכני חיים. תופעות הלוואי העיקריות של בנזודיאזפינים הן ישנוניות, פגיעה בזכרון ובריכוז וחוסר יציבות (17,16). קשישים רגישים במיוחד לתופעות לוואי אלו, הן בגלל רגישות יתר של מערכת העצבים להשפעת הבנזודיאזפינים והן בגלל קצב הפירוק האיטי של תכשירים ארוכי טווח בגוף (19,18). מחקרים רבים הוכיחו כי שימוש בבנזודיאזפינים או בתרופות ה-Z בקשישים מעלה את הסיכון לתאונות, נפילות ושברים. על אף העדויות המדאיות על הנזק הפוטנציאלי שיש בשימוש בלתי מושכל וכרוני בתרופות אלה, שימוש כזה נותר נפוץ במדינות המפותחות, ובפרט באוכלוסיית הקשישים (21,20).

מכנה: מבוטחים בני 65 ומעלה

מונה: מספר המבוטחים במכנה עם שימוש יתר בבנזודיאזפינים בשנת המדד. שימוש יתר מוגדר כצריכה של תכשירים ממשפחת הבנזודיאזפינים ו"תרופות ה-Z" בכמות של 365 DDDs או יותר במהלך שנת המדד.

הערות: DDD = Defined Daily Dose - מינון התחזוקה היומי הממוצע המשוער עבור תרופה המשמשת בהתוויה העיקרית שלה במבוגר. זהו מונח המשמש לצורך כימות הצריכה הכוללת של תרופה. ה-DDD נקבע על ידי ה-WHO. המדד הוגדר בצורה תואמת למדד ה-OECD במטרה לאפשר השוואה בינלאומית מהימנה.

תרשים 218: שיעור שימוש היתר בבנזודיאזפינים לפי קופה, 2018



בשנת 2018, עמד שימוש היתר בבנזודיאזפינים בקרב בני 65 ומעלה על 4.8%. השיעורים המתוקננים שנצפו בקופות השונות היו: כללית 5.6% (95% CI 5.6%, 5.7%), לאומית 2.8% (95% CI 2.7%, 2.9%), מאוחדת 4.1% (95% CI 4.0%, 4.3%), ומכבי 3.6% (95% CI 3.5%, 3.6%).

בשנת 2015 עמד השיעור הממוצע של שימוש-יתר בבנזודיאזפינים בקרב בני 65 ומעלה ב־16 מדינות OECD המדווחות מדד זה על 2.5%, כשהשיעור בישראל באותה השנה היה 5.2%. ישראל דורגה בחציון העליון של שיעור שימוש-יתר בבנזודיאזפינים, כאשר באירלנד ובפורטוגל נצפו שיעורי שימוש גבוהים אף יותר (6.7% ו־6.5%, בהתאמה), ואילו מדינות אחרות, כדוגמת דנמרק, קנדה ואוסטרליה הציגו שיעורים נמוכים יותר מאלה שנצפו בישראל באותה שנה (1.8%, 1.7% ו־0.3%, בהתאמה) (22).

טיפול תרופתי הולם בבני 65-85 לאחר שבר בצוואר הירך

הגדרת המדד: טיפול תרופתי הולם בבני 65-85 אשר עברו ניתוח לתיקון שבר בצוואר הירך בשנה שלפני שנת המדד.


רצינאל: שברים אוסטיאופורוטיים הינם תופעה נפוצה בגיל המבוגר, ושכיחותם עולה עם הזדקנות האוכלוסיה. לפי הערכה עדכנית, מאובחנים בכל שנה ברחבי העולם כתשעה מיליון שברים אוסטיאופורוטיים (23). בכמצית מהמקרים נותרת לאחר השבר פגיעה תפקודית קבועה, ואחד מכל ארבעה מקרים מוביל למעבר למסגרת סיעודית או למוות תוך שנה.

שבר אוסטיאופורוטי ראשון מהווה גורם סיכון משמעותי לשבר נוסף (24), ולכן נודעת חשיבות מרובה למניעה שניונית. כיום קיימים מספר טיפולים תרופתיים בעלי יעילות מוכחת למניעת שבר שני - bisphosphonates, teriparatide, denosumab (25,26) אך לפי נתונים אמריקאיים, פחות מרבע מהקשישים שעברו שבר ראשון מקבלים טיפול תרופתי מתאים למניעת שבר אוסטיאופורוטי נוסף (27).

מכנה: בני 66-84 (בשנת המדד) אשר עברו ניתוח לתיקון שבר בצוואר הירך בשנה שלפני שנת המדד

מונה: מבוטחים במכנה אשר רכשו במהלך שנת המדד טיפול תרופתי הולם: רכישה אחת לפחות של denosumab (prolia) או zoledronic acid (aclasta), או: 3 רכישות או יותר של ביספוספונאטים אחרים או teriparatide.

תרשים 219: שיעור מקבלי טיפול תרופתי הולם לאחר שבר בצוואר הירך לפי קובה, 2018



בשנת 2018, עמד שיעור קבלת טיפול תרופתי הולם בבני 65-85 לאחר שבר בצוואר הירך על 28.1%. השיעורים המתוקננים שנצפו בקופות השונות היו: כללית 29.2% (95% CI 27.1%, 31.3%), לאומית 26.0% (95% CI 20.5%, 31.4%), מאוחדת 22.1% (95% CI 16.9%, 27.3%), ומכבי 29.4% (95% CI 25.9%, 32.8%).

תכניות מדדים אחרות בעולם אומנם אינן כוללות מדד זה, אך במסגרת ה-HEDIS האמריקאי מדווח מדד אודות ביצוע בדיקת צפיפות עצם ו/או קבלת מרשם לטיפול תרופתי בחצי השנה שלאחר שבר בנשים בנות 65-85. בשנת 2016 דווח כי בקרב מבטחות Medicare שיעור העמידה במדד עמד על 80.5% ו-72.7%, בקרב מקבלות שירותים רפואיים באמצעות רשתות ספקי שירות שבהסכם Preferred Provider Organization, PPO או באמצעות ארגוני הבריאות - HMO, Health Maintenance Organization, בהתאמה (28). מחקרים שבחנו קבלת טיפול תרופתי לאחר שבר אוסטיאופורוטי דיווחו על שיעורים נמוכים, בדומה לנצפה בישראל: מחקר אמריקאי בקרב מבטחי Medicare ומבטחים בביטוחים הפרטיים דיווח כי רק 21% מהמטופלים קיבלו טיפול תרופתי הולם במהלך השנה שלאחר השחרור מאשפוז בגין שבר בצוואר הירך (29) מחקר אחר בחן את שיעור המטופלים לאחר שבר בצוואר הירך אשר קיבלו מרשם אחד לפחות לטיפול באוסטיאופורוזיס תוך שלושה חודשים ממועד השבר בקוריאה ובספרד. הנתונים מקוריאה התבססו על נתוני כלל האוכלוסיה בשנים 2007-2011 וכללו 57,631 מטופלים, מתוכם 39% קיבלו טיפול תרופתי הולם. נתוני הרשומות הרפואיות בולנסיה, ספרד מהשנים 2007-2012 כללו 17,167 מטופלים אחרי שבר והצביעו על כך כי 25% מכלל המטופלים שעברו שבר קיבלו טיפול תרופתי הולם תוך שלושה חודשים (30).

שיעור ביצוע ספירומטריה בקרב חולי COPD ואוכלוסייה בסיכון גבוה ל-COPD

הגדרת המדד: שיעור המבוטחים בני 50-74 אשר אובחנו החל מתאריך 01/01/2012 ואילך כסובלים מחסמת הריאות (COPD) או כמצויים בסיכון גבוה לחסמת הריאות, אשר ביצעו בדיקת ספירומטריה.


רציונאל: חסמת הריאות היא מחלה שכיחה וניתנת למניעה המהווה גורם תמותה ותחלואה חשוב בעולם וכרוכה בנטל כלכלי וחברתי משמעותי (31). שיעורי ההמצאות המדויקים של המחלה אינם וודאיים, בין היתר בשל תת-אבחנה ניכרת שלה (32,33). אבחנה מוקדמת ותקפה של חסמת הריאות חיונית לצורך הימנעות מגורמי הסיכון ומתן טיפול הולם. הללו מאפשרים בלימת ההתדרדרות המואצת בתפקודי הריאה, שיפור בתסמינים ובסיבולת הגופנית והורדה בתכיפות ההחמרות במחלה. בדיקת הבחירה לאבחנה של חסמת הריאות היא ספירומטריה. בדיקת הספירומטריה מאפשרת בנוסף לאישוש האבחנה של חסמת הריאות גם הערכה של חומרת ההפרעה החסימתית, המהווה גורם מנבא להתלקחויות תכופות ולתוצאים גרועים של המחלה (34). לאור חשיבות הספירומטריה לצורך אבחנה, הערכת החומרה וניטור מהלך המחלה מומלץ כי כל החולים המצויים בסיכון לחסמת הריאות יבצעו ספירומטריה.

מכנה: מבוטחים בני 50-74 אשר אובחנו החל מתאריך 01/01/2012 ואילך כסובלים מחסמת הריאות או כמצויים בסיכון גבוה לחסמת הריאות.

מונה: מספר המבוטחים במכנה אשר ביצעו לפחות בדיקה אחת של ספירומטריה מ־01/01/2011 ואילך.

הערות: מבוטחים הסובלים מחסמת הריאות מוגדרים לפי אבחנה של COPD או רכישה של תרופות ספציפיות ל-COPD. מבוטחים בסיכון גבוה ל-COPD מוגדרים לפי מצב עישון חיובי (בעבר או כיום) ואבחנת אסתמה או רכישת תרופות למחלות נשימתיות.

תרשים 220: שיעור ביצוע ספירומטריה לפי קופה, 2018



בשנת 2018, עמד שיעור ביצוע ספירומטריה בקרב חולי COPD ואוכלוסייה בסיכון גבוה ל־ COPD בני 50-75 על 75.5%. השיעורים המתוקננים שנצפו בקופות השונות היו: כללית 75.8% (CI 95% 75.1%, 77.3%), לאומית 77.5% (CI 95% 76.6%, 78.5%), מאוחדת 76.2% (CI 95% 75.1%, 77.3%), ומכבי 73.0% (CI 95% 72.0%, 73.9%).

מדד זה מאחד תחתיו את שיעור הביצוע של בדיקת ספירומטריה הן בקרב מאובחנים חדשים ב־COPD והן בקרב אוכלוסייה בסיכון גבוה למחלה זו. שיעור הביצוע בקרב חולי COPD בלבד בשנת 2016 עמד על 52.0%. הפרדה זו מאפשרת השוואה למדד דומה של ה־HEDIS, הבוחן ביצוע ספירומטריה בקרב חולי COPD בני 40 ומעלה. לפי מקור זה, עמד שיעור הביצוע בארה"ב בשנת 2017 על 31.6% ו־34.2% בקרב מבוטחי Medicaid ו־Medicare, בהתאמה, ועל 39.6% ו־41.6% בקרב בעלי ביטוחים מסוגים שונים (קבלת שירותים רפואיים באמצעות רשתות ספקי שירות שבהסכם - Preferred Provider Organization, PPO או באמצעות ארגוני הבריאות - HMO Health Maintenance Organization, בהתאמה) (35).

שיעור בעלי רמת LDL מאוזנת בקרב בני 35-74

הגדרת המדד: שיעור בעלי רמת LDL נמוכה מהיעד המוגדר לפי רמות סיכון לתחלואה לבבית.

רצינאל: טרשת עורקים כליליים, שיכולה להוביל להתקף לב, תעוקת חזה, שבץ מוחי ומוות פתאומי, מתבטאת בהיווצרות משקעים בכלי הדם, שאחד הגורמים החשובים להופעתם ולהחמרתם הוא רמה גבוהה של כולסטרול. להפחתת רמת הכולסטרול לרמות יעד יש חשיבות הן בהפחתת הסיכון לפיתוח מחלת לב בקרב בעלי גורמי סיכון למחלות אלו (מניעה ראשונית) והן במניעה של התקדמות טרשת בחולי לב ידועים (מניעה שלישונית). טיפול בעודף הכולסטרול כולל שינוי באורח החיים ונטילת תרופות ממשפחת הסטטינים (36).

המודל הנפוץ ביותר להערכת הסיכון לתחלואה במחלות לב בעשר השנים הקרובות מבוסס על מחקר הפרמינגהם ומשתמש בנוסחה המבוססת על מין, גיל, סך כולסטרול, כולסטרול HDL (גורם מגן), לחץ דם סיסטולי, טיפול ליתר לחץ דם ועישון. על פי המודל ניתן לחלק את האוכלוסייה הבוגרת כבעלת סיכון גבוה, בינוני או נמוך. בשנת 2001 פרסמה ועדת מומחים (Adult Treatment Panel III ATP-III, Panel III) המלצות לטיפול בעודף כולסטרול בדם (37), אשר עודכנו בשנת 2004 (38). על פי המלצות אלו, לאנשים בסיכון גבוה לתחלואה במחלות לב (סיכון לעשר שנים העולה על 20%) רמת ה-LDL המומלצת היא מתחת ל-100 מ"ג/ד"ל, לאנשים בסיכון בינוני (יותר מגורם סיכון אחד והערכת סיכון ל-10 שנים של עד 20%) ערך המטרה הוא מתחת ל-130 מ"ג/ד"ל, ולאנשים בסיכון נמוך (עד גורם סיכון אחד וסיכון של פחות מ-10% ב-10 שנים) הרמה המומלצת היא מתחת ל-160 מ"ג/ד"ל.

יש לציין כי קווי המנחה של האיגוד האירופאי לקרדיולוגיה (European Society of Cardiology ESC) והחברה האירופאית לטרשת העורקים (European Atherosclerosis Society EAS) מספטמבר 2019, קבעו יעדים מחמירים במידה ניכרת לרמות ה-LDL המומלצות למניעה ראשונית לפי קבוצות סיכון (39). אולם, נכון להיום הגדרת המדד נותרת ללא שינוי משנים קודמות, והם בהלימה לקווים המנחים של האיגוד הקרדיולוגי הישראלי, איגוד רופאי המשפחה, האיגוד הישראלי לרפואה פנימית והחברה לחקר מניעה וטיפול בטרשת העורקים משנת 2014.

מכנה: מבוטחים בני 35-74 אשר ביצעו בדיקת LDL או non-HDL (בקרב בני 35-54 לפחות בדיקה אחת במשך חמש השנים האחרונות; בקרב בני 55-74 לפחות בדיקה אחת בשנת המדד).


מונה: מספר המבוטחים במכנה עם רמת LDL נמוכה או שווה ליעד כפי שהוגדר ע"י ATP III (ראה לעיל). כמו כן, מבוצע ריבוד לפי רמת הסיכון הפרטנית לסיכון נמוך, בינוני או גבוה.

הערות: המדד המדווח הינו כאמור שיעור עמידה כולל ביעדי LDL לפי קבוצת סיכון למחלות לב בקרב בני 35-74. מדד זה מחושב על סמך שלושה מדדי עמידה ביעד בקבוצות הסיכון השונות:

- שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-160 מ"ג/ד"ל בקבוצת סיכון נמוך למחלות לב בבני 35-74
- שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-130 מ"ג/ד"ל בקבוצת סיכון בינוני למחלות לב בבני 35-74
- שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל בקבוצת סיכון גבוה למחלות לב בבני 35-74

הערכת הסיכון התבססה על מודל פרמינגהאם בהעדר מודל מתוקף לאוכלוסיה הישראלית הניתן למיחשוב בשלב זה.

תרשים 221: שיעור בעלי רמת LDL מאוזנת לפי קופה, 2018



בשנת 2018, עמד שיעור בעלי רמת LDL מאוזנת לפי קבוצת סיכון למחלות לב בקרב בני 35-74 על 84.2%. השיעורים המתוקננים שנצפו בקופות השונות היו: כללית 87.1% (CI 87.1%, 87.2%), לאומית 74.7% (CI 74.5%, 75.0%), מאוחדת 83.0% (CI 82.8%, 83.2%), ומכבי 80.4% (CI 80.2%, 80.5%).

שיעור זה מורכב מעמידה ביעד LDL בשלוש קבוצות סיכון: 90.4% בבעלי סיכון נמוך, 73.1% בבעלי סיכון בינוני, ו-34.4% בבעלי סיכון גבוה. מחקר חתך רב-מרכזי שבוצע בשנים 2015-2016 והשתרע על פני 452 מרכזים רפואיים ב-18 מדינות (באפריקה, אסיה, מזרח אירופה, אמריקה הלטינית, ועוד) בחן איזון כולסטרול במטופלים המקבלים טיפול תרופתי קבוע להפחתת רמות הכולסטרול. מחקר זה מצא כי שיעור האיזון בקבוצות הסיכון השונות עומד על כשליש מבעלי רמת-סיכון המוגדרת כגבוהה מאוד, מחצית מבעלי רמת סיכון גבוהה, וכשני-שלישים מבעלי רמת סיכון בינונית למחלות לב וכלי דם (40).

שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל או טיפול בסטטינים בעצימות גבוהה לאחר ניתוח מעקפים ו/או צנתור לבבי בקרב בני 35-80


הגדרת המדד: שיעור המבוטחים בני 35-80 אחרי ניתוח מעקפים ו/או צנתור לבבי טיפולי בעשר השנים שלפני שנת המדד, בעלי רמת כולסטרול LDL נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל או שקיבלו טיפול בסטטינים בעצימות גבוהה.

רציונאל: ניתוח מעקפים וצנתור לב טיפולי הינם פעולות פולשניות המבוצעות בחולים עם מחלה מתקדמת בעורקים הכליליים של הלב. חולים אלו נמצאים בדרגת סיכון גבוהה לאירועים לבביים חוזרים. מכיוון שרמה גבוהה של כולסטרול בדם מהווה אחד מגורמי הסיכון החשובים להחמרת טרשת עורקים, המשך טיפול נאות בהם צריך לכלול מניעה שלישונית, הכוללת בין השאר טיפול תרופתי לאיזון רמת הכולסטרול (36). הסטטינים הם קבוצת התרופות הנפוצות ביותר להפחתת רמות הכולסטרול מסוג LDL. על פי ההנחיות הרפואיות המקובלות, יש לטפל בתרופות להפחתת כולסטרול בכל חולי הלב שעברו טיפול פולשני (39). כמו כן, הנחיות האיגודים הישראליים קבעו כי בחולים עם מחלות לב רמת היעד של כולסטרול LDL היא מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל (41).

מכנה: מבוטחים בני 35-80 לאחר ניתוח מעקפים ו/או צנתור לבבי טיפולי בעשר השנים שלפני שנת המדד, אשר ביצעו בדיקת כולסטרול בשנת המדד.

מונה: מספר המבוטחים במכנה עם רמת LDL האחרונה המהימנה בשנת המדד (קרי: רמת טריגליצרידים באותה הבדיקה קטנה מ-300 מ"ג/ד"ל) נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל, או באם אין רמת LDL מהימנה אז: רמת non-HDL נמוכה או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל, או: רכשו לפחות 3 מרשמים של סטטינים בעצימות גבוהה בחודשים שונים בשנת המדד, ובתנאי שרמת LDL האחרונה המהימנה שנמדדה להם בשנת המדד נמוכה או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל.

תרשים 222: שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל או טיפול בסטטינים בעצמות גבוהה לפי קופה, 2018



בשנת 2018, מבין חולי הלב בני 35-80 שעברו ניתוח מעקפים או צנתור לב טיפולי, שיעור החולים שהגיעו ליעד האיזון של רמת LDL נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל או טופלו בסטטינים בעצימות גבוהה, עמד על 67.9%. השיעורים המתוקננים שנצפו בקופות השונות היו: כללית (69.6% (95% CI 69.3%, 70.0%), לאומית (57.8% (95% CI 56.7%, 58.9%), מאוחדת (79.2% (95% CI 78.3%, 80.0%), ומכבי (63.4% (95% CI 62.7%, 64.0%). עבור מדד זה לא נמצאו מקורות מידע בינלאומיים ברי-השוואה.

רשימת ספרות

1. Curry SJ, Krist AH, Owens DK, Barry MJ, Caughey AB, Davidson KW, et al. Screening for Cervical Cancer. JAMA [Internet]. 2018 Aug 21 [cited 2019 Sep 11];320(7):674. Available from: <http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jama.2018.10897>
2. Saslow D, Solomon D, Lawson HW, Killackey M, Kulasingam S, Cain J, et al. American Cancer Society, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, and American Society for Clinical Pathology Screening Guidelines for the Prevention and Early Detection of Cervical Cancer. CA Cancer J Clin [Internet]. 2012 Mar 14;62(3):147–72. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3801360/>
3. Dickinson J, Tsakonas E, Conner Gorber S, Lewin G, Shaw E, Singh H, et al. Recommendations on screening for cervical cancer. CMAJ. 2013 Jan;185(1):35–45.
4. [Internet]. משרד הבריאות. חוזר המנהל הכללי בנושא: מניעה וגילוי מוקדם של מחלות ממאירות. 2012 [cited 2019 Sep 11]. Available from: <http://www.cancer.org.il/template/default.aspx?PagelD=7655>
5. האיגוד הישראלי למילדות וגניקולוגיה. הצעה לעדכון נייר עמדה 101 משטח מצוואר הרחם כבדיקה. סריקה למניעת סרטן צוואר הרחם [Internet]. Vol. 3. 2015. Available from: <https://cdn.mednet.co.il/2015/04/1-עדכון18.3.15--פאפ-101סדק-נייר-.pdf>
6. WHO | Cervical cancer. WHO. 2018;
7. Quinn M, Babb P, Jones J, Allen E. Effect of screening on incidence of and mortality from cancer of cervix in England: evaluation based on routinely collected statistics. BMJ. 1999 Apr;318(7188):904–8.
8. OECD. Screening, survival and mortality for cervical cancer. In 2016 [cited 2019 Oct 22]. p. 136–7. Available from: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2016/screening-survival-and-mortality-for-cervical-cancer_health_glance_eur-2016-43-en
9. Cervical Cancer Screening 2019 | Cancer Trends Progress Report [Internet]. [cited 2019 Oct 27]. Available from: https://progressreport.cancer.gov/detection/cervical_cancer
10. Monto AS. The Risk of Seasonal and Pandemic Influenza: Prospects for Control. Clin Infect Dis [Internet]. 2009 Jan 1;48(Supplement_1):S20–5. Available from: <http://dx.doi.org/10.1086/591853>
11. Thompson WW, Comanor L, Shay DK. Epidemiology of Seasonal Influenza: Use of Surveillance Data and Statistical Models to Estimate the Burden of Disease. J Infect Dis [Internet]. 2006 Nov 1;194(Supplement_2):S82–91. Available from: <http://dx.doi.org/10.1086/507558>
12. 2018/9 עונת השפעת ה-2019. דוח מסכם עונת השפעת ה-2019 [Internet]. 2019 [cited 2019 Sep 11]. Available from: https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Flu2018_2019.pdf

13. 2019 [Internet]. 2019 [cited 2019 Sep 11]. Available from: https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/tadrich_Chisunim.pdf
14. OECD. Influenza vaccination rates (indicator) [Internet]. 2018. Available from: <https://data.oecd.org/healthcare/influenza-vaccination-rates.htm>
15. OECD. Health at a Glance 2017 [Internet]. 2017. Available from: http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2017_health_glance-2017-en
16. Donoghue J, Lader M. Usage of benzodiazepines: A review. *Int J Psychiatry Clin Pract.* 2010;14(2):78–87.
17. McMin J, Steel C, Bowman A. Investigation and management of unintentional weight loss in older adults. *BMJ* [Internet]. 2011 Mar 29;342. Available from: <http://www.bmj.com/content/342/bmj.d1732.abstract>
18. Department of Health and Children. Benzodiazepines : Good Practice Guidelines for Clinicians [Internet]. 2002. p. 1–30. Available from: <http://health.gov.ie/wp-content/uploads/2014/04/Benzodiazepines-Good-Practice-Guidelines.pdf>
19. Ashton CH. Benzodiazepines: How They Work and How to Withdraw [Internet]. Institute of Neuroscience, Newcastle University. 2002 [cited 2019 Sep 11]. Available from: <http://www.benzo.org.uk/manual/bzcha01.htm#15>
20. Neutel CI, Hirdes JP, Maxwell CJ, Patten SB. New evidence on benzodiazepine use and falls: the time factor. *Age Ageing.* 1996 Jul;25(4):273–8.
21. Thomas RE. Benzodiazepine use and motor vehicle accidents. Systematic review of reported association. *Can Fam Physician.* 1998 Apr;44:799–808.
22. OECD. Chronic Benzodiazepine Use: Number of patients per 1000, aged 65 years and over who have prescriptions for benzodiazepines for more than 365 days, 2015 (or nearest year). In 2017 [cited 2018 Dec 2]. Available from: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2017/chronic-benzodiazepine-use-number-of-patients-per-1000-aged-65-years-and-over-who-have-prescriptions-for-benzodiazepines-for-more-than-365-days-2015-or-nearest-year_health
23. International Osteoporosis Foundation. Facts and Statistics. Available from: <https://www.iofbonehealth.org/facts-statistics#category-14>
24. National Osteoporosis Society (UK). Effective Secondary Prevention of Fragility Fractures 2015. [cited 2019 Oct 2]; Available from: <https://theros.org.uk/media/2082/clinical-standards-for-fracture-liaison-services.pdf>
25. Conley RB et al. Secondary Fracture Prevention: Consensus Clinical Recommendations from a Multistakeholder Coalition. *JBMR* 2019 [Internet]. [cited 2019 Oct 2]; Available from: <https://asbmr.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbmr.3877>
26. Saito T et al. Effectiveness of anti-osteoporotic drugs to prevent secondary fragility fractures: systematic review and meta-analysis [Internet]. [cited 2019 Oct 2]. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28770272>


27. Bauer DC. Osteoporosis treatment after hip fracture – bad news and getting worse. [cited 2019 Oct 2]; Available from: <https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2688341>
28. HEDIS. Osteoporosis Testing and Management in Older Women - NCQA [Internet]. [cited 2019 Oct 27]. Available from: <https://www.ncqa.org/hedis/measures/osteoporosis-testing-and-management-in-older-women/>
29. Solomon DH, Johnston SS, Boytsov NN, McMorrow D, Lane JM, Krohn KD. Osteoporosis medication use after hip fracture in U.S. patients between 2002 and 2011. *J Bone Miner Res.* 2014;29(9):1929–37.
30. Kim SC, Kim MS, Sanf  lix-Gimeno G, Song HJ, Liu J, Hurtado I, et al. Use of Osteoporosis Medications after Hospitalization for Hip Fracture: A Cross-national Study. *Am J Med.* 2015 May 1;128(5):519-526.e1.
31. The top 10 causes of death [Internet]. [cited 2019 Sep 11]. Available from: <http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death>
32. Soriano JB, Abajobir AA, Abate KH, Abera SF, Agrawal A, Ahmed MB, et al. Global, regional, and national deaths, prevalence, disability-adjusted life years, and years lived with disability for chronic obstructive pulmonary disease and asthma: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. *Lancet Respir Med.* 2018 Jan;5(9):691–706.
33. Stav D, Raz M. Prevalence of chronic obstructive pulmonary disease among smokers aged 45 and up in Israel. *Isr Med Assoc J.* 2007 Nov;9(11):800–2.
34. Vestbo J, Hurd SS, Agust   AG, Jones PW, Vogelmeier C, Anzueto A, et al. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. *Am J Respir Crit Care Med* [Internet]. 2013 Feb 15 [cited 2019 Sep 11];187(4):347–65. Available from: <http://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/rccm.201204-0596PP>
35. HEDIS. Use of Spirometry Testing in the Assessment and Diagnosis of COPD (SPR) [Internet]. 2017. Available from: <https://www.ncqa.org/hedis/measures/use-of-spirometry-testing-in-the-assessment-and-diagnosis-of-copd/>
36. Silverman MG, Ference BA, Im K, Wiviott SD, Giugliano RP, Grundy SM, et al. Association Between Lowering LDL-C and Cardiovascular Risk Reduction Among Different Therapeutic Interventions: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA.* 2016 Sep;316(12):1289–97.
37. Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) final report. *Circulation.* 2002 Dec;106(25):3143–421.
38. Grundy SM, Cleeman JI, Merz CNB, Brewer HBJ, Clark LT, Hunninghake DB, et al. Implications of recent clinical trials for the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III guidelines. *Circulation.* 2004 Jul;110(2):227–39.
39. Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk: The Task Force for the management of dyslipidaemias

of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J [Internet]. 2019; Available from: <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz455>

40. Danchin N, Almahmeed W, Al-Rasadi K, Azuri J, Berrah A, Cuneo CA, et al. Achievement of low-density lipoprotein cholesterol goals in 18 countries outside Western Europe: The International Cholesterol management Practice Study (ICLPS). Eur J Prev Cardiol. 2018 Jul;25(10):1087–94.
41. החברה לחקר מניעה וטיפול בטרשת עורקים, האיגוד הקרדיולוגי בישראל, בישראל, המשפחה אר. עדכון ההנחיות לטיפול בהיפרליפידמיה [Internet]. [cited 2017 Dec 24]. Available from: <http://www.israel-surgery.org.il/beriatric-position-paper0117.pdf>

אזור גיאוגרפי סטטיסטי	אג"ס
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה	למ"ס
המרכז הלאומי לבקרת מחלות	מלב"ם
מילימטר כספית	ממ"כ
Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors	ACE-I
American Diabetes Association	ADA
Agency for Healthcare Research and Quality	AHRQ
Asthma Medication Ratio	AMR
Angiotensin Receptor Blockers	ARB
American Society of Clinical Oncology	ASCO
Adult Treatment Panel III	ATP-III
Body Mass Index	BMI
Chronic Obstructive Pulmonary Disease	COPD
Defined Daily Dose	DDD
Estimated Glomerular Filtration Rate	eGFR
European Atherosclerosis Society	EAS
European Society of Cardiology	ESC
Glomerular Filtration Rate	GFR
Glycated Hemoglobin	HbA1c
High-Density Lipoprotein	HDL
Health Maintenance Organization	HMO
The Healthcare Effectiveness Data and Information Set	HEDIS
Israeli National Health Interview Survey	INHIS
Low-Density Lipoprotein	LDL
Organization for Economic Cooperation and Development	OECD
Preferred Provider Organization	PPO
World Health Organization	WHO

נספח



מדדי איכות וממצאים לשנת 2018 לפי חברות בקופת חולים

מבוא

בנספח מתפרסמות תוצאות מדדי האיכות לפי קופות החולים, בנוסף לפרסום הנתונים הלאומיים לאורך הדו"ח. פרסום זה מספק מידע רלבנטי לכל המעורבים, בכלל זה קופות החולים, משרד הבריאות, איגודים רפואיים וכמובן ציבור המבוטחים. לציבור הרחב, מידע על מגוון מדדי האיכות ברמה הלאומית ולפי קופה עשוי לתרום להעמקת הידע על פעולות מומלצות ולסייע בקידום בריאותם של המבוטחים. עבור הקופות, בחינת מיקומן היחסי עשויה לתרום ליצירת תהליכי שיפור, ואומנם מדו"ח שהוכן עבור ה-US Agency for Healthcare Research and Quality וכן כמסקנה מפרסום מדדי איכות בארה"ב, עולה כי קהל היעד העיקרי של הממצאים היו ספקי השרות עצמם (1). כמו כן, חשוב להדגיש כי למדדים המוצגים בדו"ח מספר מגבלות ביחס למידת הדיוק שבה הם מציגים את איכות הטיפול הניתנת בקופה.

ראשית, כדי שהמדדים ישקפו נאמנה את איכות הטיפול הניתן בקופה יש צורך לנטרל את ההשפעה הנובעת מהבדלים בהרכב האוכלוסייה של החברים בקופות השונות. כלומר, יש לתקן את ממצאי המדדים לפי מאפייני המבוטחים של כל קופה וקופה. במסגרת זו מאפיינים חשובים הם גיל, מין ומצב חברתי-כלכלי. הקשר בין מצב חברתי-כלכלי ומצב בריאות והתנהגויות בריאותיות הודגם היטב בארץ ובעולם (2-4), וכן הודגמו הבדלים בהרכב הקופות מבחינת המצב החברתי-כלכלי של מבוטחיהן (5). ריבוד היא אחת השיטות המקובלות כדי להביא בחשבון את מאפייני המבוטחים, ולפיכך המדדים מפורסמים בנספח לפי קופות ובריבוד לפי מין, קבוצות גיל ומצב חברתי-כלכלי (1). כפי שמפורט בפרק השיטות, מצב חברתי-כלכלי נקבע בדו"ח זה על סמך האשכול אליו משויך האזור הסטטיסטי של כתובת המגורים, שיוך העובר טיוב והשלמה על ידי חברת פוינטס. עבור 4.4% מהמבוטחים כתובות המגורים לא היו שלמות, ולכן הם לא נכללים בממצאים המוצגים בנספח זה.

שנית, אומנם המדדים המפורסמים בדו"ח מתייחסים לאיכות הטיפול הקליני כפי שמותווה בהנחיות המקצועיות המקובלות בארץ ובעולם ותואמים את הניסיון הבינלאומי בתחום מדדי האיכות. אולם, חלק מהמדדים הם מדדי תהליך ואחרים מהווים מדדי ביניים (Intermediate outcomes). יתכן כי עבור המבוטחים, המדדים הרלבנטיים יותר הם תוצאי בריאות אמיתיים ולא בדיקות מעבדה המשקפות רק באופן חלקי את מצב בריאותו של המבוטח (6).

שלישית, הדו"ח עוסק במגוון היבטים של רפואת הקהילה בישראל ומציג תוצאות בתשעה תחומים חשובים. אולם, מובן שהדו"ח אינו מקיף את מכלול פעילות רפואת הקהילה הנעשית בקופות. כך למשל, במסגרת בריאות ילדים ובני נוער הדו"ח כולל ארבעה מדדים בלבד - ביצוע בדיקת המוגלובין בתינוקות, הימצאות אנמיה בתינוקות וביצוע מדידות גובה ומשקל בקרב ילדים ובקרב בני נוער. כמו כן, היבטים וממדים חשובים של רפואת הקהילה כמו זמינות ונגישות הטיפול ושביעות הרצון של המבוטחים אינם מהווים חלק מהדו"ח.

רביעית, התחום של מדידת איכות ברפואה הוא מורכב ומחייב, בין השאר, בחינה מתמשכת, עדכונים שוטפים הכוללים התאמות של מדדים קיימים, הוספת מדדים חדשים וגריעת מדדים, שיפור והאחדה של מערכות המידע כמו גם ביצוע מבדקים מפורטים. כל אלו מהווים רכיבים בלתי

נפרדים של התוכנית כפי שמפורט בפרק השיטות ויש לקחת אותם בחשבון כאשר בוחנים את הממצאים ברמה הלאומית ולפי קופות. כך למשל, מדד חדש מאופיין בד"כ בשעורי ביצוע נמוכים או בינוניים, המשתפרים עם הזמן. כאשר מדד חדש המתוסף לתוכנית הלאומית שימש עוד קודם לכן כמדד פנימי בחלק מהקופות, הרי הן כבר התנסו בתהליך השיפור, בעוד שהקופות שהנהיגו אותו לראשונה השנה ידגימו רמות נמוכות יחסית.

בשל המגבלות המפורטות לעיל, הפרסום לפי קופות החולים כולל את כלל המדדים למעט מדדים חדשים. כמו כן, מדדי הסוכרת בילדים אינם מוצגים בשל שכיחות נמוכה (ראה להלן). לבסוף, ראוי להדגיש כי בחינת הממצאים לפי קופות מחייבת התייחסות למורכבות המדידה ולמגבלות המפורטות ומצריכה זהירות בפרוש הממצאים.

סימונים בלוחות

אומדנים המבוססים על תאים בעלי שכיחות נמוכה חשופים יותר לטעויות ולפיכך מוצג מידע רק עבור תאים ששכיחותם עולה על 150.

רשימת ספרות:

1. Mark W. Friedberg, Cheryl L. Damberg, Elizabeth A. McGlynn JLA. Methodological Considerations in Generating Provider Performance Scores for Use in Public Reporting A Guide for Community Quality Collaboratives. 2011.
2. Jaffe DH, Eisenbach Z, Neumark YD, Manor O. Individual, household and neighborhood socioeconomic status and mortality: a study of absolute and relative deprivation. Soc Sci Med. 2005 Mar;60(5):989-97.
3. Marmot M, Allen J, Bell R, Bloomer E, Goldblatt P. WHO European review of social determinants of health and the health divide. Lancet (London, England). 2012 Sep;380(9846):1011-29.
4. משרד הבריאות. מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי משרד הבריאות. Inequality in Health Care and Response Methods [Internet]. 2015. משרד הבריאות. Available from: <https://www.health.gov.il/publicationsfiles/inequality-2015.pdf>
5. 2015 חקירת חוליים. חקירות בקופת חולים 2015 [Internet]. 2016. Available from: https://www.btl.gov.il/Publications/survey/Documents/seker_280.pdf
6. Godlee F. Outcomes that matter to patients. BMJ [Internet]. 2012 Jan 11;344. Available from: <http://www.bmj.com/content/344/bmj.e318.abstract>

מאוחדת				סכבי				לאומית				כללית				SES/גיל
4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	

קידום בריאות

שיעור התיעוד של מרכיבי BMI בקרב בני 20-64

67.9%	66.8%	69.9%	73.8%	71.0%	77.1%	75.9%	77.1%	94.3%	94.2%	93.1%	91.4%	86.7%	86.8%	84.9%	85.8%	20-24	זכר
76.0%	72.2%	71.2%	72.4%	67.6%	71.8%	72.6%	74.0%	89.9%	91.5%	91.6%	91.5%	83.5%	84.8%	84.7%	86.4%	25-34	
86.1%	83.4%	80.3%	81.2%	72.4%	75.9%	77.5%	79.7%	91.6%	91.9%	92.7%	92.5%	87.9%	89.2%	89.3%	92.1%	35-44	
92.1%	92.0%	89.5%	89.9%	78.4%	81.9%	83.8%	85.4%	94.4%	94.7%	94.9%	94.6%	92.5%	94.0%	94.3%	95.8%	45-54	
93.4%	94.0%	92.1%	92.1%	86.6%	88.7%	90.2%	91.0%	97.2%	97.1%	97.2%	96.7%	97.1%	97.9%	97.8%	98.2%	55-64	
82.0%	83.1%	87.3%	92.1%	82.3%	88.7%	91.5%	93.0%	98.1%	97.9%	97.2%	97.5%	90.3%	92.8%	91.9%	92.1%	20-24	נקבה
88.5%	88.5%	90.3%	93.4%	82.9%	87.1%	88.4%	90.8%	96.0%	97.0%	97.0%	97.9%	90.1%	91.9%	92.3%	93.6%	25-34	
92.1%	91.7%	91.1%	93.3%	79.9%	83.6%	85.7%	89.3%	96.0%	96.1%	96.4%	96.8%	91.6%	93.2%	94.0%	95.8%	35-44	
94.5%	94.1%	93.9%	94.1%	79.7%	83.7%	86.7%	89.4%	95.7%	96.5%	96.7%	96.4%	94.2%	96.0%	96.7%	97.7%	45-54	
94.3%	95.1%	94.8%	95.2%	86.6%	89.6%	91.2%	93.2%	98.4%	98.0%	98.2%	97.9%	98.0%	98.4%	98.7%	99.0%	55-64	

שיעור ההמצאות של תת משקל בקרב בני 20-64

4.5%	3.4%	4.2%	4.7%	7.2%	6.1%	6.0%	4.7%	4.9%	4.8%	5.2%	4.3%	7.3%	6.9%	5.2%	4.1%	20-24	זכר
2.1%	2.7%	3.5%	4.0%	2.4%	2.5%	2.9%	3.6%	2.8%	3.0%	3.2%	3.8%	2.1%	3.0%	3.4%	3.0%	25-34	
1.1%	1.2%	1.7%	2.2%	0.7%	0.8%	1.4%	1.4%	1.0%	1.3%	1.5%	1.9%	1.1%	1.3%	1.7%	1.5%	35-44	
0.6%	0.7%	1.0%	1.5%	0.3%	0.4%	0.7%	0.9%	0.6%	0.7%	0.9%	1.3%	0.5%	0.8%	1.1%	1.0%	45-54	
0.6%	0.6%	1.0%	1.2%	0.2%	0.3%	0.6%	0.8%	0.6%	0.7%	1.0%	1.3%	0.4%	0.6%	1.1%	1.2%	55-64	
12.6%	8.2%	7.5%	5.2%	11.3%	9.3%	6.7%	6.4%	11.3%	8.8%	9.0%	7.1%	11.0%	10.8%	10.2%	7.2%	20-24	נקבה
6.7%	5.6%	5.8%	4.3%	6.9%	5.5%	4.7%	3.5%	7.0%	6.3%	5.0%	4.4%	8.3%	7.4%	6.9%	4.6%	25-34	
3.9%	3.1%	3.1%	2.3%	4.3%	3.2%	2.7%	1.6%	4.5%	3.2%	2.5%	1.8%	5.1%	4.4%	3.5%	1.7%	35-44	
2.7%	1.9%	1.9%	1.5%	2.5%	1.9%	1.6%	0.9%	2.3%	1.8%	1.6%	1.1%	2.7%	2.1%	1.6%	0.8%	45-54	
1.4%	1.0%	1.2%	1.5%	1.7%	1.2%	1.0%	0.7%	1.4%	1.1%	0.9%	1.0%	1.4%	1.2%	1.1%	0.7%	55-64	

שיעור ההמצאות של עודף משקל בקרב בני 20-64

20.0%	27.5%	29.2%	27.6%	24.5%	21.3%	26.0%	28.9%	23.6%	24.9%	27.7%	28.4%	19.3%	23.5%	26.8%	26.4%	20-24	זכר
29.1%	32.5%	34.2%	33.1%	27.7%	31.2%	32.1%	32.7%	27.5%	32.3%	33.5%	33.2%	27.3%	30.6%	32.0%	33.2%	25-34	
39.2%	41.5%	40.1%	38.9%	40.0%	42.3%	40.3%	39.2%	40.8%	41.5%	41.6%	39.1%	38.6%	39.3%	39.0%	40.9%	35-44	
46.4%	45.1%	42.9%	40.1%	46.7%	45.8%	42.5%	41.8%	46.5%	46.3%	43.2%	41.5%	45.3%	43.9%	42.4%	43.0%	45-54	
48.3%	46.3%	43.4%	41.0%	49.5%	47.8%	43.2%	42.3%	47.2%	47.6%	43.7%	40.0%	48.9%	46.3%	43.5%	42.2%	55-64	
18.8%	22.0%	24.3%	28.1%	18.4%	21.9%	26.2%	30.5%	15.8%	22.2%	24.4%	29.3%	15.8%	18.1%	20.2%	23.5%	20-24	נקבה
22.7%	27.9%	29.5%	32.9%	25.8%	28.7%	29.6%	32.1%	23.8%	27.6%	29.0%	31.5%	19.3%	22.4%	24.7%	28.1%	25-34	
26.4%	30.1%	31.3%	34.7%	27.2%	29.5%	31.2%	33.6%	26.7%	29.7%	32.1%	34.1%	23.3%	26.6%	29.4%	34.1%	35-44	
29.2%	32.2%	33.5%	32.8%	27.6%	31.2%	32.6%	32.9%	31.2%	33.0%	32.8%	34.0%	28.4%	31.0%	33.1%	33.2%	45-54	
34.0%	35.7%	33.9%	30.5%	33.3%	35.7%	34.9%	32.7%	34.1%	36.4%	34.3%	33.6%	34.8%	35.9%	34.3%	31.4%	55-64	

שיעור ההמצאות של השמנת יתר בקרב בני 20-64

9.8%	10.2%	12.7%	18.3%	8.2%	11.8%	14.6%	18.1%	6.1%	10.3%	11.0%	14.5%	12.0%	13.7%	13.5%	12.8%	20-24	זכר
9.6%	14.6%	17.7%	22.7%	8.9%	12.9%	17.5%	22.2%	9.3%	12.0%	16.4%	19.2%	8.1%	11.5%	14.6%	16.9%	25-34	
15.1%	22.9%	27.3%	31.9%	14.1%	20.1%	25.7%	31.8%	14.3%	20.6%	24.5%	29.3%	12.9%	17.3%	21.6%	24.1%	35-44	
20.8%	27.8%	32.1%	36.4%	20.6%	27.4%	32.1%	36.3%	23.4%	27.6%	31.0%	32.2%	20.0%	24.8%	27.3%	28.9%	45-54	
25.6%	31.0%	33.7%	36.9%	23.7%	28.9%	33.2%	36.1%	26.9%	28.2%	31.5%	33.7%	24.3%	27.6%	29.0%	30.5%	55-64	
8.8%	13.6%	18.4%	22.0%	5.9%	11.6%	17.1%	18.9%	7.5%	12.5%	15.8%	19.0%	6.7%	10.9%	12.9%	15.8%	20-24	נקבה
13.1%	19.0%	22.3%	25.8%	11.9%	18.2%	22.6%	26.2%	13.5%	17.8%	22.0%	26.3%	9.0%	13.8%	16.9%	21.2%	25-34	
16.4%	21.8%	28.5%	36.6%	15.0%	21.4%	27.1%	35.5%	17.3%	22.4%	27.8%	37.0%	12.5%	17.6%	24.0%	32.4%	35-44	
18.0%	24.3%	32.8%	46.1%	16.6%	23.9%	31.8%	42.8%	18.4%	25.5%	35.0%	43.5%	17.8%	24.6%	33.7%	45.8%	45-54	
22.6%	30.7%	40.9%	52.3%	19.9%	28.9%	38.9%	46.9%	23.5%	30.3%	40.8%	47.7%	22.2%	28.9%	39.0%	52.5%	55-64	

שיעור תיעוד מצב עישון בקרב בני 16-74

54.4%	53.6%	53.5%	55.8%	84.5%	85.5%	86.7%	86.5%	84.9%	86.2%	86.5%	83.7%	98.9%	99.1%	99.5%	99.6%	15-24	זכר
65.5%	63.4%	62.5%	60.5%	86.6%	89.1%	89.7%	89.7%	87.4%	88.0%	87.7%	83.6%	97.7%	98.3%	99.0%	99.4%	25-34	
72.2%	70.7%	69.0%	66.8%	66.9%	71.2%	74.1%	73.7%	89.0%	89.3%	89.8%	87.1%	95.1%	96.6%	97.6%	98.3%	35-44	
77.4%	76.4%	76.3%	75.1%	69.0%	74.0%	77.5%	78.0%	91.2%	92.6%	92.7%	89.8%	93.4%	95.7%	96.9%	97.8%	45-54	
82.3%	82.3%	82.5%	81.9%	79.6%	83.6%	85.9%	86.3%	95.3%	95.7%	95.1%	93.5%	95.5%	97.0%	98.0%	98.6%	55-64	
92.1%	91.9%	91.8%	90.0%	91.7%	93.4%	93.0%	93.7%	97.4%	97.8%	97.1%	96.8%	97.3%	98.1%	98.7%	99.1%	65-74	
66.0%	63.0%	63.7%	65.9%	90.2%	91.5%	92.1%	90.3%	92.1%	92.9%	91.8%	90.8%	99.3%	99.5%	99.7%	99.8%	15-24	נקבה
84.2%	85.3%	86.4%	88.0%	96.9%	97.5%	97.7%	97.6%	95.8%	96.8%	96.6%	97.0%	99.3%	99.6%	99.7%	99.9%	25-34	
83.8%	81.9%	82.4%	84.2%	77.8%	78.7%	78.8%	77.7%	95.5%	95.6%	95.2%	95.4%	96.6%	97.7%	98.3%	98.4%	35-44	
80.5%	79.4%	81.4%	81.7%	71.1%	74.6%	76.9%	76.0%	95.2%	95.8%	95.4%	94.1%	94.0%	95.9%	97.0%	97.3%	45-54	
83.6%	84.0%	85.7%	85.7%	80.7%	82.8%	84.0%	85.3%	97.5%	97.3%	97.0%	96.0%	95.3%	97.1%	97.9%	98.2%	55-64	
92.0%	92.2%	92.1%	91.7%	90.2%	91.5%	91.6%	92.2%	98.0%	97.9%	97.7%	97.4%	97.0%	97.9%	98.4%	98.6%	65-74	

כללית				לאומית				מכבי				מאוחדת				נ/ל/SES
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	

שיעור עישון בקרב בני 16-74

15-24	18.1%	16.6%	13.0%	7.7%	32.1%	35.7%	28.8%	24.3%	12.5%	12.3%	8.1%	4.8%	34.2%	28.7%	26.1%	20.1%	זכר
25-34	37.8%	35.6%	29.5%	22.5%	48.5%	50.8%	43.7%	38.5%	21.6%	26.3%	21.7%	18.1%	43.5%	41.2%	37.2%	35.1%	
35-44	38.7%	35.5%	26.6%	19.6%	45.7%	48.5%	40.6%	33.1%	24.9%	30.5%	22.0%	16.7%	40.0%	38.2%	33.4%	30.0%	
45-54	41.4%	36.4%	25.4%	15.4%	44.9%	46.6%	37.8%	29.5%	28.3%	30.1%	20.7%	13.2%	42.5%	37.0%	30.9%	24.0%	
55-64	39.0%	33.2%	22.0%	13.2%	41.3%	41.2%	32.7%	27.2%	25.6%	26.6%	19.0%	11.2%	38.9%	34.1%	27.9%	21.9%	
65-74	29.3%	21.4%	13.8%	8.8%	32.3%	29.5%	24.2%	17.7%	17.0%	17.6%	12.7%	8.2%	28.5%	22.8%	18.9%	15.2%	נקבה
15-24	1.2%	4.6%	6.4%	5.2%	5.2%	11.0%	14.8%	15.3%	1.5%	4.2%	4.7%	4.2%	5.4%	8.8%	12.9%	14.1%	
25-34	4.5%	14.5%	15.8%	13.5%	9.9%	20.9%	26.6%	28.7%	4.0%	10.6%	9.7%	8.6%	6.3%	14.1%	20.2%	24.4%	
35-44	5.4%	15.6%	15.6%	11.8%	10.0%	21.1%	26.3%	23.3%	6.5%	14.4%	11.2%	8.1%	7.9%	17.2%	20.9%	20.5%	
45-54	8.9%	17.1%	16.9%	12.0%	13.4%	22.5%	25.6%	22.2%	9.0%	17.1%	13.4%	9.4%	11.2%	19.7%	21.7%	18.4%	
55-64	11.6%	18.3%	16.6%	12.3%	17.5%	22.4%	26.0%	22.8%	10.5%	16.1%	14.0%	10.2%	12.6%	19.5%	20.9%	17.9%	
65-74	8.1%	11.2%	10.2%	8.2%	12.7%	14.5%	17.7%	16.1%	6.1%	9.6%	9.1%	7.7%	8.0%	12.0%	13.4%	12.2%	

בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן

שיעור הביצוע של ממגרפיה לגילוי מוקדם של סרטן השד בגשים בנות 50-74

50-54	68.5%	67.6%	69.2%	70.9%	49.8%	55.4%	61.0%	63.0%	74.9%	78.0%	81.0%	80.1%	61.1%	71.3%	75.2%	75.7%	נקבה
55-59	70.8%	69.0%	70.6%	71.4%	50.8%	58.0%	63.1%	64.4%	76.4%	79.9%	80.9%	79.4%	62.6%	72.0%	74.9%	75.3%	
60-64	71.2%	71.1%	72.7%	73.2%	52.8%	61.9%	63.7%	66.2%	77.9%	80.7%	81.7%	79.0%	60.4%	74.1%	75.6%	75.3%	
65-69	70.0%	72.8%	75.5%	76.5%	56.6%	62.2%	65.6%	64.2%	77.5%	80.5%	81.0%	78.5%	62.3%	72.8%	76.8%	75.4%	
70-74	56.5%	63.7%	71.2%	74.5%	49.2%	58.4%	60.4%	62.6%	71.5%	76.6%	77.4%	76.4%	56.9%	70.9%	73.8%	74.0%	

שיעור הביצוע של בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס בקרב בני 50-74

50-54	47.2%	46.3%	52.0%	57.3%	40.9%	46.8%	47.9%	52.4%	54.6%	58.9%	56.0%	63.2%	45.8%	50.6%	54.8%	58.0%	זכר
55-59	52.7%	54.0%	59.8%	65.5%	47.4%	54.5%	60.1%	64.8%	60.4%	63.6%	67.4%	71.7%	53.0%	59.9%	63.9%	67.0%	
60-64	58.9%	59.3%	65.4%	70.9%	53.4%	61.4%	64.6%	66.7%	67.4%	70.3%	72.6%	75.1%	59.2%	66.2%	69.0%	68.9%	
65-69	64.7%	65.8%	71.0%	75.1%	62.2%	66.7%	70.6%	74.1%	72.7%	75.0%	76.6%	78.8%	61.8%	71.4%	74.2%	76.3%	
70-74	62.5%	65.7%	72.8%	76.3%	64.3%	68.9%	74.4%	75.5%	73.6%	77.2%	78.4%	79.7%	65.3%	72.6%	76.8%	76.7%	
50-54	56.5%	53.0%	54.1%	56.7%	46.8%	51.2%	52.4%	54.6%	56.2%	58.5%	59.5%	60.2%	51.3%	56.1%	58.0%	57.2%	נקבה
55-59	61.3%	59.1%	62.5%	65.4%	54.4%	60.5%	62.6%	63.5%	63.4%	67.0%	67.6%	69.0%	57.4%	63.4%	65.1%	66.8%	
60-64	65.3%	64.2%	67.8%	70.1%	58.6%	66.1%	67.5%	70.2%	69.3%	71.1%	72.9%	73.3%	61.5%	69.6%	70.4%	70.0%	
65-69	66.4%	68.2%	71.9%	74.8%	66.0%	69.6%	72.3%	72.3%	73.5%	76.1%	75.8%	76.2%	64.0%	72.8%	74.9%	73.4%	
70-74	61.5%	64.9%	71.9%	74.3%	64.1%	69.6%	73.6%	71.9%	73.5%	76.5%	77.1%	76.7%	65.0%	73.6%	74.5%	73.9%	

שיעור הנשים בגילאים 35-54 אשר ביצעו בדיקות סיקור לסרטן צוואר הרחם ב-3 השנים האחרונות

35-39	31.4%	46.2%	57.1%	62.0%	31.4%	41.5%	49.9%	49.7%	55.5%	63.9%	69.7%	70.3%	28.5%	45.5%	55.2%	60.2%	נקבה
40-44	30.9%	44.3%	55.7%	60.0%	31.8%	42.4%	50.4%	47.8%	55.4%	63.1%	68.4%	69.3%	29.8%	47.3%	56.0%	59.0%	
45-49	29.2%	41.4%	52.4%	57.4%	31.3%	42.8%	50.2%	49.4%	55.4%	61.5%	67.2%	68.8%	29.2%	47.4%	54.6%	59.6%	
50-54	24.2%	35.0%	46.3%	51.3%	27.3%	37.8%	44.4%	44.1%	51.3%	57.9%	63.4%	66.3%	25.8%	41.9%	50.8%	53.9%	

שיעור הנשים בגילאים 35-54 אשר לא ביצעו בדיקות סיקור לסרטן צוואר הרחם ב-5 השנים האחרונות

35-39	55.7%	40.1%	27.9%	22.5%	58.7%	44.7%	34.7%	39.8%	30.6%	20.6%	14.8%	15.1%	60.6%	37.4%	28.5%	23.1%	נקבה
40-44	56.7%	41.5%	29.3%	25.3%	57.3%	44.4%	36.2%	39.5%	31.3%	22.1%	16.7%	16.0%	57.9%	37.4%	28.0%	25.4%	
45-49	58.9%	44.5%	32.8%	28.6%	59.0%	44.0%	36.5%	38.9%	31.0%	24.0%	18.6%	17.6%	58.0%	36.7%	29.5%	26.0%	
50-54	64.0%	50.9%	39.0%	34.1%	62.1%	48.3%	41.5%	44.5%	34.4%	28.5%	22.5%	20.5%	62.0%	42.2%	33.8%	30.6%	

ילדים ובני נוער

שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין בתינוקות בני 9-18 חודשים

זכר	1	91.6%	89.8%	90.2%	90.5%	76.6%	79.9%	81.9%	82.6%	92.5%	94.0%	94.4%	78.9%	79.2%	81.1%	84.8%
נקבה	1	90.5%	89.1%	89.2%	89.1%	76.3%	81.0%	83.0%	81.5%	92.2%	94.1%	94.1%	79.0%	78.4%	81.3%	85.5%

שיעור ההימצאות של אנמיה בקרב תינוקות בני 9-18 חודשים

זכר	1	9.1%	8.5%	9.6%	9.4%	9.3%	7.1%	6.1%	4.8%	8.7%	7.1%	6.2%	10.8%	10.8%	6.4%	6.4%
נקבה	1	8.5%	8.7%	8.8%	9.7%	8.6%	7.3%	6.2%	5.7%	7.7%	7.6%	6.1%	10.1%	8.0%	7.1%	5.6%

שיעור התינוקות של מדידת גובה ומשקל בקרב ילדים בני 7

זכר	7	95.4%	92.1%	91.9%	90.9%	69.9%	77.5%	81.2%	80.0%	60.7%	60.6%	62.5%	63.6%	63.3%	65.3%	69.0%
נקבה	7	94.5%	91.7%	92.2%	89.5%	69.8%	75.9%	80.8%	79.0%	60.3%	61.3%	60.4%	62.4%	60.3%	66.1%	67.7%

שיעור ההימצאות של רזון (Thinness) בקרב ילדים שמלאו להם 7 שנים בשנת המדד

זכר	7	7.9%	4.9%	4.2%	4.1%	4.7%	4.4%	4.9%	4.0%	1.9%	3.6%	3.4%	5.2%	4.9%	4.2%	4.3%
נקבה	7	7.1%	3.7%	3.1%	2.9%	2.9%	2.9%	3.1%	2.3%	1.4%	1.7%	1.8%	4.1%	4.4%	2.8%	2.8%

מאוחדת				סכבי				לאומית				כללית				גיל/SES
4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	

שיעור ההימצאות של עודף משקל בקרב ילדים שמלאו להם 7 שנים בשנת המדד

12.1%	13.3%	13.7%	12.8%	12.1%	12.3%	12.3%	11.4%	10.9%	11.6%	12.2%	9.4%	10.1%	10.2%	10.7%	8.8%	זכר 7
15.5%	13.9%	14.8%	13.2%	13.3%	13.2%	13.6%	13.4%	11.2%	12.8%	13.9%	10.0%	11.1%	11.6%	11.5%	8.9%	נקבה 7

שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב ילדים שמלאו להם 7 שנים בשנת המדד

6.0%	7.4%	7.1%	6.7%	6.4%	8.2%	10.4%	8.1%	9.8%	9.4%	10.7%	7.0%	5.3%	6.6%	8.2%	6.6%	זכר 7
2.9%	6.1%	6.5%	4.9%	6.3%	7.8%	9.1%	6.6%	6.9%	9.3%	9.8%	7.0%	4.5%	6.5%	7.6%	5.4%	נקבה 7

שיעור התיעד של מרכיבי BMI בקרב בני 14-18

80.2%	75.6%	69.0%	67.9%	77.0%	77.2%	76.5%	68.1%	91.0%	89.2%	83.7%	76.0%	86.2%	84.8%	78.3%	72.4%	זכר 14-18
77.8%	74.0%	68.6%	70.4%	76.3%	77.0%	74.2%	67.8%	90.6%	87.3%	83.3%	75.7%	84.1%	83.8%	78.9%	74.7%	נקבה 14-18

מבוגרים בני 65 ומעלה

שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בקרב בני 65 ומעלה

53.8%	50.5%	47.3%	46.6%	56.7%	51.5%	47.1%	48.6%	69.3%	67.5%	64.3%	64.8%	58.9%	54.7%	52.9%	60.0%	זכר	65-69
65.1%	59.0%	53.8%	53.4%	67.3%	60.6%	56.4%	55.8%	75.5%	74.7%	70.1%	70.6%	68.8%	64.8%	61.1%	66.8%		70-74
71.0%	65.3%	60.4%	58.6%	72.3%	65.9%	59.0%	55.4%	80.4%	74.4%	71.9%	69.3%	74.7%	70.0%	64.8%	68.5%		75-79
77.9%	69.1%	64.6%	63.7%	75.7%	68.0%	63.6%	61.1%	82.6%	78.0%	72.2%	73.7%	78.2%	74.0%	69.2%	71.6%		80-84
78.5%	70.0%	67.0%	66.5%	68.3%	65.7%	61.7%	63.4%	82.0%	73.1%	72.7%	69.4%	79.9%	75.2%	69.7%	72.5%		85+
50.8%	46.3%	41.9%	43.4%	53.9%	47.7%	43.7%	43.0%	69.0%	70.4%	68.2%	66.7%	55.7%	50.6%	48.4%	57.2%	נקבה	65-69
60.8%	54.8%	50.4%	49.3%	62.5%	56.2%	50.0%	48.3%	78.0%	73.8%	70.7%	71.9%	63.6%	59.6%	55.4%	61.8%		70-74
66.8%	57.4%	54.3%	56.6%	66.8%	58.4%	52.9%	50.5%	79.0%	72.5%	72.5%	71.8%	68.2%	63.9%	59.3%	64.6%		75-79
70.9%	61.0%	57.0%	62.6%	66.5%	57.8%	54.3%	53.9%	74.5%	71.8%	71.7%	69.8%	72.2%	67.0%	61.9%	67.7%		80-84
70.0%	61.2%	58.5%	58.2%	56.7%	51.5%	48.6%	47.0%	75.2%	69.8%	67.9%	69.6%	72.5%	67.1%	62.4%	65.9%		85+

שיעור קבלת חיסון נגד פניאומוקוק בקרב בני 65-74

70.7%	69.4%	68.9%	73.2%	79.0%	78.1%	76.8%	78.9%	80.3%	80.0%	80.2%	78.9%	71.3%	70.3%	71.1%	79.1%	זכר	65-69
83.5%	81.4%	77.5%	82.8%	89.7%	89.0%	87.6%	88.2%	94.7%	94.3%	93.6%	93.4%	87.5%	87.2%	86.9%	90.4%		70-74
66.2%	64.4%	62.3%	70.6%	74.9%	73.0%	72.4%	72.7%	82.4%	82.6%	82.9%	81.5%	68.0%	65.7%	66.8%	76.4%	נקבה	65-69
80.2%	75.6%	74.2%	77.5%	85.9%	84.2%	82.4%	83.2%	93.1%	93.4%	93.7%	94.3%	83.7%	83.0%	82.2%	88.8%		70-74

שיעור התיעד של מרכיבי BMI בקרב בני 65-84

75.0%	73.3%	73.3%	72.2%	65.0%	70.0%	71.2%	75.8%	76.8%	76.1%	76.4%	74.0%	76.8%	78.8%	79.6%	82.7%	זכר	65-69
80.7%	78.9%	76.5%	75.3%	70.0%	74.3%	75.0%	79.8%	83.2%	81.8%	80.7%	78.6%	86.5%	87.7%	86.8%	89.0%		70-74
82.2%	79.4%	78.9%	75.9%	72.8%	77.4%	76.2%	77.6%	58.1%	57.2%	56.2%	52.1%	88.2%	89.3%	88.1%	89.4%		75-79
67.6%	64.7%	65.9%	61.5%	73.2%	75.4%	76.0%	75.7%	57.1%	57.2%	54.5%	53.5%	89.0%	90.1%	88.2%	87.9%		80-84
73.5%	75.3%	74.6%	75.7%	61.8%	68.1%	71.1%	74.3%	79.0%	78.5%	79.1%	76.8%	76.9%	79.1%	81.1%	85.2%		85+
81.0%	80.3%	78.7%	77.9%	65.9%	72.8%	73.4%	76.7%	86.2%	83.9%	84.3%	81.0%	86.0%	88.2%	87.8%	90.2%	נקבה	65-69
80.6%	78.8%	78.1%	76.3%	68.4%	73.6%	75.0%	74.0%	55.9%	59.6%	57.8%	55.8%	86.7%	88.6%	88.0%	89.2%		70-74
65.4%	63.9%	66.1%	62.6%	66.7%	71.4%	73.5%	72.7%	50.0%	53.7%	55.7%	49.9%	83.8%	87.4%	86.8%	86.9%		75-79
																	80-84
																	85+

שיעור המבוגרים בני 65 ומעלה שחלה ירידה חדה במשקלם בשנתיים האחרונות

4.3%	4.8%	5.1%	5.4%	4.7%	5.3%	5.8%	6.3%	4.3%	3.8%	4.5%	5.1%	3.9%	4.4%	4.8%	6.1%	זכר	65-69
4.7%	5.0%	5.7%	6.2%	5.0%	6.0%	5.9%	6.4%	4.2%	4.3%	6.3%	5.8%	3.8%	4.4%	5.0%	6.2%		70-74
6.4%	7.4%	5.4%	7.8%	6.1%	6.3%	8.0%	8.0%	7.5%	6.5%	7.5%	5.7%	5.0%	5.0%	6.1%	7.2%		75-79
6.5%	6.8%	7.7%	10.2%	7.1%	7.8%	7.4%	10.7%	7.0%	8.7%	7.4%	11.5%	5.9%	6.2%	7.2%	8.2%		80-84
14.7%	9.1%	8.6%	-	9.1%	11.1%	13.4%	9.4%	-	10.2%	9.5%	-	6.6%	8.2%	7.8%	9.5%		85+
4.6%	5.3%	5.4%	6.8%	5.4%	6.1%	6.2%	7.0%	4.5%	4.9%	4.9%	5.9%	4.5%	5.0%	5.3%	6.2%	נקבה	65-69
5.2%	5.2%	6.5%	7.0%	5.7%	6.0%	6.3%	7.6%	4.5%	4.8%	6.5%	6.4%	4.1%	4.9%	6.0%	7.0%		70-74
6.3%	7.4%	7.4%	8.6%	6.2%	6.5%	7.9%	8.8%	8.3%	7.6%	8.0%	6.9%	5.7%	5.8%	6.6%	8.2%		75-79
9.1%	10.6%	9.2%	6.9%	8.2%	8.8%	9.9%	10.2%	6.7%	10.0%	8.7%	8.6%	6.6%	7.7%	8.1%	9.1%		80-84
12.9%	12.7%	11.0%	-	11.0%	13.1%	13.5%	12.7%	5.6%	9.1%	10.3%	11.0%	8.3%	9.2%	9.3%	9.2%		85+

שיעור תת משקל בקרב מבוגרים בני 75 ומעלה

13.4%	9.8%	10.3%	12.7%	9.6%	10.4%	11.2%	12.2%	12.7%	11.5%	10.5%	10.9%	11.7%	12.5%	13.6%	14.9%	זכר	75-79
12.8%	10.2%	10.4%	12.9%	7.6%	6.7%	7.7%	7.4%	15.1%	14.6%	14.3%	13.8%	13.8%	14.3%	15.3%	16.9%		80-84
18.4%	17.0%	14.6%	20.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	22.9%	20.4%	21.1%	25.0%	19.7%	19.5%	21.2%	23.6%		85+
20.0%	13.5%	11.1%	9.6%	20.2%	13.2%	9.1%	8.2%	16.0%	12.7%	11.1%	11.1%	18.6%	15.0%	12.1%	9.9%	נקבה	75-79
20.2%	13.7%	9.3%	11.9%	11.6%	7.9%	6.5%	6.9%	17.3%	15.2%	10.0%	15.1%	18.2%	16.6%	13.5%	11.7%		80-84
22.8%	17.6%	16.4%	17.3%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	19.0%	21.6%	18.6%	16.6%	24.6%	21.7%	19.3%	17.5%		85+

מאחדת				מכבי				לאומית				כללית				גיל/SES
4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	

שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב בני 65-84

זכר	65-69	28.1%	33.1%	37.7%	38.5%	26.4%	30.0%	35.7%	37.1%	29.2%	31.4%	33.6%	36.5%	26.1%	29.0%	30.2%	31.7%
	70-74	25.9%	31.1%	33.8%	36.2%	24.4%	30.2%	33.3%	34.8%	26.2%	28.1%	32.4%	35.3%	24.0%	27.0%	29.5%	31.2%
	75-79	22.4%	28.6%	32.1%	33.1%	22.6%	25.9%	30.9%	31.1%	24.3%	25.8%	29.4%	31.6%	20.4%	23.5%	26.2%	28.5%
	80-84	20.8%	26.4%	27.6%	31.2%	12.9%	16.5%	19.9%	21.6%	20.7%	26.1%	25.1%	25.7%	19.3%	21.1%	25.3%	25.6%
נקבה	65-69	25.2%	36.5%	47.5%	56.0%	24.5%	35.4%	46.3%	51.2%	25.1%	34.8%	45.7%	51.1%	25.3%	33.2%	43.2%	54.9%
	70-74	25.2%	37.2%	45.3%	56.5%	25.1%	35.2%	46.8%	53.0%	27.8%	36.9%	44.8%	52.9%	25.6%	33.1%	42.0%	53.7%
	75-79	27.2%	36.3%	47.4%	52.8%	24.3%	36.2%	46.0%	49.3%	28.0%	37.5%	42.5%	47.0%	25.0%	32.5%	41.1%	48.9%
	80-84	23.0%	39.5%	46.4%	52.1%	16.9%	26.2%	33.1%	34.2%	29.6%	37.0%	42.8%	39.1%	26.6%	32.5%	39.5%	45.2%

שיעור שימוש היתר בבנוזידיאזפניס בקרב בני 65 ומעלה

זכר	65-69	1.7%	1.6%	2.1%	1.1%	1.4%	1.8%	1.8%	1.8%	1.2%	1.2%	1.1%	0.9%	2.2%	2.3%	2.2%	1.7%
	70-74	2.2%	2.1%	2.5%	1.7%	2.5%	2.2%	2.3%	1.9%	1.9%	2.1%	2.0%	1.5%	3.3%	3.6%	3.3%	1.9%
	75-79	3.3%	3.8%	4.2%	3.1%	3.5%	3.1%	3.2%	3.0%	3.2%	2.8%	3.5%	1.8%	6.2%	5.5%	5.3%	3.2%
	80-84	5.5%	4.5%	5.5%	3.8%	4.0%	3.9%	4.1%	3.7%	4.7%	5.3%	2.8%	4.1%	7.8%	8.1%	6.3%	4.0%
נקבה	65-69	8.6%	7.0%	9.5%	3.1%	6.0%	4.8%	5.3%	3.5%	6.2%	5.1%	5.6%	4.2%	12.8%	11.5%	8.8%	6.6%
	70-74	2.4%	2.3%	2.8%	1.8%	2.6%	2.8%	2.8%	2.3%	1.7%	1.6%	1.7%	1.0%	3.7%	3.4%	3.2%	1.8%
	75-79	3.6%	3.7%	3.6%	2.4%	3.5%	3.4%	3.9%	2.6%	2.0%	2.5%	2.2%	1.8%	5.2%	5.0%	4.5%	2.5%
	80-84	6.4%	5.8%	5.6%	4.4%	4.9%	4.7%	4.8%	4.1%	3.1%	3.3%	3.4%	2.2%	8.5%	7.9%	6.6%	3.8%
	85+	7.2%	7.2%	8.8%	7.0%	5.9%	6.6%	5.8%	4.6%	6.2%	4.9%	4.7%	4.8%	12.6%	11.1%	9.2%	5.9%
	85+	11.1%	10.4%	10.3%	6.3%	8.8%	7.2%	6.9%	4.4%	7.6%	6.6%	6.1%	4.9%	17.6%	15.9%	12.6%	8.3%

שיעור השימוש בבנוזידיאזפניס ארוכי טווח בקרב בני 65 ומעלה

זכר	65-69	1.4%	1.8%	1.7%	2.4%	1.7%	1.7%	1.7%	2.3%	1.3%	1.3%	1.4%	2.3%	1.6%	1.4%	1.6%	1.7%
	70-74	2.3%	1.8%	1.6%	2.4%	2.2%	2.0%	1.9%	2.4%	1.3%	1.7%	1.7%	1.7%	1.9%	1.6%	1.7%	1.3%
	75-79	2.7%	1.9%	2.2%	2.6%	2.3%	2.2%	1.9%	2.0%	2.7%	2.5%	1.7%	2.1%	2.2%	1.8%	1.6%	1.6%
	80-84	2.2%	2.0%	1.6%	2.4%	2.1%	2.0%	2.0%	1.8%	2.6%	1.6%	2.2%	1.9%	2.4%	2.2%	1.7%	1.4%
נקבה	65-69	2.8%	2.2%	2.6%	1.9%	2.5%	2.4%	1.7%	1.2%	3.7%	1.8%	1.5%	2.6%	2.5%	2.1%	1.8%	0.9%
	70-74	2.0%	2.3%	2.3%	2.9%	2.7%	2.7%	2.3%	2.4%	2.5%	1.8%	1.8%	2.8%	2.3%	2.1%	1.7%	1.4%
	75-79	2.6%	3.0%	2.6%	2.4%	3.4%	2.8%	2.5%	2.7%	3.3%	2.3%	2.5%	1.8%	2.8%	2.3%	2.1%	1.6%
	80-84	4.0%	3.0%	2.2%	2.7%	4.0%	3.3%	2.8%	3.0%	3.6%	2.8%	2.5%	3.3%	3.1%	2.8%	2.2%	1.5%
	85+	3.8%	2.6%	3.0%	4.0%	4.1%	3.1%	2.4%	3.2%	4.6%	2.1%	2.8%	2.2%	3.2%	3.0%	2.4%	1.5%
	85+	2.3%	2.6%	2.9%	2.1%	3.4%	2.8%	2.0%	2.6%	3.1%	2.0%	2.1%	2.0%	2.9%	2.8%	2.2%	1.7%

מחלות נשימתיות

שיעור ההימצאות של אסתמה מתמשכת בקרב בני 45-5

זכר	5-14	1.6%	1.4%	1.0%	0.6%	1.4%	1.3%	1.2%	0.8%	1.2%	1.6%	1.3%	0.7%	1.0%	1.0%	1.0%	0.7%
	15-24	0.8%	0.8%	0.6%	0.4%	0.9%	0.8%	0.6%	0.4%	1.0%	0.9%	0.7%	0.5%	0.7%	0.7%	0.6%	0.3%
	25-34	1.0%	1.0%	0.8%	0.5%	1.1%	1.0%	0.9%	0.6%	1.0%	1.0%	0.8%	0.7%	0.7%	0.7%	0.6%	0.5%
	35-44	1.4%	1.3%	1.0%	1.0%	1.4%	1.3%	1.1%	1.0%	1.2%	1.2%	1.1%	1.4%	1.0%	1.0%	0.9%	0.8%
נקבה	5-14	0.9%	0.8%	0.7%	0.4%	0.7%	0.8%	0.7%	0.6%	1.0%	0.8%	0.6%	0.4%	0.6%	0.6%	0.5%	0.4%
	15-24	0.8%	0.8%	0.4%	0.3%	0.7%	0.7%	0.6%	0.4%	1.1%	0.7%	0.6%	0.3%	0.6%	0.5%	0.4%	0.3%
	25-34	1.1%	0.8%	0.7%	0.4%	0.9%	0.9%	0.7%	0.5%	1.2%	0.8%	0.7%	0.5%	0.7%	0.7%	0.7%	0.4%
	35-44	1.3%	1.2%	1.2%	0.8%	1.3%	1.2%	1.2%	1.0%	1.2%	1.5%	1.4%	1.2%	0.9%	1.1%	1.0%	1.0%

שיעור יחס התרופות לאסתמה (AMR) גדול או שווה 0.5 בקרב בני 45-5

זכר	5-14	75.5%	68.1%	74.6%	72.8%	77.6%	74.6%	74.0%	76.8%	-	71.1%	75.0%	-	71.6%	72.5%	71.5%	80.2%
	15-24	-	-	67.5%	-	75.6%	68.4%	74.2%	-	-	-	-	-	-	68.4%	71.0%	73.7%
	25-34	-	65.6%	69.3%	-	78.3%	68.5%	67.9%	-	-	-	-	-	73.7%	67.0%	65.4%	68.0%
	35-44	-	62.7%	60.3%	65.5%	71.5%	68.8%	64.9%	-	-	-	77.4%	-	68.7%	64.6%	66.4%	70.7%
נקבה	5-14	-	65.4%	72.7%	72.1%	73.6%	68.4%	72.9%	-	-	-	-	-	74.5%	71.0%	69.9%	74.0%
	15-24	-	-	-	-	75.8%	68.5%	70.2%	-	-	-	-	-	-	69.9%	66.4%	71.1%
	25-34	-	75.5%	-	-	80.0%	75.5%	58.8%	-	-	-	-	-	67.5%	66.5%	67.4%	70.2%
	35-44	-	69.1%	69.5%	-	74.6%	68.9%	68.4%	-	-	-	71.9%	-	71.7%	65.3%	67.1%	73.6%

מאוחדת				סכבי				לאומית				כללית				SES/גיל
4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	

שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בקרב חולי אסתמה מתמשכת בני 45-5

43.6%	32.9%	37.4%	34.8%	38.7%	31.2%	31.7%	38.9%	-	47.9%	40.4%	-	47.9%	40.0%	41.8%	56.1%	5-14	זכר
-	-	24.4%	-	33.2%	21.8%	25.3%	-	-	-	-	-	-	31.2%	33.8%	46.7%	15-24	
-	26.6%	20.9%	-	20.4%	23.6%	24.0%	-	-	-	-	-	22.9%	30.5%	31.6%	43.4%	25-34	
-	24.1%	32.3%	31.6%	29.2%	27.1%	34.5%	-	-	-	27.1%	-	36.0%	30.5%	34.8%	58.5%	35-44	
-	35.9%	35.0%	39.4%	37.3%	33.8%	30.4%	-	-	-	-	-	39.5%	40.4%	43.5%	56.7%	5-14	נקבה
-	-	-	-	28.3%	22.4%	23.0%	-	-	-	-	-	-	30.5%	33.9%	50.2%	15-24	
-	24.5%	-	-	34.5%	29.0%	29.6%	-	-	-	-	-	40.4%	29.1%	32.7%	47.4%	25-34	
-	30.9%	30.9%	-	33.4%	28.3%	34.8%	-	-	-	43.2%	-	38.3%	32.7%	37.4%	52.5%	35-44	

שיעור הביצוע של ספירומטריה בקרב חולי COPD ואוכלוסייה בסיכון גבוה ל-COPD בני 74-50

-	-	71.8%	73.3%	-	70.8%	68.5%	-	-	67.1%	72.8%	69.1%	-	66.7%	67.1%	66.7%	50-54	זכר
-	72.7%	74.8%	77.3%	-	78.6%	69.6%	-	-	72.9%	77.3%	69.1%	-	72.6%	73.3%	71.1%	55-59	
-	80.8%	75.8%	75.1%	71.9%	75.2%	72.0%	-	-	82.1%	80.7%	77.0%	-	81.8%	77.8%	77.9%	60-64	
-	82.4%	80.0%	-	66.7%	79.8%	76.0%	-	-	82.6%	84.9%	-	-	84.4%	81.0%	78.8%	65-69	
-	78.2%	83.0%	-	70.7%	80.4%	73.0%	-	-	85.2%	82.0%	-	-	83.6%	81.8%	78.4%	70-74	נקבה
-	-	-	-	-	62.8%	67.0%	-	-	57.4%	66.4%	-	-	63.4%	69.5%	68.1%	50-54	
-	-	-	-	-	74.9%	71.3%	-	-	68.8%	76.6%	-	-	71.1%	76.5%	74.1%	55-59	
-	75.7%	73.8%	-	75.3%	77.0%	72.3%	-	-	72.3%	80.8%	-	-	80.7%	76.3%	75.4%	60-64	
-	75.9%	80.3%	-	75.5%	76.4%	73.3%	-	-	80.6%	79.6%	-	-	84.3%	78.9%	77.9%	65-69	70-74
-	-	-	-	72.8%	80.5%	72.5%	-	-	84.7%	81.3%	-	-	86.7%	80.1%	73.8%	71.1%	

תיעוד ערכי בדיקת ספירומטריה בקרב חולי COPD ואוכלוסייה בסיכון גבוה ל-COPD בני 74-50

-	-	0.0%	-	-	22.9%	20.0%	-	-	-	44.9%	-	-	52.5%	51.2%	50.4%	50-54	זכר
-	-	0.0%	0.0%	-	26.3%	14.6%	-	-	43.9%	43.9%	-	-	52.3%	51.3%	54.6%	55-59	
-	0.0%	0.0%	0.0%	-	23.2%	20.1%	-	-	42.3%	43.3%	-	-	48.3%	52.3%	55.4%	60-64	
-	0.0%	0.0%	-	-	26.1%	15.9%	-	-	40.5%	40.2%	-	-	46.2%	51.5%	56.2%	65-69	
-	-	-	-	42.6%	29.9%	20.0%	-	-	43.4%	37.9%	-	-	50.5%	55.1%	51.4%	70-74	נקבה
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.0%	-	-	53.1%	53.2%	-	50-54	
-	-	-	-	-	27.7%	19.0%	-	-	-	41.4%	-	-	52.0%	52.6%	47.9%	55-59	
-	0.0%	-	-	-	29.6%	20.9%	-	-	38.2%	41.1%	-	-	42.2%	50.3%	53.5%	60-64	
-	0.0%	0.0%	-	46.8%	32.5%	26.3%	-	-	40.4%	39.1%	-	-	45.0%	53.2%	50.4%	65-69	70-74
-	-	-	-	49.4%	28.1%	18.4%	-	-	-	-	-	-	50.0%	55.1%	56.0%	-	

לב וכלי דם

שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול בקרב בני 54-35

76.4%	75.3%	72.6%	68.8%	78.7%	79.1%	76.6%	76.0%	76.8%	75.3%	75.5%	71.8%	83.5%	81.3%	78.8%	79.8%	35-39	זכר
79.6%	80.0%	77.4%	75.1%	81.8%	82.4%	81.8%	81.2%	81.6%	78.8%	80.5%	79.5%	86.5%	85.4%	83.9%	85.0%	40-44	
83.0%	85.0%	82.7%	79.6%	85.6%	85.9%	85.0%	84.3%	85.9%	84.5%	84.9%	80.8%	89.5%	88.8%	87.3%	88.7%	45-49	
88.6%	87.9%	86.5%	84.2%	89.8%	90.1%	89.1%	89.6%	88.6%	86.9%	87.7%	85.4%	92.4%	91.3%	90.0%	90.9%	50-54	
86.0%	86.5%	85.2%	81.7%	85.3%	85.9%	84.9%	85.2%	86.1%	86.2%	87.0%	81.9%	92.8%	91.8%	91.8%	93.1%	35-39	נקבה
89.2%	89.9%	89.2%	87.3%	87.9%	88.1%	88.4%	87.9%	89.2%	89.4%	90.8%	89.3%	93.5%	93.4%	93.6%	94.8%	40-44	
92.2%	92.4%	92.5%	90.7%	91.1%	91.6%	91.5%	92.4%	92.2%	92.3%	92.9%	91.6%	94.6%	94.7%	94.6%	96.0%	45-49	
93.4%	94.7%	94.1%	92.8%	93.5%	93.9%	94.0%	93.7%	93.9%	94.4%	94.0%	93.4%	95.7%	95.7%	95.7%	96.9%	50-54	

שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול בקרב בני 74-55

61.8%	62.3%	62.1%	63.2%	58.2%	59.7%	60.7%	61.2%	66.8%	64.3%	63.8%	61.6%	66.2%	66.8%	65.4%	66.2%	55-59	זכר
69.1%	69.6%	69.1%	70.6%	66.7%	69.0%	69.7%	70.6%	73.2%	70.5%	71.2%	67.7%	74.3%	74.5%	72.3%	72.9%	60-64	
76.5%	77.2%	76.5%	76.1%	74.2%	75.9%	76.5%	76.3%	80.7%	79.6%	77.5%	74.8%	81.8%	81.4%	79.9%	78.7%	65-69	
80.9%	81.9%	80.9%	79.3%	80.2%	81.4%	81.5%	79.8%	83.8%	83.0%	82.5%	78.2%	86.6%	86.4%	83.1%	82.1%	70-74	
67.4%	69.0%	70.2%	73.2%	57.8%	61.0%	63.8%	65.5%	71.2%	72.9%	74.5%	72.8%	70.8%	72.9%	73.8%	77.5%	55-59	נקבה
72.5%	74.5%	75.4%	76.9%	65.6%	69.9%	71.2%	72.9%	77.6%	77.9%	80.0%	75.4%	77.3%	78.2%	78.9%	81.7%	60-64	
78.5%	80.1%	80.7%	81.3%	72.3%	75.3%	77.7%	77.5%	82.7%	83.6%	83.7%	82.7%	82.9%	83.6%	83.8%	85.3%	65-69	
82.2%	82.0%	84.5%	85.0%	77.4%	79.8%	81.8%	81.7%	85.9%	86.1%	85.5%	84.0%	86.6%	87.5%	86.7%	86.5%	70-74	

שיעור עמידה ביעד LDL לפי קבוצת סיכון למחלות לב בקרב בני 74-35

86.9%	84.9%	83.1%	85.4%	85.1%	82.7%	80.0%	84.9%	82.8%	78.5%	76.5%	78.5%	90.0%	88.9%	87.0%	86.6%	35-44	זכר
76.1%	74.6%	73.9%	74.8%	76.3%	72.6%	70.0%	73.1%	68.0%	64.5%	62.3%	65.4%	81.2%	78.9%	76.9%	77.5%	45-54	
79.1%	77.8%	75.7%	78.2%	79.3%	76.5%	72.9%	76.7%	69.8%	66.4%	62.4%	68.2%	85.4%	82.6%	80.6%	81.2%	55-64	
82.5%	78.1%	77.6%	78.4%	80.8%	78.6%	75.5%	79.3%	70.6%	69.3%	65.4%	66.5%	87.7%	86.0%	84.7%	85.7%	65-74	
95.0%	94.3%	94.1%	95.2%	93.0%	91.4%	90.7%	92.2%	91.7%	90.8%	90.7%	93.1%	96.2%	95.8%	95.7%	96.3%	35-44	נקבה
87.8%	88.0%	87.8%	90.2%	86.3%	84.0%	82.3%	87.1%	81.8%	81.3%	81.5%	86.2%	90.8%	90.6%	90.7%	93.2%	45-54	
79.7%	77.5%	77.0%	82.8%	76.3%	74.4%	72.2%	78.8%	70.1%	66.9%	65.7%	68.7%	83.9%	83.1%	83.3%	87.5%	55-64	
83.0%	81.9%	81.3%	83.8%	80.0%	79.4%	77.9%	81.3%	73.4%	71.7%	72.3%	73.5%	87.2%	87.6%	88.2%	90.7%	65-74	

מאחדת				מכבי				לאומית				כללית				גיל/SES
4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	

שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-160 מ"ג/ד"ל בקבוצת סיכון נמוך למחלות לב וכלי דם בבני 74-35

90.7%	91.1%	90.6%	92.5%	87.8%	85.9%	85.0%	88.7%	85.9%	84.1%	82.3%	85.4%	92.1%	91.8%	90.9%	91.6%	35-44	זכר
87.4%	87.7%	87.9%	90.8%	84.0%	82.8%	82.2%	85.0%	82.0%	81.2%	79.8%	79.8%	90.0%	89.3%	89.3%	90.4%	45-54	
90.5%	90.3%	91.1%	92.0%	87.4%	86.3%	83.7%	87.0%	84.7%	82.3%	78.8%	84.5%	91.5%	91.5%	91.0%	91.6%	55-64	
93.7%	93.6%	94.5%	92.7%	90.7%	89.7%	87.4%	90.0%	86.2%	87.5%	85.0%	85.9%	94.9%	94.8%	93.6%	94.7%	65-74	
95.8%	95.0%	95.1%	95.8%	93.3%	92.0%	91.7%	92.9%	92.6%	92.0%	91.5%	93.7%	96.5%	96.4%	96.4%	96.6%	35-44	נקבה
89.4%	90.2%	90.2%	91.9%	87.3%	85.5%	84.3%	88.5%	83.1%	83.0%	83.3%	87.3%	91.5%	91.5%	91.8%	93.9%	45-54	
86.0%	86.4%	87.1%	90.6%	82.2%	81.7%	80.4%	86.4%	78.9%	77.4%	76.7%	78.2%	88.5%	89.0%	89.6%	92.3%	55-64	
89.1%	88.7%	88.9%	91.0%	85.1%	85.4%	84.6%	88.9%	80.3%	80.9%	81.0%	83.6%	90.6%	91.7%	92.2%	94.2%	65-74	

שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-130 מ"ג/ד"ל בקבוצת סיכון בינוני למחלות לב וכלי דם בבני 74-35

70.0%	64.8%	64.8%	70.3%	66.1%	66.4%	63.3%	72.0%	-	56.6%	58.1%	57.5%	70.1%	69.3%	70.1%	69.5%	35-44	זכר
66.9%	67.4%	68.5%	69.6%	68.0%	65.8%	64.8%	68.4%	58.2%	56.2%	57.7%	61.4%	71.7%	71.2%	71.0%	72.9%	45-54	
74.2%	74.3%	73.4%	76.9%	75.2%	75.0%	73.2%	78.8%	67.8%	65.5%	64.5%	72.0%	81.9%	80.0%	80.0%	82.6%	55-64	
84.2%	80.6%	80.2%	82.8%	81.2%	80.8%	79.2%	82.6%	74.4%	73.9%	70.7%	70.3%	87.8%	86.2%	85.7%	86.3%	65-74	
-	75.5%	71.6%	79.6%	-	71.0%	69.0%	-	-	65.0%	73.3%	-	82.4%	77.9%	78.8%	81.8%	35-44	נקבה
59.4%	59.5%	62.4%	71.2%	57.7%	59.8%	59.7%	71.0%	-	53.2%	58.3%	67.3%	66.4%	69.4%	71.5%	79.3%	45-54	
62.4%	61.0%	62.1%	71.4%	56.3%	57.3%	58.6%	65.9%	49.4%	49.1%	50.5%	55.5%	68.2%	68.3%	70.6%	78.4%	55-64	
71.8%	72.4%	72.9%	76.5%	69.1%	70.1%	70.1%	72.6%	63.2%	61.0%	63.3%	64.3%	78.5%	79.3%	81.5%	85.5%	65-74	

שיעור התייעוד של מדידות לחץ דם בקרב בני 54-20

64.5%	62.9%	64.2%	69.6%	81.2%	82.2%	79.6%	79.9%	75.0%	77.4%	81.1%	79.7%	86.8%	87.0%	88.4%	91.5%	20-24	זכר
73.6%	73.0%	71.2%	72.4%	86.2%	88.5%	87.7%	85.9%	83.7%	85.3%	85.1%	82.8%	86.9%	88.2%	88.8%	91.5%	25-34	
84.2%	84.2%	81.8%	82.6%	91.0%	92.2%	91.3%	90.6%	85.3%	86.9%	87.7%	87.5%	90.5%	91.5%	92.3%	94.8%	35-44	
92.1%	92.9%	91.3%	92.2%	94.4%	95.0%	94.7%	94.0%	89.9%	91.8%	91.7%	90.7%	95.4%	96.1%	96.6%	97.7%	45-54	
77.5%	78.2%	81.3%	87.8%	87.8%	91.0%	91.4%	91.3%	87.2%	90.1%	91.1%	92.1%	92.9%	93.8%	94.9%	95.7%	20-24	נקבה
89.0%	90.8%	92.3%	95.3%	93.9%	95.5%	95.5%	96.4%	92.7%	95.1%	95.1%	96.2%	94.7%	96.0%	96.3%	97.1%	25-34	
92.7%	93.3%	92.8%	95.1%	94.8%	95.5%	95.5%	96.1%	93.0%	93.9%	94.0%	95.0%	95.3%	96.1%	96.7%	97.8%	35-44	
95.0%	95.1%	94.9%	95.5%	95.1%	96.1%	96.6%	96.4%	92.8%	94.4%	94.6%	94.6%	96.9%	97.8%	98.3%	98.9%	45-54	

שיעור התייעוד של מדידות לחץ דם בקרב בני 74-55

65.4%	67.0%	67.2%	71.3%	68.6%	71.1%	73.6%	74.1%	63.6%	64.9%	68.2%	66.5%	69.6%	73.4%	75.0%	80.8%	55-59	זכר
71.1%	72.9%	73.1%	75.7%	77.1%	79.4%	80.1%	80.6%	71.0%	70.7%	73.6%	71.7%	76.5%	79.1%	79.7%	84.5%	60-64	
80.8%	81.2%	80.4%	81.0%	85.1%	86.1%	86.5%	88.2%	79.4%	78.6%	79.5%	79.1%	82.9%	84.8%	85.3%	87.9%	65-69	
84.1%	84.5%	82.6%	82.0%	89.1%	89.6%	88.8%	90.2%	80.5%	81.7%	80.7%	80.4%	86.9%	88.5%	88.0%	90.5%	70-74	
69.7%	69.7%	72.3%	77.2%	68.4%	73.1%	75.7%	78.8%	69.3%	70.4%	75.0%	74.5%	72.2%	76.5%	79.7%	86.1%	55-59	נקבה
73.8%	76.6%	77.4%	79.2%	76.0%	80.0%	81.3%	83.1%	73.9%	74.7%	79.0%	77.8%	77.6%	80.8%	83.2%	88.0%	60-64	
80.3%	82.1%	81.7%	84.2%	82.5%	85.0%	86.5%	87.8%	78.6%	81.6%	82.2%	81.9%	82.7%	85.4%	86.7%	90.0%	65-69	
86.5%	85.3%	85.7%	85.6%	86.8%	88.5%	89.4%	89.7%	83.5%	82.6%	84.8%	83.8%	86.9%	89.0%	89.4%	92.1%	70-74	

שיעור הטיפול בתרופות להורדת LDL לאחר ניתוח מעקפים /או צינתור לבבי בקרב בני 80-35

-	-	-	-	81.8%	82.0%	78.3%	-	-	-	75.50%	-	77.2%	71.2%	73.5%	75.5%	35-49	זכר
78.8%	76.1%	75.9%	73.2%	86.1%	83.8%	80.0%	82.4%	-	83.3%	80.4%	75.8%	84.2%	80.4%	77.7%	78.2%	50-59	
79.9%	81.6%	80.2%	72.3%	87.9%	85.0%	83.1%	86.4%	87.8%	83.6%	79.8%	80.4%	85.6%	84.0%	81.6%	81.4%	60-69	
84.3%	84.3%	82.6%	77.6%	89.2%	88.7%	86.6%	84.8%	85.2%	87.2%	82.9%	-	89.8%	88.8%	86.0%	83.6%	70-79	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35-49	נקבה
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.8%	73.5%	81.2%	50-59	
-	-	-	-	88.7%	83.4%	80.7%	-	-	-	83.2%	-	83.6%	81.2%	83.6%	81.0%	60-69	
-	-	-	-	86.3%	85.9%	86.9%	-	-	-	83.8%	-	87.3%	86.1%	86.9%	86.2%	70-79	

שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל או טיפול בסטטינים בעימות גבוהה לאחר צנתור לבבי / ניתוח מעקפים בקרב בני 80-35

-	84.1%	73.7%	82.5%	68.1%	64.0%	61.2%	53.9%	-	-	44.2%	-	69.0%	61.8%	56.9%	59.1%	35-49	זכר
81.1%	81.3%	80.7%	79.8%	69.8%	64.6%	60.6%	62.0%	-	59.3%	47.4%	54.7%	73.1%	68.2%	63.9%	62.2%	50-59	
82.9%	82.4%	81.7%	77.8%	66.4%	65.5%	65.2%	69.7%	68.1%	61.7%	58.2%	58.0%	76.9%	74.1%	69.7%	70.0%	60-69	
86.1%	83.5%	82.1%	80.0%	66.5%	64.2%	68.1%	68.1%	63.1%	65.5%	60.0%	59.0%	79.9%	77.0%	73.7%	71.5%	70-79	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.9%	42.4%	35-49	נקבה
-	-	-	-	-	50.4%	51.4%	-	-	-	-	-	57.0%	55.3%	53.5%	49.9%	50-59	
-	70.9%	75.3%	-	61.0%	55.6%	54.5%	-	-	52.9%	55.2%	-	65.0%	62.3%	65.4%	64.5%	60-69	
-	69.0%	75.3%	-	55.6%	58.5%	59.6%	-	-	45.8%	48.1%	-	67.7%	64.8%	67.3%	68.1%	70-79	

מאוחדת				סכבי				לאומית				כללית				SES/נל
4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	

שיעור הסיקור האולטראסונוגרפי למפרצת באבי העורקים הבטני בקרב גברים בני 75-65 שנים עם היסטוריה של עישון*

זכר	65-69	-	-	-	-	35.4%	34.9%	33.4%	28.1%	55.5%	47.3%	50.7%	52.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.5%
70-74	-	-	-	-	-	45.4%	48.4%	42.3%	34.5%	52.5%	46.4%	50.3%	52.7%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%

* מהכללית לא התקבלו נתונים תואמי-הגדרה

סוכרת

שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב בני 18 ומעלה

זכר	18-24	0.4%	0.6%	0.8%	0.7%	0.4%	0.3%	0.4%	0.8%	0.4%	0.5%	0.7%	0.8%	0.4%	0.4%	0.5%	0.8%
	25-34	1.0%	0.8%	0.6%	0.5%	0.6%	0.7%	0.8%	0.5%	0.5%	0.6%	0.5%	0.4%	0.8%	0.6%	0.6%	0.5%
	35-44	4.5%	3.1%	2.1%	1.3%	3.8%	3.0%	2.2%	1.7%	4.1%	2.9%	1.9%	1.2%	3.5%	2.6%	1.9%	1.3%
	45-54	14.3%	11.4%	8.6%	5.8%	12.2%	9.9%	8.3%	6.6%	13.7%	9.5%	7.2%	4.5%	11.5%	8.1%	6.4%	4.6%
	55-64	28.0%	23.2%	20.6%	16.5%	22.5%	21.2%	19.7%	16.9%	25.7%	21.3%	17.4%	13.2%	23.8%	17.8%	15.8%	13.1%
	65-74	39.7%	34.5%	31.6%	27.4%	33.8%	32.8%	31.1%	29.5%	36.5%	31.7%	29.1%	24.7%	33.6%	27.3%	25.3%	22.2%
	75-84	39.3%	37.2%	35.5%	31.6%	34.9%	33.2%	33.7%	33.4%	35.9%	34.3%	32.6%	29.0%	32.8%	28.9%	29.0%	27.4%
	85+	29.0%	29.3%	27.9%	26.1%	26.5%	28.3%	27.8%	29.1%	31.2%	28.3%	27.4%	24.3%	30.2%	23.1%	24.6%	22.1%
נקבה	15-24	0.4%	0.5%	0.5%	0.6%	0.3%	0.3%	0.4%	0.6%	0.5%	0.5%	0.5%	0.6%	0.3%	0.4%	0.4%	0.5%
	25-34	1.0%	0.7%	0.6%	0.5%	0.6%	0.8%	0.8%	0.4%	0.6%	0.6%	0.8%	0.5%	0.6%	0.5%	0.5%	0.4%
	35-44	3.8%	2.0%	1.4%	0.9%	2.6%	2.3%	1.2%	1.0%	2.9%	2.0%	1.1%	0.8%	2.1%	1.4%	1.0%	0.8%
	45-54	13.8%	8.3%	5.2%	3.1%	9.7%	7.4%	4.5%	3.3%	9.6%	5.9%	3.7%	2.0%	9.0%	5.1%	3.2%	2.3%
	55-64	29.9%	19.9%	13.8%	10.1%	22.3%	18.0%	12.8%	10.2%	22.4%	16.2%	11.4%	7.1%	22.6%	13.8%	9.3%	6.8%
	65-74	42.9%	31.3%	24.0%	18.4%	34.5%	29.6%	24.2%	19.2%	34.5%	28.1%	22.0%	14.4%	31.7%	23.5%	19.0%	13.8%
	75-84	42.6%	35.6%	30.1%	24.6%	34.8%	34.8%	30.7%	26.2%	37.9%	34.0%	27.7%	19.5%	33.6%	29.7%	25.1%	18.7%
	85+	29.8%	27.0%	23.6%	20.3%	25.6%	26.1%	23.4%	21.9%	30.2%	25.8%	24.5%	17.3%	23.9%	23.5%	20.2%	16.2%

שיעור הביצוע של בדיקת HbA1c בחולי סוכרת בני 18 ומעלה

זכר	18-34	82.3%	77.2%	76.9%	79.3%	78.5%	85.2%	72.4%	86.2%	86.6%	85.9%	82.1%	86.3%	85.0%	80.6%	78.3%	71.4%
	35-44	81.4%	79.7%	81.3%	83.5%	76.1%	75.1%	79.3%	-	86.0%	86.7%	85.1%	86.1%	86.0%	86.0%	82.7%	-
	45-54	85.0%	82.6%	83.3%	83.8%	81.1%	81.5%	79.9%	83.1%	90.3%	88.5%	88.4%	87.5%	90.3%	84.5%	85.4%	82.8%
	55-64	88.9%	87.6%	88.7%	87.3%	85.2%	87.1%	84.8%	87.3%	94.2%	92.7%	92.1%	91.2%	94.2%	90.1%	88.2%	89.1%
	65-74	92.4%	91.3%	92.2%	92.1%	89.0%	89.9%	91.1%	91.1%	96.2%	95.2%	95.5%	95.1%	96.2%	93.6%	92.0%	91.9%
	75-84	91.6%	92.2%	93.1%	93.0%	89.8%	90.5%	91.5%	90.0%	95.7%	95.8%	96.1%	96.2%	94.0%	92.7%	92.6%	94.2%
	85+	89.9%	89.2%	90.4%	89.4%	-	87.0%	85.0%	-	-	92.3%	93.2%	94.1%	-	89.7%	90.0%	-
	18-34	85.0%	84.2%	83.6%	81.1%	78.9%	83.0%	85.5%	78.3%	84.0%	85.3%	82.7%	85.6%	84.5%	85.7%	81.5%	85.2%
נקבה	35-44	87.7%	85.3%	85.6%	82.6%	86.0%	82.5%	-	-	88.7%	90.0%	84.5%	79.0%	89.8%	82.3%	85.0%	-
	45-54	91.0%	88.5%	87.1%	86.7%	87.3%	87.9%	86.5%	-	93.4%	89.4%	88.8%	87.7%	92.2%	89.3%	85.6%	85.9%
	55-64	92.7%	90.7%	90.8%	90.8%	91.1%	90.2%	89.3%	87.9%	95.0%	93.8%	92.7%	92.4%	93.7%	90.5%	89.5%	89.0%
	65-74	93.5%	92.7%	92.9%	93.2%	91.5%	93.5%	92.8%	91.6%	95.9%	95.5%	95.0%	95.3%	94.8%	93.7%	92.7%	92.2%
	75-84	92.5%	92.9%	92.8%	92.6%	87.8%	90.8%	91.0%	88.4%	95.9%	95.7%	94.8%	95.1%	94.2%	93.4%	91.8%	95.1%
	85+	89.3%	88.7%	88.2%	86.6%	-	84.5%	81.0%	82.7%	94.4%	93.4%	90.7%	92.5%	-	92.0%	85.5%	87.9%

שיעור בעלי רמת HbA1c מאוזנת בחולי סוכרת בני 18-84

זכר	18-34	39.2%	44.5%	51.9%	55.2%	-	-	-	-	49.1%	48.5%	58.1%	65.4%	41.2%	42.4%	-	-
	35-44	40.0%	48.2%	58.0%	61.4%	40.0%	49.2%	50.3%	-	55.1%	63.6%	61.2%	61.2%	43.9%	50.0%	52.7%	-
	45-54	45.5%	52.2%	58.0%	62.3%	44.4%	51.4%	52.0%	58.6%	59.4%	62.3%	63.5%	67.6%	43.3%	50.4%	59.6%	58.7%
	55-64	51.4%	59.1%	66.0%	71.1%	49.2%	58.4%	64.1%	68.6%	64.9%	70.6%	72.7%	75.7%	49.8%	60.8%	63.6%	66.0%
	65-74	60.9%	69.9%	75.8%	80.4%	63.9%	69.5%	74.4%	75.4%	76.4%	78.9%	81.5%	83.9%	60.0%	70.6%	73.3%	75.0%
	75-84	78.8%	82.0%	87.0%	89.6%	79.3%	84.0%	85.9%	87.9%	87.5%	91.6%	90.7%	92.5%	80.9%	83.7%	85.5%	88.8%
	18-34	44.6%	53.8%	65.7%	62.9%	-	-	-	-	62.2%	60.5%	63.5%	63.5%	54.6%	-	-	-
	35-44	51.2%	56.4%	60.8%	65.8%	45.4%	56.3%	-	-	68.0%	63.1%	68.2%	77.8%	50.8%	55.5%	58.3%	-
נקבה	45-54	51.2%	55.5%	60.6%	69.2%	48.6%	56.2%	57.7%	-	67.2%	65.5%	68.7%	68.4%	49.5%	55.0%	56.1%	58.5%
	55-64	57.0%	62.6%	68.4%	75.0%	58.6%	65.2%	69.3%	73.2%	72.5%	74.7%	77.2%	79.8%	57.1%	65.0%	66.8%	67.6%
	65-74	66.9%	72.6%	79.5%	82.2%	68.2%	75.6%	78.0%	82.1%	80.2%	83.3%	84.4%	85.1%	63.5%	74.6%	75.2%	78.1%
	75-84	79.2%	84.2%	86.9%	89.3%	80.8%	84.9%	86.7%	87.3%	89.6%	90.6%	91.6%	93.2%	82.6%	86.5%	84.4%	88.0%

מאחדת				מכבי				לאומית				כללית				ניל/SES
4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	

שיעור בעלי רמת HbA1c גבוהה מ-9% בחולי סוכרת בני 18 ומעלה

-	-	20.3%	28.7%	10.4%	12.2%	22.8%	22.4%	-	-	-	-	12.8%	18.0%	25.1%	31.5%	18-34	זכר
-	18.4%	16.9%	20.8%	11.9%	12.2%	15.3%	16.3%	-	16.0%	20.9%	31.0%	13.9%	16.5%	22.6%	27.1%	35-44	
13.2%	11.5%	18.6%	20.0%	9.6%	11.9%	13.7%	15.5%	16.0%	19.0%	18.0%	24.8%	12.5%	14.9%	17.9%	24.6%	45-54	
9.8%	10.1%	11.3%	16.3%	5.7%	7.6%	8.4%	10.7%	9.7%	10.2%	13.6%	17.4%	7.9%	10.1%	14.4%	18.9%	55-64	
4.9%	5.5%	7.0%	11.7%	3.4%	4.2%	5.3%	6.2%	4.6%	7.5%	9.1%	11.1%	3.8%	6.2%	8.9%	12.6%	65-74	
3.4%	4.9%	5.1%	8.6%	1.6%	3.6%	2.9%	4.5%	2.9%	5.8%	6.8%	11.1%	3.8%	4.7%	7.2%	9.4%	75-84	
-	5.1%	5.0%	-	1.9%	3.1%	4.8%	-	-	6.1%	5.6%	-	4.8%	4.5%	7.0%	8.1%	85+	נקבה
-	-	-	17.2%	13.9%	12.3%	16.2%	-	-	-	-	-	12.2%	13.0%	20.8%	29.3%	18-34	
-	15.4%	19.6%	18.5%	8.1%	11.8%	15.6%	12.0%	-	-	18.8%	24.9%	13.0%	15.8%	19.5%	21.9%	35-44	
12.6%	13.6%	16.3%	17.9%	9.4%	9.7%	11.3%	10.4%	-	14.4%	16.7%	24.2%	9.9%	14.1%	18.0%	21.3%	45-54	
7.5%	7.8%	9.6%	13.2%	5.5%	6.3%	7.5%	8.8%	7.4%	8.3%	11.1%	15.3%	7.1%	9.7%	13.2%	16.4%	55-64	
4.7%	5.5%	5.9%	10.4%	3.2%	3.4%	3.6%	5.4%	5.3%	5.2%	7.4%	10.2%	4.4%	5.3%	8.7%	12.5%	65-74	
4.2%	4.7%	3.5%	9.0%	2.1%	2.6%	3.7%	4.1%	4.1%	5.2%	6.7%	10.1%	3.8%	4.9%	6.6%	9.4%	75-84	
-	4.5%	4.3%	-	3.1%	4.2%	3.0%	2.7%	-	5.9%	5.0%	-	3.1%	5.3%	7.0%	8.2%	85+	

שיעור הביצוע של בדיקות עיניים בחולי סוכרת בני 18-84

-	53.4%	60.7%	57.5%	75.4%	69.0%	75.6%	72.6%	-	-	46.3%	-	56.2%	59.7%	53.9%	61.5%	18-34	זכר
-	60.2%	64.1%	64.0%	73.8%	76.5%	76.1%	76.1%	-	46.5%	43.6%	51.6%	59.7%	57.1%	59.7%	66.1%	35-44	
67.7%	61.9%	63.1%	66.4%	79.3%	79.2%	78.8%	79.7%	52.3%	46.2%	52.7%	52.8%	58.8%	61.1%	61.3%	67.1%	45-54	
65.8%	63.5%	64.8%	68.9%	80.7%	82.6%	82.0%	82.3%	51.3%	52.3%	57.4%	57.6%	64.7%	65.6%	65.5%	68.2%	55-64	
73.1%	71.9%	72.8%	71.6%	86.4%	87.5%	86.5%	85.7%	65.5%	64.5%	63.9%	64.4%	72.8%	73.4%	70.2%	71.7%	65-74	
77.4%	77.2%	71.9%	71.2%	86.6%	86.5%	84.9%	84.4%	66.0%	66.1%	66.3%	62.0%	75.9%	74.1%	68.4%	66.8%	75-84	
-	-	58.3%	67.9%	73.7%	70.5%	73.3%	76.3%	-	-	-	-	65.4%	63.4%	64.8%	69.0%	18-34	נקבה
-	63.1%	59.1%	70.4%	72.9%	74.8%	75.6%	78.7%	-	-	55.2%	59.1%	63.1%	64.7%	65.0%	72.9%	35-44	
68.1%	64.3%	65.2%	73.5%	79.4%	81.0%	79.2%	83.0%	-	55.0%	59.6%	64.5%	68.3%	67.5%	70.2%	75.6%	45-54	
73.7%	72.5%	71.3%	74.2%	83.1%	84.1%	84.4%	84.0%	62.1%	63.1%	63.4%	65.8%	72.5%	73.2%	71.1%	73.6%	55-64	
78.9%	75.3%	77.9%	74.4%	87.2%	87.7%	86.4%	85.8%	69.3%	71.0%	67.4%	68.0%	78.3%	78.0%	72.8%	71.5%	65-74	
75.3%	69.3%	70.9%	64.3%	82.6%	83.0%	80.5%	77.7%	63.5%	64.4%	62.8%	62.1%	74.1%	72.4%	66.6%	61.4%	75-84	

שיעור הביצוע של בדיקות לאיתור חלבון בשתן בחולי סוכרת בני 18-84

-	68.9%	70.4%	72.8%	82.0%	75.6%	80.4%	77.4%	-	-	71.6%	-	64.5%	62.3%	64.8%	66.7%	18-34	זכר
-	75.4%	73.8%	73.9%	83.0%	82.0%	81.3%	82.8%	-	70.4%	62.1%	61.5%	71.7%	69.5%	69.9%	70.3%	35-44	
79.3%	71.7%	76.8%	74.9%	84.6%	85.4%	84.4%	86.9%	77.9%	70.7%	71.3%	68.9%	73.0%	73.6%	72.8%	74.7%	45-54	
78.6%	77.5%	79.7%	78.8%	88.4%	89.8%	89.5%	91.6%	78.9%	75.1%	74.6%	75.2%	77.4%	78.8%	78.9%	80.0%	55-64	
82.5%	82.6%	82.2%	83.0%	93.3%	93.3%	92.4%	91.6%	84.0%	81.9%	77.0%	77.1%	82.8%	83.6%	83.3%	84.5%	65-74	
80.2%	81.1%	82.5%	77.0%	94.0%	92.8%	91.4%	90.4%	79.2%	78.1%	74.2%	72.7%	82.0%	83.7%	81.3%	80.8%	75-84	
-	-	67.9%	70.5%	72.8%	73.0%	72.7%	78.7%	-	-	-	-	63.8%	62.7%	62.0%	67.5%	18-34	נקבה
-	68.4%	68.5%	75.7%	70.4%	76.8%	82.8%	80.8%	-	-	62.6%	69.8%	65.4%	69.6%	69.3%	74.4%	35-44	
74.2%	73.6%	78.5%	81.3%	83.2%	83.0%	84.1%	89.3%	-	74.5%	70.9%	73.2%	70.2%	72.1%	76.8%	79.9%	45-54	
77.6%	79.2%	80.5%	83.8%	88.0%	88.8%	89.5%	91.3%	80.3%	75.9%	76.2%	77.0%	77.3%	77.8%	80.2%	84.2%	55-64	
82.3%	80.0%	81.4%	82.6%	91.6%	91.7%	91.7%	91.7%	80.8%	79.7%	79.6%	76.8%	80.8%	81.5%	82.1%	83.7%	65-74	
76.6%	73.4%	77.2%	76.4%	88.4%	87.9%	87.8%	87.0%	72.3%	71.1%	69.9%	65.8%	75.3%	78.0%	78.2%	75.7%	75-84	

שיעור התייעוד של GFR בחולי סוכרת בני 18-84

-	75.8%	81.1%	81.9%	87.2%	82.3%	85.9%	86.6%	-	-	83.3%	-	78.3%	76.6%	78.9%	83.0%	18-34	זכר
-	83.0%	80.5%	84.4%	86.1%	85.5%	86.9%	86.2%	-	77.5%	73.6%	71.4%	83.3%	81.9%	81.3%	82.7%	35-44	
84.2%	83.0%	85.7%	82.0%	87.7%	89.4%	89.3%	91.3%	82.1%	79.7%	79.6%	80.0%	85.5%	85.0%	84.0%	86.2%	45-54	
88.7%	88.2%	89.3%	87.5%	92.0%	93.2%	93.6%	95.2%	86.2%	84.5%	86.5%	84.0%	88.8%	90.1%	88.8%	90.0%	55-64	
92.7%	93.4%	93.2%	92.4%	96.3%	96.5%	96.4%	97.1%	91.8%	90.7%	90.2%	87.7%	94.0%	93.7%	93.2%	93.9%	65-74	
95.8%	95.9%	96.0%	95.2%	97.7%	98.2%	97.6%	98.1%	91.2%	93.9%	92.2%	90.8%	96.1%	95.7%	95.0%	93.8%	75-84	
-	-	88.7%	82.4%	90.5%	85.8%	87.1%	89.3%	-	-	-	-	87.2%	85.7%	88.1%	88.5%	18-34	נקבה
-	86.4%	83.5%	87.8%	83.1%	88.8%	91.9%	89.9%	-	-	81.8%	85.1%	86.2%	87.0%	88.4%	90.0%	35-44	
85.4%	86.1%	90.7%	90.1%	88.8%	90.7%	91.1%	94.6%	-	84.2%	85.9%	85.3%	89.1%	88.3%	89.7%	92.0%	45-54	
89.8%	90.6%	91.2%	92.3%	93.4%	94.1%	95.2%	95.5%	89.1%	88.6%	89.9%	90.0%	92.3%	91.8%	92.0%	94.0%	55-64	
92.8%	94.3%	94.7%	93.9%	96.8%	96.4%	96.8%	96.8%	91.9%	93.4%	92.5%	93.3%	95.1%	94.6%	94.6%	95.1%	65-74	
97.5%	95.4%	95.9%	95.4%	97.1%	97.0%	97.6%	98.1%	92.1%	91.7%	92.0%	89.9%	95.4%	95.8%	95.7%	94.9%	75-84	

מאוחדת				סכבי				לאומית				כללית				SES/נל
4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	

שיעור חולי סוכרת עם פגיעה כלייתית בני 18-84

-	-	15.6%	16.6%	5.5%	8.6%	11.3%	10.2%	-	-	-	-	6.9%	10.0%	17.1%	18.8%	18-34	זכר
-	25.2%	22.3%	25.5%	12.2%	19.0%	18.0%	19.5%	-	19.4%	20.9%	27.4%	11.1%	18.8%	23.4%	24.3%	35-44	
23.3%	20.3%	27.2%	28.4%	16.0%	18.6%	19.7%	23.7%	24.4%	25.5%	26.8%	28.9%	18.6%	22.7%	26.7%	27.7%	45-54	
26.6%	28.1%	30.8%	32.9%	20.3%	21.4%	24.9%	25.3%	29.6%	28.2%	29.7%	30.7%	25.3%	28.7%	31.7%	33.2%	55-64	
34.1%	38.5%	38.8%	42.6%	31.3%	32.7%	34.3%	34.9%	33.4%	34.3%	34.3%	38.6%	36.2%	37.3%	40.8%	44.7%	65-74	
50.0%	53.4%	50.3%	54.3%	49.8%	51.6%	52.3%	49.6%	46.3%	43.2%	38.8%	40.1%	53.2%	54.5%	55.6%	55.7%	75-84	
-	-	-	16.3%	4.5%	6.4%	8.6%	12.0%	-	-	-	-	8.7%	11.6%	16.4%	22.1%	18-34	נקבה
-	17.0%	20.3%	21.4%	9.6%	11.3%	15.2%	15.4%	-	-	17.5%	22.3%	15.4%	17.0%	19.8%	19.9%	35-44	
18.5%	21.9%	19.9%	21.9%	10.1%	13.7%	14.6%	16.5%	-	16.6%	18.5%	23.3%	16.4%	18.6%	23.1%	24.4%	45-54	
21.5%	20.9%	23.0%	27.0%	14.0%	14.4%	18.0%	17.9%	16.0%	18.4%	20.4%	24.0%	18.5%	20.4%	24.8%	27.0%	55-64	
27.9%	28.9%	32.7%	35.6%	20.5%	22.4%	25.4%	26.7%	21.3%	20.3%	21.7%	24.4%	25.2%	29.0%	34.2%	38.7%	65-74	
47.7%	47.6%	51.4%	53.5%	40.7%	44.1%	43.8%	46.6%	29.4%	27.8%	28.3%	28.4%	46.8%	49.9%	52.2%	54.8%	75-84	

שיעור התיעוד של מדידות לחץ דם בחולי סוכרת בני 18 ומעלה

-	72.0%	76.5%	81.5%	83.4%	80.0%	83.3%	79.6%	-	-	73.5%	-	72.4%	69.3%	73.7%	83.7%	18-34	זכר
-	78.7%	83.7%	85.8%	86.1%	87.1%	87.3%	84.4%	-	62.4%	71.8%	70.8%	72.7%	77.6%	80.4%	85.4%	35-44	
87.9%	84.4%	86.0%	87.3%	88.6%	89.2%	89.7%	90.3%	72.8%	77.6%	79.4%	77.8%	81.4%	82.7%	84.7%	88.9%	45-54	
86.7%	86.3%	87.9%	90.6%	91.9%	92.9%	93.6%	91.6%	81.1%	81.6%	85.9%	85.5%	86.5%	88.4%	89.7%	93.3%	55-64	
91.9%	91.6%	91.4%	91.2%	96.1%	95.7%	95.8%	96.8%	88.8%	87.6%	88.6%	90.5%	90.9%	92.0%	92.5%	94.9%	65-74	
95.3%	93.5%	93.7%	92.9%	97.6%	97.2%	96.2%	95.0%	88.6%	85.9%	84.8%	81.9%	92.4%	93.7%	93.9%	95.5%	75-84	
-	85.4%	85.2%	-	95.3%	94.4%	92.2%	-	-	80.7%	77.9%	-	89.2%	92.6%	91.7%	93.0%	85+	נקבה
-	-	80.4%	86.0%	82.3%	84.7%	83.7%	84.6%	-	-	-	-	73.3%	74.5%	79.2%	85.2%	18-34	
-	81.6%	86.2%	90.1%	79.6%	88.4%	88.8%	88.4%	-	-	78.5%	79.5%	74.9%	79.2%	83.3%	88.7%	35-44	
82.2%	84.3%	89.8%	90.5%	87.2%	89.5%	90.4%	90.6%	-	79.2%	82.7%	84.7%	83.4%	86.2%	88.5%	92.3%	45-54	
89.2%	90.2%	90.5%	92.7%	92.1%	93.1%	94.1%	94.2%	87.4%	86.2%	88.7%	90.3%	88.1%	89.6%	91.7%	95.0%	55-64	
92.1%	92.5%	93.0%	93.1%	95.3%	95.6%	95.5%	96.0%	89.4%	89.5%	91.0%	90.2%	90.8%	92.7%	93.3%	95.5%	65-74	
92.0%	90.2%	92.2%	91.4%	96.0%	94.8%	95.1%	94.7%	81.2%	85.3%	84.4%	83.2%	90.0%	92.1%	93.2%	94.5%	75-84	
81.5%	79.5%	80.5%	-	90.2%	88.7%	89.3%	89.7%	77.3%	74.6%	74.2%	-	81.8%	86.5%	87.4%	89.6%	85+	

שיעור בעלי לחץ דם נמוך או שווה ל-140/90 ממ"מ בחולי סוכרת בני 18 ומעלה

-	-	91.3%	94.2%	97.2%	94.6%	92.3%	-	-	-	-	-	94.9%	94.5%	95.8%	94.3%	18-34	זכר
-	87.7%	82.3%	84.8%	91.0%	88.8%	90.1%	90.7%	-	-	85.8%	93.0%	89.5%	88.4%	88.1%	90.9%	35-44	
83.3%	80.6%	80.8%	82.2%	88.5%	86.9%	85.8%	89.0%	-	83.9%	83.8%	86.0%	84.6%	85.6%	85.2%	88.3%	45-54	
73.9%	75.2%	76.3%	76.6%	86.7%	85.6%	85.5%	86.6%	79.1%	82.4%	83.1%	83.3%	82.4%	82.9%	82.5%	86.6%	55-64	
73.1%	73.3%	72.0%	73.9%	87.3%	85.7%	86.4%	86.1%	81.8%	81.0%	81.5%	85.1%	81.7%	81.6%	81.3%	84.6%	65-74	
72.9%	71.3%	73.3%	72.2%	85.9%	83.8%	85.4%	85.9%	82.5%	84.3%	85.4%	86.0%	78.5%	79.2%	78.3%	82.5%	75-84	
-	73.4%	71.1%	-	83.1%	83.4%	82.8%	-	-	87.8%	87.0%	-	76.4%	78.3%	79.2%	83.1%	85+	נקבה
-	-	-	95.8%	95.5%	94.9%	96.0%	-	-	-	-	-	95.5%	97.0%	97.0%	95.8%	18-34	
-	91.1%	89.5%	92.6%	94.8%	91.5%	90.7%	95.9%	-	-	94.0%	94.7%	90.4%	91.7%	91.0%	92.2%	35-44	
84.6%	85.3%	82.4%	84.8%	91.8%	89.0%	89.4%	92.5%	-	87.6%	90.1%	90.0%	88.0%	87.4%	87.9%	90.1%	45-54	
79.6%	79.4%	79.4%	79.1%	89.0%	88.9%	87.4%	90.3%	82.8%	85.1%	86.6%	87.9%	85.3%	86.1%	84.7%	87.0%	55-64	
75.6%	73.8%	73.3%	72.7%	85.4%	85.2%	86.0%	84.7%	84.3%	82.3%	83.3%	86.8%	82.2%	82.4%	80.9%	83.0%	65-74	
73.2%	68.3%	68.2%	67.2%	80.0%	79.9%	80.1%	81.2%	83.1%	81.0%	83.3%	84.6%	74.7%	75.3%	75.6%	79.3%	75-84	
-	67.7%	69.9%	-	76.5%	77.3%	76.3%	75.4%	-	79.2%	82.0%	-	73.6%	75.0%	75.5%	80.8%	85+	

שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול בחולי סוכרת בני 18 ומעלה

-	77.6%	79.6%	83.1%	82.5%	78.5%	83.7%	83.3%	-	-	82.1%	-	77.4%	72.9%	77.4%	80.9%	18-34	זכר
-	83.3%	80.3%	85.7%	84.8%	84.5%	84.8%	84.8%	-	77.9%	73.1%	74.5%	82.7%	81.0%	79.8%	81.6%	35-44	
83.3%	82.5%	85.4%	83.6%	87.0%	88.2%	88.0%	89.0%	82.1%	79.1%	81.0%	80.5%	83.9%	83.4%	82.5%	85.1%	45-54	
88.2%	87.3%	89.2%	89.8%	90.8%	92.1%	92.4%	94.3%	88.2%	83.8%	87.0%	85.5%	87.5%	89.0%	87.6%	89.2%	55-64	
91.5%	91.8%	91.9%	93.3%	95.3%	95.5%	95.2%	96.4%	91.1%	89.9%	90.4%	89.7%	92.8%	92.9%	91.9%	92.3%	65-74	
93.7%	94.9%	93.5%	94.5%	95.8%	96.6%	95.9%	96.8%	90.0%	91.3%	89.7%	88.5%	93.8%	94.0%	93.2%	92.4%	75-84	
-	88.8%	89.7%	-	93.9%	93.1%	94.4%	-	-	85.4%	85.3%	-	90.6%	92.0%	90.3%	90.5%	85+	נקבה
-	-	85.7%	80.8%	82.7%	80.2%	80.1%	80.5%	-	-	-	-	82.3%	81.0%	83.2%	84.6%	18-34	
-	85.0%	80.7%	88.1%	78.7%	83.8%	87.9%	87.5%	-	-	82.2%	82.3%	82.8%	85.7%	85.5%	88.2%	35-44	
85.9%	84.8%	91.1%	91.7%	87.2%	88.7%	89.1%	92.0%	-	85.2%	87.2%	86.5%	87.4%	87.4%	88.8%	91.1%	45-54	
91.0%	89.8%	91.1%	93.9%	92.0%	93.1%	93.6%	94.4%	88.8%	89.5%	90.8%	90.8%	91.2%	90.8%	91.1%	93.0%	55-64	
92.7%	93.5%	94.4%	94.7%	95.1%	95.4%	95.7%	95.8%	90.4%	92.9%	93.1%	92.3%	93.8%	93.7%	93.5%	93.8%	65-74	
94.3%	93.2%	93.9%	94.0%	95.3%	94.8%	95.9%	95.9%	87.5%	89.3%	90.1%	87.4%	93.5%	94.0%	93.6%	92.7%	75-84	
83.4%	85.5%	89.6%	-	90.6%	91.2%	92.2%	91.3%	75.3%	77.0%	80.4%	-	89.4%	90.0%	88.7%	90.6%	85+	

כללית				לאומית				מכבי				מאוחדת				גיל/SES
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	

שיעור בעלי רמת LDL נמוכה או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל בחולי סוכרת בני 18-80

זכר	18-34	59.9%	55.7%	56.9%	50.0%	-	-	-	-	61.3%	53.6%	53.9%	52.9%	45.0%	48.1%	40.8%	44.6%
	35-44	55.4%	54.1%	53.9%	49.9%	33.3%	33.8%	33.1%	-	50.1%	50.2%	49.9%	48.2%	37.1%	35.5%	32.6%	-
	45-54	63.9%	61.1%	60.4%	60.3%	44.6%	42.3%	45.5%	46.9%	62.2%	58.3%	57.5%	61.5%	42.8%	45.1%	45.7%	46.1%
	55-64	70.5%	70.2%	71.5%	73.7%	51.1%	52.9%	55.9%	59.0%	68.3%	67.8%	68.7%	69.3%	52.3%	51.9%	53.2%	54.4%
	65-74	77.7%	77.1%	79.0%	80.7%	60.1%	61.8%	63.3%	65.1%	78.6%	77.2%	77.1%	78.6%	61.7%	63.8%	64.2%	65.3%
נקבה	18-34	53.8%	57.7%	50.3%	52.0%	-	-	-	-	-	52.1%	46.3%	55.2%	41.0%	41.7%	46.6%	34.0%
	35-44	57.0%	51.7%	50.4%	49.8%	33.9%	32.4%	-	-	48.8%	47.5%	42.4%	43.7%	37.3%	37.1%	29.1%	-
	45-54	63.6%	58.4%	54.3%	49.9%	37.9%	38.5%	32.9%	-	57.0%	51.1%	46.3%	47.0%	39.9%	32.4%	33.3%	35.0%
	55-64	69.4%	64.5%	62.8%	60.7%	43.5%	46.1%	42.5%	42.1%	64.6%	59.7%	56.5%	54.3%	46.3%	45.3%	42.2%	41.2%
	65-74	75.9%	72.3%	71.0%	70.4%	52.0%	52.8%	52.5%	57.1%	72.4%	68.5%	66.8%	64.1%	54.9%	51.5%	51.0%	53.7%
	75-79	74.9%	71.2%	71.7%	69.0%	55.7%	56.6%	57.5%	51.0%	73.3%	69.0%	69.7%	68.1%	52.4%	56.3%	54.5%	51.8%

שיעור התייעוד של מרכיבי BMI בחולי סוכרת בני 20-64

זכר	20-34	83.8%	77.9%	73.1%	78.7%	-	70.6%	-	-	77.2%	80.3%	72.5%	72.5%	83.1%	78.9%	-	-
	35-44	85.0%	80.5%	77.5%	73.1%	71.7%	71.3%	66.7%	-	80.5%	79.3%	79.5%	78.1%	85.7%	84.1%	78.7%	-
	45-54	87.1%	82.9%	81.2%	81.2%	76.0%	77.6%	74.8%	75.9%	83.5%	80.0%	78.2%	76.8%	84.4%	86.0%	83.0%	83.5%
	55-64	92.7%	88.9%	88.9%	86.6%	77.0%	80.2%	75.4%	74.5%	82.6%	82.2%	79.4%	78.3%	86.6%	83.9%	83.5%	85.7%
	65-74	85.5%	79.9%	76.0%	73.1%	-	-	-	-	86.7%	79.1%	78.9%	77.5%	85.8%	79.3%	-	-
נקבה	20-34	88.2%	82.6%	79.4%	76.9%	74.0%	79.5%	-	-	82.9%	82.0%	77.2%	68.5%	89.2%	82.7%	80.1%	-
	35-44	91.4%	86.5%	85.6%	82.5%	81.4%	81.0%	76.7%	-	84.2%	80.1%	79.3%	75.1%	90.2%	86.5%	82.6%	82.6%
	45-54	94.0%	91.0%	89.7%	88.5%	83.2%	83.4%	80.5%	83.8%	85.5%	81.8%	81.0%	76.7%	90.3%	87.5%	85.8%	87.6%
	55-64	94.0%	91.0%	89.7%	88.5%	83.2%	83.4%	80.5%	83.8%	85.5%	81.8%	81.0%	76.7%	90.3%	87.5%	85.8%	87.6%
	65-74	94.0%	91.0%	89.7%	88.5%	83.2%	83.4%	80.5%	83.8%	85.5%	81.8%	81.0%	76.7%	90.3%	87.5%	85.8%	87.6%

שיעור ההימצאות של עודף משקל בקרב חולי סוכרת בני 20-64

זכר	20-34	28.4%	32.5%	29.2%	27.7%	-	-	-	-	-	26.8%	32.3%	-	29.7%	-	-	-
	35-44	35.5%	33.3%	34.7%	39.5%	30.7%	35.3%	-	-	34.60%	33.7%	37.9%	36.2%	29.1%	34.9%	32.3%	-
	45-54	40.8%	40.3%	40.3%	42.3%	35.6%	37.6%	42.6%	-	35.9%	35.0%	40.1%	40.2%	33.9%	33.6%	37.5%	45.7%
	55-64	41.3%	42.4%	43.9%	46.2%	38.8%	40.1%	43.8%	48.3%	40.8%	38.9%	43.7%	45.7%	38.9%	38.4%	42.3%	43.2%
	65-74	25.2%	27.8%	26.9%	26.4%	-	-	-	-	-	24.8%	28.8%	32.6%	26.5%	-	-	-
נקבה	20-34	25.6%	25.6%	26.3%	29.7%	23.3%	22.0%	-	-	25.4%	22.3%	25.5%	27.9%	26.3%	28.6%	25.5%	-
	35-44	24.2%	27.5%	30.7%	30.3%	23.3%	25.3%	29.1%	-	22.5%	26.1%	29.8%	34.8%	21.9%	24.1%	31.5%	30.1%
	45-54	24.2%	27.5%	30.7%	30.3%	23.3%	25.3%	29.1%	-	22.5%	26.1%	29.8%	34.8%	21.9%	24.1%	31.5%	30.1%
	55-64	26.5%	30.0%	34.0%	37.9%	26.2%	28.7%	33.7%	34.9%	27.4%	26.9%	32.0%	37.2%	24.1%	26.8%	32.3%	34.4%
	65-74	26.5%	30.0%	34.0%	37.9%	26.2%	28.7%	33.7%	34.9%	27.4%	26.9%	32.0%	37.2%	24.1%	26.8%	32.3%	34.4%

שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב חולי סוכרת בני 20-64

זכר	20-34	23.0%	18.3%	17.1%	11.9%	-	-	-	-	-	25.9%	10.8%	-	20.3%	-	-	-
	35-44	31.2%	30.9%	29.0%	23.7%	35.1%	26.6%	-	-	30.0%	30.2%	28.3%	24.0%	37.1%	28.1%	31.6%	-
	45-54	30.4%	29.9%	30.3%	30.3%	32.9%	34.0%	29.4%	-	33.1%	32.9%	33.5%	29.8%	35.4%	34.1%	32.2%	28.7%
	55-64	29.9%	29.2%	28.2%	28.1%	32.8%	30.1%	32.1%	29.3%	32.2%	33.1%	30.9%	30.3%	34.8%	33.9%	31.8%	28.4%
	65-74	25.6%	20.9%	20.6%	17.2%	-	-	-	-	-	20.7%	14.7%	12.2%	23.8%	-	-	-
נקבה	20-34	32.7%	30.1%	26.5%	20.0%	27.0%	28.4%	-	-	26.1%	29.2%	28.8%	27.9%	30.0%	30.0%	32.7%	-
	35-44	34.3%	31.6%	29.7%	28.4%	32.0%	32.5%	34.9%	-	32.2%	30.3%	30.7%	28.0%	36.7%	32.7%	30.3%	28.4%
	45-54	34.3%	31.6%	29.7%	28.4%	32.0%	32.5%	34.9%	-	32.2%	30.3%	30.7%	28.0%	36.7%	32.7%	30.3%	28.4%
	55-64	33.4%	31.4%	29.6%	29.4%	35.6%	32.5%	29.0%	25.6%	32.0%	32.2%	30.5%	26.3%	31.9%	32.4%	29.2%	31.8%
	65-74	33.4%	31.4%	29.6%	29.4%	35.6%	32.5%	29.0%	25.6%	32.0%	32.2%	30.5%	26.3%	31.9%	32.4%	29.2%	31.8%

שיעור ההימצאות של השמנת יתר חולנית בקרב חולי סוכרת בני 20-64

זכר	20-34	17.5%	13.7%	9.7%	12.6%	-	-	-	-	-	11.4%	15.1%	-	18.8%	-	-	-
	35-44	18.1%	18.8%	17.4%	12.4%	22.9%	22.4%	-	-	22.9%	22.2%	19.5%	16.4%	23.0%	25.1%	19.3%	-
	45-54	14.8%	15.1%	14.4%	13.5%	17.8%	18.3%	16.5%	-	20.5%	20.9%	16.1%	16.7%	19.8%	20.8%	16.8%	13.9%
	55-64	13.0%	11.8%	11.6%	10.4%	14.4%	14.5%	11.8%	10.6%	16.9%	15.7%	12.8%	9.9%	14.6%	16.3%	14.3%	12.1%
	65-74	23.6%	18.6%	16.1%	10.4%	-	-	-	-	-	24.8%	16.6%	10.5%	20.5%	-	-	-
נקבה	20-34	31.6%	29.7%	25.9%	23.7%	38.4%	33.9%	-	-	39.0%	31.8%	25.5%	15.8%	28.8%	30.5%	27.3%	-
	35-44	34.4%	30.2%	25.1%	22.3%	38.2%	33.6%	25.1%	-	37.1%	33.0%	27.2%	22.5%	35.8%	34.5%	25.5%	22.7%
	45-54	34.4%	30.2%	25.1%	22.3%	38.2%	33.6%	25.1%	-	37.1%	33.0%	27.2%	22.5%	35.8%	34.5%	25.5%	22.7%
	55-64	32.9%	27.1%	21.1%	16.5%	31.1%	28.7%	22.3%	17.2%	32.2%	31.3%	24.0%	17.2%	36.9%	32.5%	25.7%	18.3%
	65-74	32.9%	27.1%	21.1%	16.5%	31.1%	28.7%	22.3%	17.2%	32.2%	31.3%	24.0%	17.2%	36.9%	32.5%	25.7%	18.3%

שיעור התייעוד של מרכיבי BMI בחולי סוכרת בני 65-84

זכר	65-69	92.0%	88.3%	87.3%	86.0%	85.6%	84.0%	84.5%	87.2%	87.8%	84.4%	84.3%	80.8%	84.9%	86.2%	84.3%	83.7%
	70-74	93.9%	92.2%	92.0%	90.6%	89.8%	88.2%	87.6%	88.5%	90.8%	86.5%	85.8%	82.8%	87.2%	86.3%	89.0%	89.7%
	75-79	94.1%	92.2%	92.9%	92.1%	71.3%	78.5%	79.1%	82.8%	87.7%	85.5%	87.5%	83.8%	84.9%	87.8%	86.8%	90.3%
	80-84	92.3%	91.4%	91.7%	90.5%	-	74.5%	77.0%	-	81.6%	82.4%	83.4%	84.0%	-	83.5%	87.0%	90.3%
	85-89	93.1%	89.8%	88.3%	87.3%	86.9%	87.7%	86.3%	87.8%	86.3%	85.3%	83.9%	81.5%	88.1%	88.6%	88.1%	84.2%
נקבה	65-69	93.1%	93.1%	93.1%	93.1%	86.9%	87.7%	86.3%	87.8%	86.3%	85.3%	83.9%	81.5%	88.1%	88.6%	88.1%	84.2%
	70-74	94.3%	92.2%	92.8%	91.4%	87.6%	89.7%	89.3%	91.1%	87.2%	84.3%	84.2%	81.7%	88.6%	88.5%	88.3%	89.5%
	75-79	92.7%	90.5%	92.0%	88.7%	72.6%	77.0%	80.3%	80.5%	79.7%	83.2%	82.5%	80.6%	84.8%	84.8%	85.7%	88.8%
	80-84	89.5%	90.3%	89.2%	86.9%	66.5%	70.8%	71.5%	-	82.4%	81.3%	81.1%	76.5%	81.3%	84.4%	83.4%	85.5%
	85-89	89.5%	90.3%	89.2%	86.9%	66.5%	70.8%	71.5%	-	82.4%	81.3%	81.1%	76.5%	81.3%	84.4%	83.4%	85.5%

מאוחדת				סכבי				לאומית				כללית				SES/גיל
4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	

שיעור ההימצאות של השמנת יתר חולנית בקרב חולי סוכרת בני 65-84

39.1%	43.8%	50.4%	49.4%	37.0%	38.4%	45.7%	45.4%	37.0%	40.3%	42.0%	45.5%	35.7%	36.6%	37.6%	39.0%	65-69	זכר
34.2%	39.7%	43.5%	42.8%	32.2%	39.2%	42.9%	44.9%	34.8%	35.5%	40.0%	44.0%	31.2%	34.2%	37.1%	37.8%	70-74	
26.4%	36.7%	41.6%	39.6%	29.7%	31.7%	39.2%	41.7%	26.6%	34.3%	36.4%	39.7%	27.1%	28.6%	33.1%	34.0%	75-79	
32.7%	34.6%	41.8%	-	23.5%	29.1%	35.1%	31.8%	-	31.3%	31.1%	-	23.8%	27.0%	31.7%	32.0%	80-84	
45.4%	54.0%	64.6%	68.1%	43.0%	52.1%	61.8%	61.7%	40.1%	49.4%	59.9%	64.4%	42.4%	47.4%	56.2%	62.3%	65-69	נקבה
38.2%	51.1%	60.8%	65.7%	41.5%	49.0%	58.8%	59.9%	38.3%	46.7%	55.0%	64.9%	40.2%	45.7%	51.9%	60.8%	70-74	
42.3%	51.5%	55.3%	58.6%	37.6%	47.2%	56.9%	57.3%	-	45.9%	51.4%	52.4%	35.2%	42.6%	49.9%	55.5%	75-79	
-	51.6%	56.4%	-	33.7%	44.6%	52.4%	56.8%	-	46.1%	51.1%	-	36.3%	41.5%	46.1%	51.8%	80-84	

שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בחולי סוכרת בני 18 ומעלה

-	32.9%	37.8%	47.2%	35.1%	34.1%	34.0%	32.3%	-	-	49.4%	-	35.9%	34.1%	37.5%	53.8%	18-34	זכר
-	36.5%	42.5%	51.0%	31.6%	30.0%	32.2%	36.6%	-	41.3%	50.9%	52.5%	35.5%	34.9%	40.7%	52.7%	35-44	
42.8%	42.3%	42.5%	52.5%	37.3%	35.5%	38.7%	41.3%	54.4%	57.8%	58.1%	59.3%	42.4%	42.3%	47.8%	57.9%	45-54	
51.6%	48.1%	49.8%	56.0%	49.9%	48.7%	45.3%	49.9%	67.1%	61.7%	66.6%	61.1%	53.0%	51.0%	53.8%	64.3%	55-64	
65.9%	64.3%	63.2%	67.2%	69.6%	64.0%	59.7%	60.4%	79.7%	78.8%	77.0%	78.8%	69.5%	66.8%	65.9%	72.4%	65-74	נקבה
80.8%	72.4%	70.8%	73.5%	77.9%	73.5%	66.3%	61.0%	87.4%	83.1%	79.6%	77.8%	79.6%	74.9%	72.9%	76.8%	75-84	
-	75.0%	75.3%	-	73.3%	72.2%	65.5%	-	-	74.7%	81.1%	-	83.3%	78.8%	74.0%	76.8%	85+	
-	-	40.5%	42.0%	40.3%	34.9%	34.0%	36.7%	-	-	-	-	37.6%	35.7%	41.0%	55.9%	18-34	
-	39.3%	36.6%	49.4%	35.4%	30.9%	35.9%	35.1%	-	-	57.2%	53.5%	41.5%	36.6%	44.9%	58.8%	35-44	נקבה
38.0%	35.6%	44.8%	54.3%	36.6%	34.5%	35.4%	39.0%	-	62.3%	67.6%	65.5%	46.2%	41.0%	49.9%	62.3%	45-54	
50.6%	43.3%	46.8%	54.8%	47.9%	44.3%	43.2%	44.6%	67.9%	65.5%	67.6%	67.4%	53.9%	49.0%	51.6%	63.9%	55-64	
64.1%	58.6%	56.4%	62.6%	64.7%	59.8%	53.9%	53.5%	81.5%	79.5%	76.7%	78.4%	66.2%	61.4%	59.8%	67.8%	65-74	
69.8%	64.0%	65.2%	69.5%	70.3%	62.1%	57.8%	57.8%	82.4%	76.8%	77.8%	75.2%	73.6%	69.0%	65.1%	71.6%	75-84	נקבה
78.3%	67.5%	65.6%	-	61.4%	55.9%	54.7%	55.4%	80.0%	78.3%	70.2%	-	75.5%	70.2%	66.7%	71.0%	85+	

שיעור קבלת חיסון נגד פניאומוקוק בחולי סוכרת בני 65-74

76.0%	75.1%	77.3%	83.9%	85.9%	85.6%	84.9%	86.9%	83.9%	83.8%	82.4%	84.2%	77.7%	77.5%	79.0%	86.4%	65-69	זכר
90.2%	87.4%	85.6%	90.2%	93.7%	92.3%	92.2%	92.0%	97.5%	96.8%	96.2%	96.9%	90.4%	90.9%	91.6%	95.2%	70-74	
71.3%	73.9%	72.5%	82.2%	82.6%	81.8%	81.3%	81.8%	86.5%	85.7%	85.6%	86.8%	75.8%	73.1%	75.8%	84.3%	65-69	נקבה
88.7%	80.5%	83.1%	85.8%	88.9%	88.2%	87.4%	89.8%	94.6%	96.2%	96.7%	95.8%	86.8%	87.1%	87.5%	92.9%	70-74	

שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב בני 2-17

0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2-4	זכר
0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	5-9	
0.1%	0.2%	0.1%	0.1%	0.2%	0.1%	0.2%	0.2%	0.1%	0.2%	0.2%	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	10-14	
0.3%	0.3%	0.3%	0.2%	0.3%	0.3%	0.4%	0.4%	0.3%	0.2%	0.3%	0.2%	0.3%	0.4%	0.3%	0.2%	15-17	
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2-4	נקבה
0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	5-9	
0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.1%	0.3%	0.2%	0.2%	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	10-14	
0.3%	0.3%	0.3%	0.2%	0.3%	0.2%	0.3%	0.3%	0.2%	0.2%	0.3%	0.2%	0.4%	0.3%	0.3%	0.2%	15-17	

תרופות אנטיביוטיות

היקף השימוש בתרופות אנטיביוטיות סיסטמיות, ל-1000 איש, ליום

13.4	14.6	13.6	12.6	0.6	0.5	0.6	0.7	15.6	15.4	15.2	14.1	11	13	13.4	12.1	0-9	זכר
11.3	12	12.4	11.1	8.4	8.7	8.9	9.7	11.5	11.5	12	11.7	8.6	8.8	8.6	8.6	10-19	
11.8	13.7	13.9	13.9	12	13.8	13.6	14.9	12.6	12.2	13.1	13.9	9.8	11	11.4	11.4	20-29	
14.2	17	17.9	18.2	14.5	16.3	16.5	19	14.2	15.8	16.3	18.2	11.2	13	13.9	16	30-39	
14.8	17.5	19.9	21.3	14.8	16.4	17.9	21.6	13.8	16.7	19.5	22.5	12.5	13.8	16.2	18.9	40-49	
17.7	20.1	24	27.5	17.4	19.6	20.8	24.8	17.9	19.9	24.1	28.4	16.2	18	20.8	23.7	50-59	
25.7	28.4	30.7	39	24.2	25.9	26.3	31.9	25	27.1	28.9	34.1	24.8	24.4	25.7	32.2	60-69	
31.4	35.2	36.5	46.6	31.3	31.1	29.5	37.8	32.5	32.2	33.5	42.9	29.9	31	32.3	42.2	70-79	
34.6	34.7	43.3	52.9	32.9	34.8	34.4	37.9	35	32.7	34.2	40.7	34.5	36	35.8	42.6	80-84	
38.5	41.2	52.6	59.4	39.5	37.8	37.1	47.9	35.7	39.4	37.2	36.9	41.9	38.8	38.4	41.7	85+	נקבה
13.6	14.7	13.7	12.3	0.5	0.5	0.5	0.5	15.7	15.2	14.7	13.4	11.1	13.2	13.3	11.4	0-9	
13.5	14.2	14.6	13.3	9.7	10.5	10.6	10.5	13.1	14.3	14.2	14.1	10	11.4	11.1	10.2	10-19	
21.5	24.5	25.9	23.1	20.6	23.1	23.6	23.5	20.1	22.1	23.9	24	18.4	20.8	21.2	19.7	20-29	
22.8	27.5	28.5	26.6	23.1	25.1	25.5	26.1	23.9	25	27.3	28.8	20.1	22.4	23.7	24.8	30-39	
22	26.1	29.5	28.8	21.5	24.7	26.3	28.2	21.1	26.1	29.3	32.4	20.5	23.6	26	27.4	40-49	
28	32.1	33.7	35.5	25.7	29.1	30	31.6	26.2	30.1	33.7	36.9	27.6	29.2	30.7	32.7	50-59	
36.2	38.6	38.5	42.7	33.8	34.2	31.9	33.1	33.7	35.9	35.8	39.9	35.5	35.3	35.3	39.3	60-69	
39.4	42.2	40.1	46.9	38	34.5	32.2	37.2	33.3	33.4	35.5	42.8	43.1	41.1	38.5	44.1	70-79	
47.9	44.5	44.5	63.6	41.1	35.7	33.3	36	30.8	33.4	32.6	38.9	48.7	45.4	42.5	44	80-84	
44.3	49.4	46	58.7	43.1	40.4	36.7	40.4	29.9	32.3	34.6	38	52.6	47.9	44.1	44.6	85+	

מאחדת				מכבי				לאומית				כללית				גיל/SES
4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	

פרופורציית השימוש בתרופות אנטיביוטיות מוקדן סך התרופות האנטיביוטיות

5.3%	6.8%	6.5%	5.9%	11.6%	8.7%	12.7%	10.5%	4.0%	4.5%	4.6%	5.0%	6.7%	6.1%	5.9%	6.0%	0-9	זכר
10.3%	11.2%	11.8%	12.7%	10.7%	10.2%	11.3%	12.0%	8.5%	8.8%	11.1%	10.3%	11.3%	12.1%	13.0%	15.4%	10-19	
21.8%	18.7%	18.4%	16.1%	17.3%	16.0%	15.1%	15.4%	19.2%	16.0%	15.9%	14.2%	20.3%	20.0%	18.6%	20.5%	20-29	
20.0%	21.0%	19.8%	18.5%	17.5%	16.4%	16.5%	15.6%	17.9%	17.0%	17.5%	17.0%	21.4%	21.2%	20.3%	21.9%	30-39	
23.7%	24.0%	23.2%	22.2%	20.2%	19.2%	18.8%	19.5%	22.4%	19.2%	19.9%	21.4%	24.8%	24.3%	23.6%	24.3%	40-49	
28.4%	29.4%	25.9%	27.5%	22.7%	22.3%	22.0%	22.9%	26.4%	24.5%	26.0%	24.2%	28.6%	29.0%	29.2%	29.6%	50-59	
31.6%	34.5%	33.7%	31.2%	26.7%	27.5%	28.7%	27.4%	31.0%	29.7%	29.5%	28.4%	32.7%	34.3%	34.1%	34.7%	60-69	
35.0%	37.0%	38.4%	38.2%	31.4%	33.9%	33.6%	32.4%	33.6%	35.7%	37.3%	36.7%	36.7%	39.8%	40.0%	40.9%	70-79	
37.3%	43.3%	42.8%	41.9%	36.8%	38.4%	38.6%	42.8%	38.2%	44.2%	36.7%	43.2%	41.8%	45.5%	45.7%	47.9%	80-84	
43.9%	52.5%	45.9%	54.8%	45.0%	46.2%	42.9%	50.4%	44.8%	45.1%	43.0%	49.4%	46.0%	48.7%	52.2%	51.9%	85+	
8.5%	8.8%	9.3%	8.9%	12.0%	14.1%	15.0%	14.2%	5.6%	6.5%	6.6%	7.4%	9.9%	9.4%	9.2%	10.1%	0-9	נקבה
16.2%	15.5%	13.7%	13.5%	14.1%	14.0%	13.8%	13.0%	11.1%	12.1%	12.4%	12.9%	15.8%	16.8%	16.4%	17.7%	10-19	
27.3%	27.7%	26.9%	24.3%	20.9%	20.3%	19.6%	20.5%	24.4%	23.4%	23.9%	23.8%	28.0%	27.2%	26.8%	28.3%	20-29	
28.5%	28.0%	27.0%	25.4%	21.4%	20.8%	20.0%	20.9%	26.6%	23.8%	22.9%	24.2%	28.0%	27.9%	26.9%	28.2%	30-39	
28.9%	29.8%	28.1%	27.5%	22.9%	21.8%	21.7%	21.3%	27.3%	26.1%	26.0%	24.4%	29.3%	28.7%	28.0%	29.0%	40-49	
31.0%	32.0%	31.3%	27.7%	25.5%	24.3%	24.7%	23.8%	32.6%	29.1%	27.6%	26.8%	31.7%	31.9%	31.7%	31.3%	50-59	
33.4%	34.0%	35.0%	32.4%	27.9%	27.4%	27.9%	28.3%	34.0%	31.3%	31.6%	32.3%	32.7%	33.5%	34.3%	34.5%	60-69	
34.3%	38.2%	37.5%	38.0%	30.1%	32.7%	32.9%	33.5%	42.1%	38.4%	38.4%	37.2%	32.7%	36.2%	38.5%	40.8%	70-79	
36.0%	40.9%	40.0%	41.1%	37.7%	37.0%	38.2%	39.7%	52.6%	49.0%	46.1%	41.9%	35.3%	38.5%	42.3%	43.4%	80-84	
38.7%	44.5%	43.7%	44.0%	41.9%	42.6%	43.9%	43.3%	56.8%	51.5%	48.3%	47.1%	40.1%	42.4%	46.0%	46.8%	85+	

בריאות הנפש

שיעור ההימצאות של Severe Mental Illness-SMI (כיופריה, הפרעה סכיזופרנית או הפרעה דו-קוטבית), בקרב בני 18 ומעלה

0.4%	0.4%	0.5%	0.5%	0.7%	1.0%	1.4%	1.2%	1.4%	1.7%	1.5%	1.8%	0.8%	1.2%	1.1%	0.6%	18-24	זכר
0.6%	0.9%	0.9%	0.9%	1.2%	1.5%	2.0%	2.2%	1.7%	1.7%	1.9%	2.4%	1.1%	1.4%	1.6%	1.3%	25-34	
0.9%	1.2%	1.4%	1.2%	1.2%	1.8%	2.8%	2.9%	1.8%	2.1%	2.2%	2.7%	1.0%	1.8%	2.2%	1.6%	35-44	
0.8%	0.9%	1.4%	1.3%	1.1%	1.6%	2.5%	2.4%	1.3%	2.0%	2.1%	3.0%	1.2%	2.2%	2.6%	1.8%	45-54	
0.7%	0.7%	1.0%	1.3%	1.1%	1.5%	2.2%	2.1%	0.9%	1.5%	2.1%	2.4%	1.2%	1.9%	2.4%	2.0%	55-64	
0.7%	0.6%	0.8%	0.9%	1.0%	1.2%	1.7%	1.8%	1.1%	1.2%	1.3%	2.0%	1.0%	1.4%	1.7%	1.5%	65-74	
0.6%	0.7%	0.7%	0.6%	0.9%	0.9%	1.2%	0.8%	0.8%	0.9%	1.0%	0.9%	0.6%	0.8%	0.9%	0.6%	75-84	
0.6%	0.2%	0.7%	0.6%	0.8%	0.7%	0.8%	0.7%	1.5%	0.8%	0.9%	0.8%	0.3%	0.4%	0.4%	0.2%	85+	
0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.6%	0.7%	0.6%	0.4%	0.7%	1.1%	0.7%	0.6%	0.4%	0.5%	0.5%	0.3%	18-24	נקבה
0.5%	0.5%	0.4%	0.4%	0.9%	0.9%	1.1%	1.1%	1.1%	0.9%	1.2%	1.3%	0.6%	0.8%	0.9%	0.6%	25-34	
0.8%	0.7%	0.8%	0.7%	0.9%	1.3%	1.8%	1.9%	1.2%	1.4%	1.7%	1.9%	0.8%	1.1%	1.4%	1.1%	35-44	
0.7%	0.7%	1.1%	1.0%	1.0%	1.5%	2.2%	1.9%	1.3%	1.5%	1.8%	2.1%	0.9%	1.5%	1.9%	1.4%	45-54	
0.8%	0.8%	1.2%	1.1%	1.3%	1.7%	2.4%	2.0%	1.3%	1.6%	2.0%	2.4%	1.1%	1.7%	2.2%	1.7%	55-64	
0.8%	0.8%	0.9%	0.7%	1.2%	1.7%	2.0%	2.0%	1.4%	1.6%	1.7%	2.2%	1.0%	1.4%	1.7%	1.3%	65-74	
0.8%	0.6%	0.6%	0.9%	1.3%	1.6%	1.3%	1.5%	1.0%	1.6%	1.4%	1.4%	1.0%	1.1%	1.3%	0.9%	75-84	
0.8%	0.3%	0.2%	0.4%	1.0%	1.2%	0.9%	0.9%	1.0%	1.3%	1.2%	1.8%	0.7%	0.6%	0.7%	0.7%	85+	

שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב חולי SMI, בני 18 ומעלה

-	1.3%	1.8%	2.8%	2.8%	1.2%	1.3%	1.5%	-	1.3%	2.2%	1.8%	1.6%	1.7%	2.1%	1.8%	18-34	זכר
-	5.5%	6.7%	9.4%	3.5%	6.3%	6.2%	6.2%	-	4.2%	5.7%	8.1%	4.5%	6.7%	8.0%	7.7%	35-44	
-	15.2%	16.1%	14.6%	9.3%	13.9%	15.8%	18.0%	-	16.5%	16.7%	23.7%	13.8%	17.4%	17.8%	21.0%	45-54	
-	-	-	-	20.4%	23.6%	24.5%	30.7%	-	29.3%	30.0%	-	22.5%	26.3%	25.6%	30.8%	55-64	
-	-	-	-	30.4%	31.2%	33.9%	-	-	-	-	-	35.0%	29.7%	34.0%	30.6%	65-74	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.2%	28.3%	-	75+	
-	4.1%	-	-	1.6%	1.3%	1.5%	3.4%	-	0.6%	1.8%	1.5%	0.7%	3.5%	2.6%	3.3%	18-34	נקבה
-	-	-	-	0.8%	4.2%	4.3%	10.8%	-	-	8.2%	5.6%	4.7%	6.4%	8.3%	12.4%	35-44	
-	-	13.7%	-	7.5%	9.9%	14.1%	18.1%	-	14.4%	13.6%	18.0%	12.0%	16.4%	17.5%	23.5%	45-54	
-	-	22.2%	-	15.1%	21.0%	25.5%	-	-	19.8%	23.0%	-	20.2%	25.9%	29.8%	32.1%	55-64	
-	-	-	-	19.0%	29.4%	33.3%	-	-	-	-	-	32.6%	31.6%	38.1%	41.2%	65-74	
-	-	-	-	-	28.20%	25.10%	-	-	-	-	-	22.6%	31.5%	29.1%	-	75+	

מאוחדת				מכבי				לאומית				כללית				גיל/SES
4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	

שיעור התייעוד של מרכיבי BMI בקרב חולי SMI, בני 20-64

-	-	-	-	-	34.1%	34.9%	-	-	-	27.7%	-	44.7%	34.0%	34.1%	20-24	זכר	
-	44.4%	55.6%	45.3%	29.7%	35.0%	36.5%	34.1%	-	40.1%	34.9%	32.0%	38.2%	39.7%	41.8%	36.9%		25-34
-	59.6%	59.0%	50.4%	29.1%	40.3%	40.7%	41.4%	-	43.0%	44.0%	41.8%	47.4%	48.4%	50.7%	49.2%		35-44
-	68.0%	61.4%	66.5%	40.3%	49.0%	50.8%	56.0%	-	50.0%	49.8%	46.9%	61.5%	62.1%	60.5%	61.0%		45-54
-	-	-	-	50.6%	54.8%	60.4%	-	-	-	58.3%	-	73.9%	80.3%	79.4%	84.7%		55-64
-	-	-	-	-	39.1%	-	-	-	-	-	-	-	48.1%	52.0%	-	20-24	נקבה
-	-	-	-	35.7%	44.7%	43.3%	50.9%	-	-	52.8%	-	44.9%	50.2%	50.3%	50.6%	25-34	
-	-	-	-	34.4%	43.2%	51.2%	60.7%	-	-	47.6%	47.3%	50.9%	54.6%	59.4%	54.5%	35-44	
-	-	76.3%	-	47.2%	49.6%	51.7%	56.1%	-	57.1%	53.7%	58.6%	64.0%	66.5%	66.3%	65.7%	45-54	
-	-	-	-	47.8%	56.8%	61.0%	-	-	61.3%	64.3%	-	85.0%	79.6%	84.3%	84.3%	55-64	

שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב חולי SMI, בני 20-64

-	-	-	-	-	33.1%	36.6%	31.0%	-	-	29.6%	-	24.0%	33.9%	30.2%	36.0%	20-34	זכר
-	-	41.0%	-	-	36.4%	41.4%	-	-	-	-	-	31.9%	34.5%	38.5%	40.5%	35-44	
-	-	-	-	37.1%	39.4%	43.0%	-	-	-	-	-	40.1%	40.3%	37.9%	37.7%	45-54	
-	-	-	-	-	35.4%	39.0%	-	-	-	-	-	32.6%	33.8%	31.2%	35.1%	55-64	
-	-	-	-	-	32.2%	36.3%	-	-	22.5%	-	-	-	34.0%	40.1%	44.9%	20-34	נקבה
-	-	-	-	-	43.8%	46.7%	-	-	-	-	-	38.2%	43.1%	51.4%	57.5%	35-44	
-	-	-	-	34.7%	45.8%	52.3%	-	-	-	-	-	40.6%	45.3%	53.3%	58.6%	45-54	
-	-	-	-	-	41.5%	50.4%	-	-	-	47.5%	-	37.8%	44.9%	46.9%	53.4%	55-64	